



Fekete

Lajos.

Talajtan

II. kiadás







DK

156













# TALAJTAN.

---

Irta:

**FEKETE LAJOS,**

m. k. erdőtanácsos és akadémiai tanár.

---

**Második,**

teljesen átdolgozott és bővített kiadás.



**SELMECZBÁNYA:**

JOERGES ÁGOST ÖZV. ÉS FIA KIADÁSA.  
1891.





NYOMATOTT JOERGES ÁGOST ÖZV. ÉS FIÁNÁL.

## Előszó.

E munka első kiadásának 1882-ben való megjelenése óta nemcsak számos ily tárgyú tankönyv látott napvilágot, hanem különösen a német irodalomban sok tanulságos kísérlet eredménye lett közzétéve; ezen kívül elérkezettnek láttam az időt, az elmállási tünetmények magyarázatát a vegytan mostani álláspontjához alkalmazni. Mindez az új kiadás beható átdolgozását és bővítését tette szükségessé. Az átdolgozás közben teljesen megérlelődött bennem az a meggyőződés, hogy a talajtan erdészek és mezőgazdák számára lényegesen nem különbözik, s azt a keveset, a mi az erdészt kiválóbban érdekli, a mezőgazdának is jó tudni és viszont. Ez a meggyőződés indított arra, hogy a czimben az „erdészeti“ jelzöt elhagyjam, és az átdolgozásnál s bővítésnél a mezőgazda igényeit is figyelembe vegyem, hogy könyvemnek mind ő, mind az erdész egyenlően vehesse hasznát.

Minthogy kevés mezőgazdának és erdésznek áll valamely geologiai vagy talajtani térkép rendelkezésére; szükségesnek láttam a magyar állam talajtani térképét is a munkához csatolni. Elismerem, hogy ez a kísérlet, a térkép mércéjének kicsinységből kifolyólag, hiányosan sikerült, és a térkép részletes tanulmányozásra nem alkalmas; de nem is ez a czélja, hanem csak nagyjából nyújtani némi átnézetet a magyar állam talaji viszonyairól addig is, a míg valaki jobbal gazdagitná irodalmunkat.

**Selmeczbánya, 1891-iki május hóban.**

**Fekete Lajos.**







## Bevezetés.

Földünk felületének azon részét, melyen valamely növény tenyészik, azon összes fizikai és chemiai hatókkal együtt, melyek azon növény tenyészésére befolyást gyakorolnak: az illető növény termőhelyének (Standort) nevezzük. A növény, életének feltételeit részint a földkéreg legfelső rétegében, részint a termőhely légköri tényezőiben találja fel. Elsőt, melyből a növények megfelelő szerveikkel a vizet, s avval együtt az ásványi tápanyagokat veszik fel, oly mélységig, a mennyire a gyökök bele hatolhatnak, talajnak nevezzük; utóbbiak pedig az illető hely klimáját képezik. Ámbár nincsen a földkérgének oly kemény sziklája melynek felületén valamely növény, pl. bizonyos moszatok és zúzmók meg ne telepedhetnének, melyek számára tehát az talajul ne szolgálhatna; mindazonáltal gazdasági szempontból csak azon apró, morzsalékos, földes részekből és ezeken kívül gyakran kötőrmeléből összetett felső réteget nevezzük talajnak, mely magasabb rendű növények gyökereinek behatolását és táplálkozását megengedi. Csak ily értelemben vesszük a talaj fogalmát e munkában.

Talajtan azon tudomány, mely a talaj keletkezésével, alkatrészeinek és viszonyainak leírásával, s a különféle talajnevek osztályozásával és ismertetésével foglalkozik.

Minthogy a talaj földünk ásványokból összetett kérgének egy vagy más rétegéből képződött és képződik jelenleg is, és nagyobb részint ásványokból áll; annál fogva a talajtan szorosan



az ásvány- és kőzettanra támaszkodik. Ezen kívül elkerülhetetlen segédtudománya a fizika és chemia; mivel csak ezek segítségével magyarázhatjuk és érthetjük meg a talaj keletkezését, a légkörhöz és a növényzethez való viszonyait.

A talajtan szoros kapcsolatban áll a növényélettannal és evvel együtt alapját képezi a növénytermelésnek.

Czélszerűnek látjuk e könyvecskét következő részekre osztani:

I. Rész. A talaj keletkezése.

II. Rész. A talaj alkatrészei és tulajdonságai.

III. Rész. A talaj felosztása, jellemzése és meghatározása.

---

1851

/1866/



## **Első Rész.**

---

### **A talaj keletkezése.**

#### **I. Fejezet.**

#### **A talaj képződéséről általában.**

A föld szilárd kérgének felületét részint kemény kőzetek alkotják, melyek ily állapotban erdei és mezei termények tenyészésére teljesen alkalmatlanok; részint földes vagy kötetlen törmelékkőzetek, melyeket azonnal, vagy csekély fokú átalakulás után elfoglalhatnak a gyökeres növények (agyag, iszaprétegek, homok, vulkáni hamu s a t.); végre a földkérgének legfiatalabb rétegeihez tartozik a földes és kötörmelékes ásványi anyagoknak, felbomlásnak indult szerves, különösen elkorhadott növényi anyagokkal való azon keveréke is, mely a tulajdonképi talajt képezi. Minthogy pedig a kemény kőzetektől egészen a talajig mindenféle átmenet létezik: a földes kőzetek és a talaj képződése közt éles határt vonni annyival is kevésbbé lehet, mivel a geolog utóbbit is a kőzetek közé sorolja. Ebből következik, hogy a geologia a földes kőzetek keletkezésének leírásánál a talajtannal érintkezik, sőt a gyökeres növényzet által azonnal elfoglalható vulkánihamu-, iszap- és homoktelepeknek, valamint a tulajdonképeni talajrétegnek képződése mindkét tudománynak körébe esik; melyek az általuk felkarolt mezőnek e kis területén úgy szólva fedik egymást. Ámbár a földkéreg egyes tagjait (melyek közé a talajréteget is számítunk kell), épúgy mint azoknak származását is ismernie kell legálább nagyából annak, aki a talajtan tanulmányozásához fog; mind-



azonáltal nem mellőzhetjük a talajtanban a talajképződésnek bővebb tárgyalását; mégpedig először azért, mert azoktól, kiknek e munka főképen szánva van, nem követelhetjük a földes kőzetek származásának oly beható ismeretét, mely a talajképződés további tárgyalását fölöslegessé tenné; másodszor pedig azért, mert a geológ a földes kőzetek képződésénél a talajképződést nem oly szempontból tárgyalja, mint ez erdő- vagy mezőgazdákra nézve kívánatos volna, minthogy csak a geológiai tekintetben lényeges dolgokra fektet súlyt.

A legtöbb talajnak nagyobb részét nem csak súly, hanem térfogat szerint is a kőzetekből származó ásványi anyagok teszik ki, és ezek képezik eredeti ős forrását azon ásványi tápanyagoknak is, melyeket a növények hamujában megint megtalálunk. Innen sejthetni a kőzetekből való talajképződés jelentőségét.

A talajanyagok mindnyájan fizikai és chemiai hatások származékai. A fizikai és chemiai erők együttesen, vagy felváltva működnek közre a talajképzésnek munkájában; hol egyik, hol másik csoportja az erőknek vergődve tulsúlyra. Ez erők vagy kisebb területekre szorítkozva, a vulkánok rettenetes kitöréseiben jelentkeznek időnként; vagy kiterjesztik működésüket a földkéregnek minden pontjára, mely a légkörrel érintkezik; vagy végre a szerves élet szolgálatába szegődve karöltve végzik szelid, folytonos munkájukat.

Az egy vagy más uton képződött talajanyag vagy képződésének helyén marad, vagy onnan jelentékeny távolságra vitetve rakódik, telepedik le; miközben a különböző helyen származott talajanyagok összekeverődnek. Előbbit eredeti vagy sziklai, utóbbit telepedett, s amennyiben víz által szállítottatott és rakatott le, üledék talajnak mondjuk. De a képződés, elköltöztetés és leülepedés gyakran egy folytában, lényeges megszakítás nélkül történvén, ezen folyamatokat szorosan elkülönítve tárgyalni nem látszik czélszerűnek. Azért helyesebbnek tartjuk a talajképződést a következő fejezetek alatt adni elő:

Talajképződés vulkáni erők, atmoszfériai hatók és szerves élet által.



## II. Fejezet.

### Talajanyagképződés vulkáni erők által.

Igaz, hogy hazánkban vulkáni kitöréseket a történelmi idők óta senki sem észlelt; mindazonáltal Európának nem sok országa van, mely a vulkáni működés folytán képződött talajanyagnak akkora tömegét tudná felmutatni, mint Magyarország.

A Pilis és a Börzsönyi hegység a Duna-könyöknél Vác és Esztergom közt, a Selmecz és Kőrmöcz vidéki érzhegység, a Mátra hegység, a Tokaji hegy és az innen a Simonkáig északra huzódó hegyláncz, az után azon nagy, szakadozott hegyláncz, mely a Vihorlással Zemplén megye keleti határán kezdődve, Ung- és Beregmegyén át és tovább Ugocsa északi és Marmaros déli határán tova huzódva a tekintélyes magasságu Gutinban végződik, továbbá a Görgényi és a Hargita hegység, s végre az Erdélyi Ércz-hegységnek s más hegységeknek is egyes részei: vulkáni eredetűek, s főképen a trachyt kőzetek különböző fajaiból állnak. Hoszszan tartó és több geologiai korszakon át ismétlődő lávaömlések eredményei ezek a Kárpátok hegylánczát nyomon követő kőzettömegek. De itt tulajdonképen nem ezeket, hanem azon rengeteg mennyiségű földes talajanyagot akarom kiemelni, mely a megnevezett hegységek lábainál kisebb nagyobb területeket borít és ama nagyszabásu vulkáni kitörések termékének tekinthető. Ez a trachitnak és más vulkáni kőzeteknek úgynevezett tufája (Tuff), amilyenek képződését ma is szemlélhetjük a vulkánok kitöréseinél.

A föld gyomrából kitóduló olvadt kőzetanyag ugyanis nem ölt mind merev kőzet alakot, milyenek pl. a nagyobb nyomás és lassu kihülés útján keletkezett jegeczes vulkáni kőzetek: porfir, trachit, vagy a csekélyebb nyomás alatt képződött apróbb jegeczű bazalt, vagy végre a szárazföldek felületén vagy a tenger szintje alatt de csak csekély mélységben kitóduló láva; hanem az ismeretlen mélységben a vulkán tűzhelyéhez bejutott, és az elképzelhetetlen forrongás közben a tűzfolyó magmával keveredett víz, amint a magma kisebb nyomás alá kerül, gőzzé válik, a magmát a vizen úszó, szivacsos habkővé (horzsakő, Binnstein) változtatja, vagy kisebb nagyobb csöppecskékre szakítva szórja ki a vulkán nyílásán. A roppant vulkáni erő, mely valószínűleg a gázok hirteleni fejlődésének következménye, kilométe-



rekre sőt miriameterekre löki fel ezen tűzfolyó anyagrészecskéket, melyek aztán a levegőben kihűlve gyorsan megmerevednek. Ezek közül a legnagyobbak, melyek ököl egész fej nagyságúak (sőt 1 m. átmérőt is meghaladhatnak) az u. n. vulkáni bombák, valamint a kavics és kődara nagyságúak az u. n. lapillik kisebb magasságból és hamarabb hullanak le; a homokhoz hasonló, mint vulkáni homok, már nagyobb távolságban szórtnak szét; míg végre a legfinomabb, részben csak mikroszkop alatt felismerhető részecskék, vagyis a vulkáni hamu, több miriameter magasságra emelkedhetik az exploziót okozó gőzök tömegével a légkörbe, s ott a szelek hihetetlen távolságokra vihetik azt el; jöllehet legnagyobb részük mégis a kitörés helyéhez közelebb jut a földre vagy tengerbe, úgyhogy a lehullott hamu mennyisége annál csekélyebb lesz, mennél nagyobb a kitöréstől való távolság. A légből lebegő hamu egy része a kráter száján kitóduló vízgőzökből képződő felhőszakadás szerű esővel együtt, mint u. n. izzapeső jut a földre a vulkánok közelében.

A vulkánok hamuja és homokja részint apróra zúzódot habkőből, üvegszálacsákák töredékeiből, részint apró üvegszerű gömböcskékből, részint üveges anyaggal bevont földpát, augit, magnetit s más kristályocskákból áll. Ugyanezen üvegnemű anyag és benne mikroszkopikus kristályok képezik a lapilliket és a bombákat is. De ezen kívül hozzá járulnak, habár többnyire aránylag sokkal kisebb mértékben, ez anyagok képzéséhez, a vulkáni kitörések alkalmával felemelt, áttört, szétrepesztett, szétmorzsolts közetek morzsalékai is. A tűzhányók kitörés és talajanyagképzés tekintetében való jelentőségének megítélése végett nem lesz felesleges néhány tényt felhozni a közelebbi kitörések történetéből.

A Vezuvnak időszámításunk 79-ik évében történt kitörése alkalmával a hamu három várost és nagy kiterjedésű mezőséget temetett el oly vastag réteggel, melyből a ház fedelek sem látszottak ki. A vastag gomolyakban fölszállott fehér gőzzel elegyedt hamut a szél Szíriáig és Egyiptomig vitte el. Ez emlékezetes idő óta több kitörésnél megmérték a Vezuvból kiömlő gőzoszlop magasságát, s azt néha 7–8000 méternyinek találták.

„Az újabb korban legnagyobb rémületet okozott csúcskitörések egyike volt a Cosequina vulkáné, mely csak 150 m. magas hegycske s közép-Amerikában a Fonseca öböl déli oldalán mint



hegyfok nyulik ki. 1834-ben történt a borzalmas esemény. A levegőbe dobált törmelékek (homok, hamu etc.) több száz kilométernyi szélességű borzasztó ernyővé terjedének szét az égen, s legalább is 5 méternyi vastagságu réteggel boríták be a mezőségeket több mint 40 kilométernyi távolságra. Magánál a hegy tövénél a hegyfok 240 méternyire nyomult beljebb az öbölbe, s két, a vulkán által kiszórt hamuból és kövekből képződött új sziget emelkedett fel több kilométernyi távolságban a tenger közepén. A kráter legközelebbi környékén túl mind vékonyabbá vékonyabbá lett az égből hullott porréteg, de a szél 20 hosszúságu foknál is messzebbre hordta azt nyugat felé, s a hajók melyek azokon e tengeri vidékeken valának, csak nagy nehezen hatolhattak át a vizen elterült tajtékkövek tömegén. Észak felé Hondurásznak Truxillo és Mexikónak Chiapos nevű városában volt észrevehető a hamu eső; délkeletre Uj-Granadában Carthagenáig, Santa-Martáig és a Columbiai partmellék egyéb városaiig hatott el; keletre a passzát szelek ellenáramlása által vitetve, Jamaikában Santa-Anna határában, tehát 1300 kilométernyi távolságban hullott le. Azt a föld- és vízfelszint, melyre az a poreső lecsapódott, 4 millió négyszög-kilométernyire kell becsülnünk, ami pedig a kiokádott tömeget illeti, az nem lehetett kevesebb 50 milliárd köbméternyinél. — A szétrobbant hegynék durrogása egészen Bagota nagy fennsíkjáig elhallatszott, mely attól egyenes vonalban 1650 kilométernyire fekszik. Mig a rettenetes felhő a vulkán körül koválygott, sűrű setétségbe borult az ég; negyvenhárom órán át csak a hegy nyílt torkából eredő villámok rémes világánál és vörös fényénél lehetett látni. Hogy ettől a hosszú éjszaktól, a hamu esőtől és izzó légkörtől szabaduljanak, hanyatt homlok menekültek a Cosequina alján lakók a Fonseca öböl fekete vize mentén huzódó uton. Férfiak, nők, gyermekek s házi állatok nagy nehezen tudták követni a szakadékok- és ingoványokon át haladó ösvényt; az alatt a hosszú éjszaka alatt, mint mondják, oly nagy volt minden élőlényben a borzalom és rémület, hogy még az erdei vadak, majmok, kigyók, és madarak is a menekülők sergéhez csatlakoztak, mintha fölismerték volna, hogy az emberben nagyobb észtehetség van, mint az övék“.\*)

\*) Landgrebe, Naturgeschichte der Vulkane; Reclus, a föld, magyar fordítása nyomán; 510. és 511. l.



„Az 1883. év augusztus hónap 26. és 27-ik napján a Jáva és Szumatra szigeteket elválasztó Szunda-szorosban talán a legnagyobb vulkáni kitörés ment végbe, melyet a történelem feljegyzett. Krakatoa nevű igen termékeny kis sziget legnagyobb része a tengerbe süllyedt, két új sziget képződött és az egész vidék roppant területben hamu alá temetődött. A kitörések robaja 1000 mérföldnyire volt hallható. A sziget lesüllyedése által vetett vízhullám az egész földet megkerülte: a tengeri kikötők hullámjelzőkészülékei majd mindenütt megéreztek.

A rombolás hírére egy óriási levegő hullám vitte meg a föld szerencsésebb tájaira: e hullám folyton nagyobbodó gyűrűkben a földgömböt körülfutotta s a katasztrófa színhelyének ellenlábasaival egy pontba futott össze és ott visszaverődve, utazását a Föld körül a hang tovaterjedésének sebességével visszafelé is megtette. Ez háromszor ismétlődött. A hullám elvonulását a meteorológiai állomások író barometerei feljegyezték. A vulkánok olyan óriási mennyiségű hamut és más vulkánterméket szórtak ki, hogy a kitörés környékén 36—40 óráig folytonos sötétség uralkodott, melyet csak a néha-néha kitörő lángok, a villámok és a levegőben szerte röpködő izzó tömegek, kövek, oszlattak el pillanatokra. Krakatoától körülbelül 162 kilométernyi távolságban fekvő Batavia szintén teljes sötétségbe volt burkolva: a hamufelhők a napot tökéletesen elfedték s a város lakói félelemtől és a hidegtől — az egyenlítő alatt! — egyaránt fáztak. A délben égő gázlámpákat az említett levegő hullám egyszerre mind kioltotta. Midőn végre a tenger dühöngése és a szakadatlan hamueső megszűnt, a hamufelhőkön gyengén áttörő napfény különös látványt tárt a megrémült lakosság elé: hóval fődött téli tájképnek látszott a fehér hamuval vastagon ellepett forró övi vidék! — Nagy hamuesőt konstataáltak még Ausztrália északnyugati partjai mentében, sőt Krakatoától délkeletre mintegy 600 mfd: távolságban is, mely utóbbi helyen a hamueső két napig tartott s a nap is csaknem teljesen elsötétedett“.)

---

\*) Term. tud. közl. 1884. febr. füzet. 54. és 55. l. Barthonek G. „Az ég szokatlan pirossága“.



### III. Fejezet.

## A talajképződés légköri hatók által.

Már az I. fejezetben érintve volt, hogy némely kőzetnek semmi (homok, vulkáni hamu sat.), másoknak csak csekély átalakuláson (tályag, némely agyagpala, trachittuff stb.) kell keresztül mennie, hogy a növények gyökerei elfoglalván, a talajnevet teljesen megérdemeljék; mások ellenben, kivált bizonyos körülmények közt, századokig, ezredekig daczolhatnak az idő fogával, míg ennek sikerül talajanyaggá morzsolni össze azokat. De többnyire előbb vagy utóbb mindenik enged a föld felületét folytonosan változtató, átalakító erőknek, a napsugaraknak és kisérgázoknak, a légkör és tengerek soha sem nyugvó munkájának; mely részint folytonos, csak hosszabb idő alatt észrevehető működésben, részint képzeletet meghaladó óriási rombolásokban nyilvánul. De a romboló elemek a többé-kevésbé kész talajanyagot más helyre szállítván ott megint letelepítik és a növényzet rendelkezésére bocsátják. Hogy a képződés folyamatait, a mennyiben lehet, a természetes sorrendben követhessük czélszerűnek látjuk először az eredeti, tehát a képződése helyén maradó talaj keletkezésével foglalkozni és csak azután menni át a légköri hatók azon működéseire, melyek által a talajanyagok távoli helyekre szállíttatván, ott letelepednek. Az eredeti ásványi talaj képződése a kőzetek elmállása által történik, mely elnevezés alatt mindazon vegyi folyamatokat összefoglaljuk, melyek által a kőzet apró homokká és földes anyagokká hull szét, illetve változik át. A kőzetek vegyi felbomlását mindig a felületüknek mechanikai uton való szétrepedezése előzi meg.

### A) A kőzetek elmállása.

#### I. A vegyi felbomlást megelőző szétrepedezés, szétporlódás mechanikai uton.

Ámbár a kőzetek szétrombolásában a jégárak, édes és tengervíz is igen kiváló szerepet játszanak; mindazonáltal az így létrejött talajanyag azonnal tovább szállíttatván, s a víz által elhordott eredeti talaj részecskéivel együtt üledék-talaj alakítására fordíttatván, fennebbi közegek mechanikai hatása csak a



második szakaszban fog tárgyalgatni. Ennek következtében itt csak a meleg és a fagy hatásáról lesz szó.

A napsugarak a kőzetek felületét annál erősebben felmelegítik, mennél merőlegesebben érik, s mennél sötétebb színűek utóbbiak. Kedvező körülmények közt e felmelegedés nyáron 40 sőt több °C-t is elérhet; ámbár csekélyebb hőemelkedés is megteszi hatását, ami a kőzet felületének kiterjedésében nyilvánul. A napsugarak hatása megszűnván, s a kisugárzás folytán a kőzet felülete éjjel tetemesen, még pedig rendesen sokkal inkább mint a lég, kihűlvén, a felület megint összehúzódik. De e kiterjedés és összehúzódás annál kevésbé történik egyenletesen, mennél különbözőbb ásványokból van összetéve valamely kőzet, s mennél durvább annak szerkezete. Sok ásványnak azon tulajdonsága van, hogy a különböző jegecedési tengelyek irányában különböző mértékben terjed ki és húzódik össze. A kiterjedés alkalmával a különböző természetű ásványrészek széttolják egymást, az összehúzódás folytán pedig mikroszkopikus hézagocskák maradnak hátra. E folyamatnak számtalanszor való ismétlődése folytán a kőzetek felülete meglazul, megrepedezik. Minthogy azonban a kiterjedés és összehúzódásnak ezen nagyobb mérvű játéka csak a felületnek igen vékony, lemezszerű rétegére hat, az alább fekvők ellenben a melegközlés lassu menete miatt a hatástól csak igen kevésbé érintetnek, így a felület kiterjedését és összehúzódását nem követhetvén, ez utóbbi lemezekben, pikkelyekben lepattogzik.

Éppígy, de a hőmérséki különbségek nagyobb voltánál fogva még mélyebbre hatóan érvényesül a nyár és tél váltakozásának befolyása. De még hathatósabb a megfagyott víznek hatása, mely a hőváltozások által megkezdett munkát folytatja. A megrepedezett kőzetnek hézagai, likacsai megtelnek vízzel. Ha már most a tél fagya beáll, azon víz jéggé változik, s így térfogata közel  $\frac{1}{10}$  résznivel nagyobb lesz. Minthogy a jég először a felületen képződik, a hasadékok, s más hézagok felső nyílását elzárja. A beszorult víz most, a megfagyás által kiterjedvén, ék módjára feszíti szét a szikla egyes részeit egymástól. Nagyobb repedésekbe, hézagokba szorult víz, megfagyása által oly erőt fejt ki, hogy egész sziklatuskókat nagy csattanással, pukkanással repeszt egyszerre szét. A szikláknak innen eredő ropogása erős telek alkalmával,



hegyi lakók előtt ismeretes. Az így szétrepedt kőtöredékeket, sziklatuskókat, télen át a jég még összetartja; de e ragaszt a tavasz melege felolvasztván, a sziklák ormairól, sziklafalak oldalairól legurulnak azok s az így képződött kőromladvány a szikla-  
oldalak alján halmozódik fel. Sok földes kőzetnek, u. m. agyag-  
paláknak, némely tuffoknak és némely lágy homokköveknek átfázása,  
többször megfagyása és felolvadása már elegendő arra, hogy az  
a gyökeres növények által elfoglalható talajt alkosson.

## II. Az eredeti talaj ásványi anyagainak képződése vegyi uton általában.

A kőzeteknek fennebb említett mechanikai széthullása, fel-  
darabolódása csak némely lágy, földes kőzetnél szolgáltat kész  
talajanyagot; minden keményebb, s különösen minden jegeczes  
kőzetnél vegyi felbomlás, vagy legalábbbb bizonyos részeknek fel-  
oldása szükséges ahoz, hogy oldható anyagokat tartalmazó, földes  
termékeny talaj jöjjön létre. Csak ez teszi az elmállást töké-  
letessé; és ott is, hol a mechanikai elaprózás, elporladozás  
elégséges, ez csak onnan van, mert korábbi geológiai korszak-  
okban már átment a kőzet a szükséges vegyi átalakuláson.  
(Homokkő, agyagpala, márgapala stb.) A föld mélyéből akár  
vulkáni működés, akár a felső rétegnek vizek által való lehor-  
dása vagy hegycsuszamlások stb. ef. által a felületre került kő-  
zetek egészen új viszonyok közé jutnak, melyek többé kevésbbé  
különböznek azoktól, melyek közt képződtek és fennálltak. Egé-  
szen új vegyi hatásoknak lesznek itt kitéve, ami létüket kétsé-  
gessé teszi. Eltekintve a tenger alatt vagy a földrétegek mélyében  
történő vegyi változásoktól, melyek tárgyunktól távolabb esnek; itt  
csak a légkörnek a kőzetek felületére gyakorolt vegyi hatását  
fogjuk feladatunkhoz szabott terjedelemben tárgyalni.

A légköri testek közül a kőzetekre átalakítólag hatnak és  
talajképzés tekintetében jelentőséggel bírnak: a víz (magára vagy  
némely abban feloldott sókkal) továbbá az oxygen és a szénsavany;  
melyeknek hatása annál nagyobb, mennél repedezettebb a kőzet  
felülete, s mennél apróbbra morzsolta az. Fennebbi testek vegyi  
hatása alatt részint finom földes anyag származik, mely a többé-  
kevésbbé ellentálló közettörmelékekkel keverve a talajanyagot szol-  
gáltatja; részint pedig vízben oldható anyagok, melyek a talajt



áthatják és a növények egyik életfeltételét képezik, mivel az u. n. hamualkatrészeket ezek szolgáltatják.

Ebből sejthetjük a vegyi elmállás jelentőségét talajképzés szempontjából, melyet még sokszoroz azon tény, hogy a víz, oxigén és szénsavany vegyi hatása soha sem nyugszik, szüntelenül működik, s nemcsak a felületre terjeszkedik ki, hanem felkeresi a talajban elrejtett közetszemecskéket, behatol a repedéseken és a rétegek között leszivárgó vízzel a sziklák mélyébe; sőt áthatja az épnek látszó sziklák tömegét, úgyhogy a friss lavaköztől eltekintve, kérdésessé válik ép kőzet létezése az ember által átkutatható rétegekben.

Minthogy a kőzetek többnyire különféle ásványokból állanak, melyek a vegyi hatásokkal szemben különbözően viselkednek magukat és különböző vegyi folyamatokon mennek keresztül; okvetlenül szükséges, hogy a kőzetek vegyi elmállása tárgyalását az ásványokon észlelt vegyi folyamatok megismerése előzze meg.

### III. Az ásványok felbomlása és feloldódása.

A fennebb már említett légbeli testek közül a tisztavíz magára is felold némely ásványokat kisebb nagyobb fokban maradék hátrahagyása nélkül, pl. a szikót, konyhasót, gipszet s másokat; de némely ásványokból bizonyos vegyületeket oldóképességénél fogva kivonni is képes, s ez által azok felbomlását eszközölheti, habár az ehhez szükséges víz mennyiségéhez képest aránylag kis mértékben is, pl. feloldja és kivonja a kovasavas kált és nátront a földpátokból, melyeket ha finoman szétdörzsölve húzamos ideig lepárolt vízben tartunk, utóbbi az említett kovasavas vegyeket kimutatható mennyiségben fogja tartalmazni. A széndioxyd magára mint légnem, az ásványokat megtámadni nem bírja és igen kérdéses az is, hogy az oxigén gáz alakban képes-e azokra hatni; de víz által elnyelve és együttesen az elmállásnak igen hatalmas tényezőivé lesznek. A víz, ha széndioxydot vesz fel, kivetkőzik azon közömbösségből, melylyel tiszta állapotában a legtöbb ásványnyal szemben viselkedik; és az említett légnemmél szén-savvá,  $H_2 CO_3$ , egyesülve nemcsak oldóképessége tetemesen fokozódik, hanem a legállandóbb ásványokon is oly változásokat idéz elő hosszas idő alatt, mint az erős savanyok a vegymű-



helyben. Amely szénsavas sókat a tiszta víz igen nehezen old (pl. a kalczitot  $\frac{1}{50000}$ \*) azokat a szénsav tartalmu víz ketted szénsavas sókká vagyis bikarbonátokká változtatva sokkal nagyobb mértékben képes feloldani (pl. a finom porrá tört kalczit oldhatósága a szénsavval telített vízben  $\frac{1}{1000} - \frac{1}{1600}$ ); de úgy látszik, hogy az amorph kovasav, valamint némely phosphorsavat tartalmazó, s más ásványok is nagyobb mértékben oldódnak a szénsavtartalmu vízben. De még nagyobb jelentőséget kell azon hatásnak tulajdonitnunk, melyet ezen folyadék mindazon szilikátokra gyakorol, melyek kaliumot, natriumot, calciumot, magnesiumot, vasoxydult s a t. tartalmaznak; melyekkel a szénsav egyesülvén, az ásvány — többnyire földes rész visszahagyása mellett — felbomlik.

Ha a víz oxygént tartalmaz, akkor minden arra alkalmas ásványra, a milyenek a szulfidok a vasoxydultartalmuak s a t. oxydálólag hat. Utóbbiaknál az illető ásvány (vagy kőzet) felületére ilyenkor mindig vashydroxyd (vaséleghydrát) válik ki, rozsdás barna, poros bevonat alakjában. A vastartalmu szilikátok felbomlását gyakran az oxygén kezdi meg, s a szénsav és víz folytatják.

De nemcsak a szénsav, hanem még más anyagok is gyarapítják a víznek oldó képességét. Ezek közé tartozik a közönséges vagy konyhasó, Chlornatrium, mely kisebb-nagyobb mértékben mindenütt jelen van. Mennél szárazabb valamely különben lapályos vidék, általában annál nagyobb mennyiségben lép fel; ellenben annál inkább el van távolítva a felső rétegből, mennél több eső és hó esik ott. Azért találjuk száraz sivatagokon mindig tetemes mennyiségben. E sónak jelenléte a vízben nagyon elősegíti némely nehezen oldható ásványnak a feloldását; ami a kén- és phosphorsavas mészről, valamint a fluormészről be van bizonyítva, de valószínűleg még más összetételekre nézve is áll. Ezen kívül más sók is el vannak terjedve a föld felületén, u. m. a natriumnak és a szénsavnak sói (különösen hazánk lapályain a sziksó), melyek más ásványokra oldólag és bontólag hatnak. Végre a korhadó növényi anyagokból fejlődő különböző testekről sem szabad megfeledkeznünk, melyek részint savanyu természetűek

\*) Az oldhatóság fokát törttel szoktuk kifejezni, melynek nevezője az oldó folyadékot, számlálója pedig az abban feloldott szilárd testet fejezi ki súlyegységekben.



lévén, egyenesen megtámadnak bizonyos aljakat (basis) az ásványokban, s így utóbbiak felbomlását idézik elő; részint pedig, elegendő oxigén jelenlétében nagymértékben desoxydálólághatnak, ami kiválóan ferro- (vasoxyd-) vegyeknél nyilvánul. Ez által gyakran oldható ferri- (vasoxydul-) sók származnak\*). De a fennebbi anyagok különösen az által is előmozdítják közvetve az ásványok elmállását, hogy felbomlásuk által tetemes mennyiségű szénsav jó létre, melynek nagy jelentőségű működését már fennebb láttuk.

Mindezen vegyi folyamatoknak jelentősége nemcsak a kőzetek elmállásában, tehát talajanyag képzésében áll; hanem a talajban mindig kisebb-nagyobb mértékben előforduló ásványok-, közettöredékeknek lassankénti és időnkénti feloldásában és felbontásában is; mert csak ily állapotban juthatnak az u. n. talajtápanyagok a növények gyökereihez, és gyökereibe.

Lássuk mármost, hogy miképen viselik magukat fennebbi vegyi hatásokkal szemben az egyes ásványok vagy azok csoportjai.


A kvarcz (quarz) rendkívül nagy mértékben el van terjedve a kőzetekben, hol mint kristályos elegyrész fordul elő a granitban, gneiszban s a t. vagy többé-kevésbé lekerekített szemcsékben a homokkövekben; de ezen kívül a laza, kötetlen homoknak is legnagyobb részét teszi. Áll kovasav-anhydritből vagy kovaföldből  $\text{Si O}_2$ , mely a légköri hatóknak minden ásvány közt a legmakacsabbul ellent áll, tehát vegyi elmállásnak nincs alá vetve. Rokonai a nem kristályosodó kálc edon, jaspis, a chat stb. melyek részint tiszta, részint bizonyos anyagokkal festett kovasavanhydritből állanak és az elmállás vagy méginkább más, a föld mélyében lefolyt felbomlási folyamatok terményeiképp tekinthetők. Ugyanez mondható az opálról is, mely víztartalma kovasavból áll. Víztartalma különböző. Alkális hatása, pl. szénsavas alkáliákat tartalmazó vízben kis mértékben oldható.

A kvarczsal együtt a talajképzésre legfontosabbak a kovasavas vegyületek vagy szilikátok. Ezek chemiai képleteit leszármaztathatjuk az orthokovasavból, melynek képlete  $\text{H}_4 \text{ Si O}_4$ , vagy a metakovasavból, melyet nyerünk, ha előbbtől  $\text{H}_2 \text{ O}$ -t levonunk, lesz:  $\text{H}_2 \text{ Si O}_3$ . De vehetjük az orthokovasavat


\*) Ferdinand Senft, (Fels und Erdboden, 1876.) a növényhulladékok felbomlásából származó humuszsavaknak, és az ezek által képzett humuszsavas alkáliknak legalább is oly nagy jelentőséget tulajdonít az ásványok feloldása- és felbontására nézve, mint a szénsavnak



többszörösen is, és levonhatunk belőle az ásvány összetételének leszámaztatása végett egy vagy több  $\text{H}_2\text{O}$ -t, mi által a kovasavnak számos változatát nyerjük.



Mind kettő 2 Si tartalmánál fogva dikovasavnak mondatik.




Ez egy trikovasav stb.

Az egyszerű kovasavból leszámaztatható szilikátokat monoszilikátoknak, a dikovasavból leszámaztatottakat diszilikátoknak, a több Si-t tartalmazó kovasavból leszámaztatottakat polyszilikátoknak mondják.


A szilikátokból a szénsav a kovasavat kisebb-nagyobb mértékben képes kihajtani. Ez legtöbb esetben mint orthokovasav, vagy egyes esetekben mint metakovasav válik ki kocsonyás állapotban; de ha kiszáradás által még több vegyi vizet veszít, végre kovafölddé vagy kovasavanhydritté változik át:  $\text{Si O}_2$ .

A mennyiben lehet, először az egyszerűebb vegyeket tárgyaljuk; de ezen elvhez az ásványoknak rokonságuk szerinti csoportosítása miatt, szorosan nem ragaszkodhatunk.

A káolinna (porcellánföld) kezdjük meg a sort, mely az aluminium tartalmu szilikátoknak egyik, még pedig leggyakoribb végterménye. Képlete:



Leszámaztatható az orthokovasavból így:



Ez így írható  $\text{H}_2 \text{ H}_6 \text{ Si}_2 \text{ O}_8$ .  $\text{H}_6$  helyett a 6 értékű  $\text{Al}_2$ -t téve és egy tömecs vizet hozzá adva lesz mint fennebb:  $\text{H}_2 \text{ Al}_2 (\text{Si O}_4)_2 + \text{H}_2 \text{ O}$ .

A káolin az agyagnak legfőbb alkotó része, mert az utóbbi nem egyéb, mint vashydroxyddal és kovasavval kevert káolin. Ez mint az elmállás végső terménye, közönséges viszonyok közt változásnak nincs alá vetve; de ha bizonyos körülmények közt, erős savakkal, pl. a pyrit elmállásánál kifejlődő kénsavval jó össze, ez is oldatba jöhet, illetve oldható sőt — a megnevezett esetben kénsavas aluminiumot vagyis timsót — alkothat.

Menjünk át most az elmállásnak többé kevésbé alávetett, majd kivétel nélkül kristályos, szilikátokra.




Az ámfiból (amphiból) sok kőzetnek képezi fő alkotó részét, s ezen kívül mint mellékes alkotó rész is igen el van terjedve. Vegyileg főképen magnézium szilikátból áll, de e fémet kisebb-nagyobb mértékben helyettesíteni szokta a kalcium és vas, sőt a mangán is; továbbá kevés kálium és nátrium s végre aluminium is fordul bennük elő. Képlete:  $R Si O_3$  hol R lehet Mg, Ca, Fe stb.

Ezen kívül az ámfibolban még jelentékeny mennyiségű aluminiumoxyd is szokott lenni, amit annak következő, sok elemzés eredménye képen össze állított összetétele mutat\*)

|               |           |   |
|---------------|-----------|---|
| Kovasav       | 40.3—43.8 | % |
| Áluminiumoxyd | 9.3—16.4  | % |
| Vasoxgydul    | 15.3—21.8 | % |
| Calciumoxyd   | 12.1—13.8 | % |
| Magnézia      | 11.7—13.4 | % |

Feltéve, hogy valamely ámfibolban két paránsúly magnéziumra egy-egy paránsúly calcium és vas esik, továbbá mellőzve az  $Al_2 O_3$ -t, annak képletét a metakovasavból,  $(H_2 Si O_3)$  kiindulva eké származtathatjuk le:  $4 H_2 Si O_3 = H_8 Si_4 O_{12}$  vagyis  $H_4 H_2 H_2 Si_4 O_{12}$ . Ebben az illető fémeke helyettesítve lesz  $Mg_2 Ca Fe^{II} Si_4 O_{12}$ .

Elmállását feltünteti a következő képlet:



Szavakban: a szénsav a magnesiummal és calciummal kettes szénsavas sókat, vagyis birkarbonátokat alkot melyek oldatban maradnak mindaddig, mig az oldat szabad szénsavat tartalmaz; de amily mértékben ezen szabad szénsav a lég által, vagy a kőzet felbomlásra hajlandó ásványai által elvonatik, a nevezett sók egyszerű karbonátokká változva, lecsapódnak. A kettedszénsavas vas oldatával, ha ez nagyobb mélységbe szivárog, ugyanez történhetik; ellenben a kőzet felületén vagy a talaj csekély mélységében a lég nemcsak a szabad szénsavat űzi ki, hanem annak oxygen tartalma a vízzel együtt a vasat vashydroxyddá (vasoxgydhydrattá) változtatja, miközben carbondioxyd és víz lesz szabaddá, e képlet szerint:  $2 Fe H_2 (CO_3)_2 + 3 H_2 O + 3 O = Fe_2 (O H)_6 + 2 CO_2 + 2 H_2 O$ . A vasnak vashydroxyddá való átváltozása a kőzet felületén egyébiránt azonnal megtörténik, mihelyt a szénsav a felbontást meg-

\*) Dr. Ad. Mayer, Lehrbuch der Agriculturchemie. Heidelberg 1886.




indította. Ugyanez történik a mangánnal is. Hogy a kiváló orthokovásav  $H_2O$  veszteség által csakhamar metakovásavvá ( $H_2Si_3O$ ) s végre kovafölddé (kovásav-anhydrittá  $SiO_2$ ) változik át, alig kell említeni.

Az ámfibol meglehetősen nehezen és tökéletlenül mállik el, s ahol a földpátokkal együttesen fordul elő, ezeket bár nagy mértékben megváltozva, tuléli. Innen van az ily kőzetekből származott talajban a sok tökéletlenül elmállott rozsdabarna, földes ámfibol törmelék. Az ámfibol teljes elmállása után kávébarna poros tömeg marad hátra, ami vas- és manganhidroxyd, kovaföld és aluminium szilikát keverékéből áll. Utóbbi az ámfibolban változó mennyiségben (lásd fennebb!) jelenlévő, de a képletben egyszerűség okáért elmellőzött, kovásavval együtt kiváló aluminiumoxydból származik.

A Pyroxen csoporthoz tartozó ásványok is igen sok kőzetben előfordulnak mint lényeges vagy mellékes alkotó részek. Különösen a bazaltok, sok trachit és láva összetételében nekik jutott a fő-, vagy legalább is igen lényeges szerep. Az e csoportoz tartozók közül különösen megérdemlik a tárgyalást az augit, hypersten és diallag.

Az augit összetétele ugyanaz mint az ámfibolé, melytől lényegében csak kristályalakja által különbözik. Az ámfiból vegyi elmállásának képletét is teljesen alkalmazhatjuk az augitra, épúgy az elmállás származékai is azonosok. Csak azt jegyezzük meg, hogy az augit könnyebben és teljesebben mállik el mint az ámfibol, s úgy látszik könnyebben azon mésznátron földpátoknál is, melyekkel együtt kőzeteket szokott alkotni. A labradoritnál legalább jóval könnyebben.

A diallag közel áll a tulajdonképeni augithoz. Összetételére nézve áll a kovásavas calciumnak, kovásavas magnesiumnak és kovásavas vasnak különböző arányban való vegyülékéből. Képlete tehát így írható




Az  $Al_2O_3$  benne sokkal kevesebb mint az augitban, mely tekintetben a következővel egyezik.

Elmállása tehát épúgy történik, mint az ámfibolé és augité; de az utóbbiánál nehezebben.



A hiperstén (hypersthen) vegyi összetételére nézve az előbbiektől abban különbözik, hogy legnagyobb részt kovasavas magnesium és kovasavas vashól áll, s utóbbiban különösen gazdag. A vas egy részét itt is helyettesítheti a mangán. Ez is nehezebben mállik az augitnál, de mégis könnyebben az ámfibolnál sőt gyakran a vele együttesen előforduló mész-nátron-földpátoknál is. Az elmállás vegyi folyamatai az ámfibolnál tárgyalattal különben azonosak. Az eredmény kávébarna poros tömeg, mely vashydroxyd esetleg manganhhydroxyd, és kovasav keverékéből áll, s melyet a víz könnyen elmoshat.

A közönséges Olivin sok bazalt s némely trachit jellemző ásványa, mely kovasavas magnesiumból áll, de utóbbit a vas különböző arányban helyettesítheti. Képletét tehát így írhatjuk



Elmállása akképen történik, mint az ámfibolé. A szénsav a magnesiummal bikarbonátot alkotva, azt feloldja, ellenben a kettészénsavas vas csakhamar vashydroxyddá változik a lég oxigénjének hatása alatt, s ezért a mállásnak indult olivinkristályt vékony barna kéreg veszi körül. Különben az elmállás igen nehezen és lassan halad, ami az előbb leírt ásványokkal szemben különösen a mész hiányának tulajdonítható, melynek vegyi rokonsága a szénsavhoz sokkal nagyobb, mint a magnesiumhoz.


A gránát ritkán képezi valamely kőzet lényeges ásványi alkotó részét, mellékesen azonban sok kőzetben előfordul. Különben igen nehezen mállik és a talaj alkotásában egészben véve jelentősége alig van. Áll kovasavas calcium, magnesium, vas, mangán és aluminiumból, s a szerint, amint ezen fémek közül kettő vagy három különböző módon kombinálódik, a gránát is változtatja tulajdonságait, s azok szerint nevét is.

Igy pl. a grossulár képlete:  $\text{Ca}_3 \text{ Al}_2 (\text{Si O}_4)_3$  a piropé (pyrop)  $\text{Mg}_3 \text{ Al}_2 (\text{Si O}_4)_3$ ; az andradité:  $\text{Ca}_3 \text{ Fe}_2 (\text{Si O}_4)_3$  az almandiné  $(\text{Fe Mg})_3 \text{ Al}_2 (\text{Si O}_4)_3$  stb. A vasat mangán is helyettesítheti. Az alumínium tartalmu gránátokat az elmállás előhaladásával agyagrétegecske vonja be; a vas kiválását a sárgabarna vashydroxyd jelzi. A szénsav szerepe ugyanaz, mint az ámfibolnál; de támadásának a gránát még sokkal tovább ellentáll.


A szerpentin magára szokott kőzetet alakítani és kép-



lete leszarmaztathato az orthokovasavbol ( $H_4 Si O_4$ ). Ha ezt ket-szer vesszuk




es a  $H_6$  helyett  $Mg_3$ -t teszunk lesz:  $Mg_3 H_2 Si_2 O_8$ ; ehez meg egy tomeecs vizet veve, kapjuk a szerpentin kepletet:




Az elmallasnak meg kevésbbe van alavetve, mint a steatit, mert azon kivul, hogy a szensavnak makacsul ellenall, meg nagyon tomoitt is, es a lemezessaget nelkulozve, a porladasnak is kevésbbe van kiteve.

A steatit (zsirkő, Talk) sok kőzetben leveles vagy pikelyes tömegeket alkot, ritkábban fordul elő lemezekben, mint a csillámok, melyeket gyakran helyettesít, és azokhoz ásványtanilag közel áll. Képlete az orthokovasavból levezethető:



Ámbár a légköri szénsav hatásának oly nagy mértékben ellentáll, hogy felbomlásáról alig beszélhetünk, mindazonáltal nem kételkedhetünk benne, hogy a növények gyökerei belőle a szükséges magnesiumot sóoldat alakjában felvenni képesek.


Az előbbiekhöz csatlakozik, de egyuttal a következőkhez képez átmenetet a zöldes színű chlorit, mely finom lemezkés és rostos tömegeket alkot sok kőzetben. Vegyi összetétele



A képlet úgy fogandó fel, hogy a zárjelbe foglalt  $(Mg_1 Fe)_{12}^{II}$  összesen 2 értéket képvisel, míg a  $(Fe_2)_3^{III}$  csak mint az  $Al_2$  helyettesítője jó tekintetbe. Elmállásra való hajlandósága ép oly csekély, mint előbbiekké. A mennyiben felbomlásra képes, belőle szénsavas magnesium szabadul ki, s a végtermény lesz agyag és vashydroxid.


Mineralogiai és kőzettani szempontból előbbieket után kell tárgyalnunk a csillámokat, melyek számos kőzet alkotásában igen lényeges részt vesznek, másokban jellemző, másokban megint mellékes alkotó részek képen szerepelnek. Állanak általában kálium, nátrium, magnesium, aluminium és vas szilikátok vegyületéből. Fajai közt különösen a kálicsillámot és a magnézia-csillámot kell megemlítenünk. A fehér muszkovit vagy káliumcsillám képlete az orthokovasavból leszarmaztatható és így írható:





azon megjegyzéssel, hogy a K kis részét Na is helyettesítheti, más felől pedig a Fe-t az Al többé kevésbé kiszoríthatja. A muszkovit majd oly teljesen ellentáll az elmállásnak mint a kvarcz; mit az is bizonyít, hogy az atmoszféra vegyi hatásaival számtalan évezred alatt a homokban épűgy daczolt, mint a kvarcz.

A biotit vagy magnézia csillám alkotó részeihez tartozik a káliesillám elemein kívül még a magnesium is. Vegyi képlete ha a Fe-t kihagyjuk:



mely 36 orthokovaszavból leszármaztatható, ha abból előbb 9 H<sub>2</sub> O-t levonunk. A zárjelbe foglalt K N H egymást különböző arányban helyettesíthetik, úgy azonban, hogy összes vegyértékük 14 legyen. Az Al-t részben a <sup>II</sup>Fe helyettesítheti. Elmállása ennek is oly nehéz mint az előbbié, csakhogy a szénsav és éleny hosszas hatása folytán úgy látszik meghalványul és színére nézve a muszkovithoz közeledik.

Menjünk át most azon fontos szilikátokra, melyek a talaj fizikai tulajdonságait oly kedvezően befolyásoló agyagot, valamint a növényi hamu alkatrészeknek legnagyobb mennyiségét szolgáltatják. Ezek a földpátok, melyeknek összetétele igen változó.

Tschermak\*) felfogása szerint a földpátok számos faja közt három törzsfajt lehet megkülönböztetni, melyek néha a jó kristály fészkekben (Drusenräumen) elég tiszta állapotban találhatók. Ezek a következők:

Adulár vagy káliföldpát, mely az egyhajlású (monoklinos) rendszerben kristályosodik és két, egymásra merőleges irányban hasad. Áll kovaszavas káliumból és kovaszavas aluminiumból Albit vagy natron földpát, kristályosodik a háromhajlású (triklinos) rendszerben; a tökéletes hasadás síkjai egymással 86 fokú szöveget zárnak be. Áll kovaszavas natrium és kovaszavas aluminiumból. Végre az anortit, vagy mészföldpát, mely kovaszavas calciumból és kovaszavas aluminiumból áll és kristályrendszerére, valamint hasadási síkjai irányára nézve az albittal egyezik.

Ezen törzsfajok összetételének képzelhetjük most már valamennyi, a közetekben előforduló földpátot, melyek e szerint vegyi és fizikai tulajdonságaikban is hol egyikhez, hol másokhoz hasonlítanak inkább.

Vegyi összetételükre nézve közel állnak és kristály rendszerükre valamint hasadási síkjaik irányára nézve az adulárral megegyeznek az ortoklász és


\*) Sitzungsber. der kais. Akademie der Wissenschaften Bd. L. I. Abt. pag. 566.








Az oligoklász vagy mésznátron földpát lényeges részt vesz sok kőzet alkotásában, hol közönségesen kristályos szemcsékben jelenik meg, melyek színe sárgásba vagy zöldesbe áthajló fehér. Csak hasadási síkjaikon üvegfényűek, másutt zsírfényűek, vagy homályosak; csak alig áttetszők. Az oligoklászt úgy lehet felfogni, mint 2—3 tömecs álbitnak 1 tömecs anortittal való elegyét (l. alább). 2 tömecs álbitot véve fel, a képlet lesz




Az andezin áll egy tömecs álbitból és egy tömecs anortitból, tehát képlete




Sok eruptív kőzet alkotásában vesz részt.

A labradorit sok bazalt s más eruptív kőzetek lényeges alkotó része, s az oligoklászhoz igen hasonlít. 1 tömecs álbit és 3 tömecs anortit vegyületének mondhatjuk. Képlete e felfogás szerint:



Vége az anortit, mint tiszta calcium-aluminium-silicat, épúgy mint az adulár és álbit, csak tudomány szempontjából bir fontossággal. Képlete:




mely 2 tömecs orthokovaszvból egyszerűen a  $\text{H}_8 (= \text{H}_2 + \text{H}_6)$ -nak Ca és  $\text{Al}_2$ -vel való helyettesítése által származtatható le.

A földpátok felbomlása talajképzés tekintetében rendkívül fontos, mert ez által a minden termékeny talajban jelenlévő agyag, s ezen kívül számos növényi tápanyag keletkezik. A földpátokból már a tiszta víz is képes feloldás által kalium és natrium szilikátot kivonni, s így azok összetételét megrendíteni; s ez úgy látszik kiváltképen a káli és nátron földpátokról áll. Azonban már oldó képességét, s még inkább bontóképeségét illetőleg, nagyobb fontosságot kell tulajdonítanunk a szénsav tartalmu vizeknek. A földpátok felbomlását két féle módon képzelhetjük. Vagy összeköti magát a szénsav az alkálikkal és a mészszel kovasz kihajtása mellett, vagy csak feloldja a víz a kovaszvas alkálikat és a szénsav csak a mészszel egyesül, kettészénsavas mész oldatát




hozván létre. Az alkálik és mész mindkét esetben eltávolíttatnak éppúgy az oldható állapotban kiválott kovasav is. Ellenben az alumíniumoxyd a kovasav egy részével összeköttetésben marad, vizet vesz fel és alkotja azon finom földes anyagot, a melyet tiszta állapotban kaolinnak, vagy porcellánföldnek neveznek (l. fennebb 15. lapon).

Minthogy minden földpátot az ádulárból, álbitből és anortitből összetettnek gondolhatunk, elegendő, ha ezeknek, mint a földpátok legközelebbi alkotó részeinek elmállásával megismerkedünk. Vegytani szempontból azt kellene feltennünk, hogy mentől több calciumot és mentől kevesebb kovasavat tartalmaz valamely földpát, annál gyorsabban mállik el az a szénsav hatása alatt. Így tehát az összetett földpátoknak leghamarább az anortit tartalmát támadná meg a szénsav. Ennek felbomlása kitűnik a következő képletből:



A nátron földpát elmállását így képzelhetjük:



Éppígy foghatjuk fel a káli földpát elmállását is, csakhogy fennebbi képletben Na helyett K teendő.

Azonban több mint valószínű, hogy a K vagy Na egy része kovasavval vegyülve, tehát mint K vagy Na szilikát hagyja el az ásványt, kivált ha mellettük mész is van jelen, melyen a  $\text{H}_2 \text{CO}_3$  hatása megkezdődött.




Ennek megvilágosítására vegyük fel pl. a labradoritot:

$$\text{Na}_2 \text{ Ca}_3 \text{ Al}_8 \text{ Si}_{12} \text{ O}_{40} + 12 \text{ H}_2 \text{ O} + 6 \text{ H}_2 \text{ CO}_3 = 3 \text{ Ca H}_2 (\text{CO}_3)_2 + \\ + \text{Na}_2 \text{ H}_2 \text{ Si O}_4 + 3 \text{ H}_4 \text{ Si O}_4 + 4 [\text{H}_2 \text{ Al}_2 (\text{Si O}_4)_2 + \text{H}_2 \text{ O}]$$


Az egyes földpátfajok elmállásának viszonylagos gyorsaságára nézve a nézetek nagyon eltérők. Némelyek (pl. Senft) elméleti alapon azt tartják, hogy mentől több a mésztartalom, annál könnyebb a földpát elmállása; Girard\*) ellenben a természetben tett megfigyelései alapján azt állítja, hogy legkönnyebben elmállik az oligoklász azután az ortoklász, s végre sokkal nehezebben a labradorit; míg az andezinre és az anortitra nézve elegendő adattal nem birunk. Ott, ahol az oligoklász az ortoklászszal együtt fordul elő ugyanazon kőzetben, valóban előbbi sokkal gyorsabban elmállik.

Ezen vegybontás azonban igen lassan halad előre. Eleinte a földpát felületén csak a fény elvesztése, a bágyadtság látszik meg, később megpuhul, meglágyul s végre egészen földessé lesz. A káolin azonban csak ritkán található tiszta állapotban, hanem a földpátok és más, annak társaságában fellépő ásványok mállási termékeivel, u. m. kovafölddel, szénsavas mészzsel, vashydroxyddal, finom homokkal stb. van keverve. Ezen keverék, vagyis az így tisztátlanított káolin nem egyéb mint az ismert agyag. A földpátokat némely lávában és fiatalabb bazaltban pótolja a következő két ásvány.

Leucit. Vegyképlete:




Ez leszámaztatható a metakovasavból  $\text{H}_2 \text{ Si O}_3$ . Ezt 4-szer véve



melyben  $\text{H}_2$  és  $\text{H}_6$  helyett  $\text{K}_2$  illetve  $\text{Al}_2$ -t téve, kapjuk fennebbi képletet.

Elmállását, melyre nézve a földpátokkal egyezik, következő képlet világosítja meg:




A nefelin (nephelin) képlete  $(\text{K}_1 \text{ Na})_{14} \text{ Al}_{14} \text{ Si}_{16} \text{ O}_{60}$ . Amint ebből látható, K és Na különböző arányban helyettesíthetik egymást, de mindazonáltal úgy, hogy kettőjük vegyértéke összesen 14 legyen.


\*) Grundlagen der Bodenkunde Halle, 1868.





Fennebbi képletet következőképen származtathatjuk le az ortokovasavból:




Hogy a képletnek határozott alakot adjunk, felveszünk S vegyérték kaliumot és 6 vegyérték natriumot. E feltétel mellett  $\text{H}_{56} \text{ Si}_{16} \text{ O}_{60}$  ezélszerűen szétválasztatván, fennebbi kovasavat így írhatjuk  $\text{H}_8 \text{ H}_6 \text{ H}_{42} \text{ Si}_{16} \text{ O}_{60}$ . Ebben  $\text{H}_8$  és  $\text{H}_6$  helyett  $\text{K}_8$  és  $\text{Na}_6$ ,  $\text{H}_{42}$  helyett pedig az ugyanoly értékű 7  $\text{Al}_2$ -t, vagyis  $\text{Al}_{14}$ -t téve. kapjuk a nefelin képletét:






Elmállása képletének leszámaztatását, mely a földpátoknál és leucitnál tárgyalattakkal megegyezik, e könyv használójára bizzuk. A földpát leucit és nefelin tartalmu közetekben, mint ez ásványok elmállási terményeiből utólagosan alakult ásványok, előfordulnak a zeolitok (zeolith), melyek mint a földpátok, kovasavas aluminiumból és kovasavas calcium-natrium- és kaliumból állanak; de ezen kívül  $\text{H}_2 \text{ O}$ -t vagy vizet is tartalmaznak vegyileg megkötve. Ezen kívül bennük rendesen a Ca és Na nyomó, míg a K alárendelt. Vegyi összetételük egyébiránt igen különböző. A számos faj képviselőjéül a *chabasit* (olv. szabazit) választjuk, melynek képlete:



Feltéve, hogy valamely *chabasit*-ban mind három utóbbi fém előfordul, a képletet meg háromszorozva így is írhatjuk:




E képletet így bonthatjuk szét:



Ha az ily összetételű ásvány szénsavval és vízzel jó húzamosan érintkezésbe, elegendő, ha a szénsav a calciumot magához ragadja; mert ekkor a zeolith már felbomlik a többi, vízben, oldható alkálszilikátjaira és kaolinra a következő képlet szerint:





Természetes, hogy a K és Na egy részét is lefoglalhatja a szénsav, s ez esetben több kovasav válik ki.

Csekélyebb mértékben vannak elterjedve a kőzetekben a kovasavat nem tartalmazó ásványok, melyek közt legfontosabbak a carbonátok vagyis szénsavas vegyek.

A mészpát vagy calcit, arragonit, dolomit és vaspát mind karbonátok, mégpedig a két első a calciumnak, a második ennek és a magnesiumnak, a harmadik pedig a vasnak szénsavval való vegyülete. Mindezen karbonátokat a szénsavtartalmu víz a felületen lassanként, csak oldott állapotban ismeretes bikarbonátokká változtatva feloldja és elmossa.

E bikarbonátokat a víz azonban csak szabad szénsav jelenlétében képes oldatban tartani. Bármilyen úton veszíti el utóbbit a víz, azonnal felbomlik a bikarbonát, egyszerű karbonáttá változván, és második tömecs szénsavát a víznek átadva, lecsapódik.

Ezen folyamatnak ismerete kezünkbe adja a kulcsot néhány érdekes ásványi képződmény magyarázatához.

Lássuk először a mészpátot. A hol a földből kibugyogó szénsavas források mészbikarbonátot tartalmaznak, ott partjaikon és fenekükön forrásmeszet raknak le; mert a csörgedező forrásvíznek alkalmá van szabad szénsavát a körléggel kicserélni. A hol mészhegyeket erdők borítanak, ezek lombjából s más hulladékaiból sok kárbondioxyd fejlődik ki a korhadás folytán, melyet a talaj véze beiszik, abszorbeál, vele  $H_2 CO_3$ -má egyesül és segédmélével szénsavas meszet old fel. Ha ily víz alantabb mint forrás tör elő, a fennebb leirt módon forrásmeszet képez s avval maga előtt az utat eltorlaszolva, jobbra balra kitér, a gyepet, zúzmó- és mohatakarót mészkéreggel vonja be, és azon szivacsos szerkezetű, felette könnyű mészkövet rakja le, mely mésztuff név alatt ismeretes és igen könnyen szállítható, faragható sőt fűrészelhető épületanyagot szolgáltat. Ugyanezen okra vezethető viszsza a cseppkő eredete is.



A dolomit mészkarbonát tartalma ugyanazon változáson megy át; annak szénsavas magnesium tartalma hasonlóan magnesiumbicarbonáttá alakul, mely egyik szénsavát elvesztvén egyszerű szénsavas magnesiummá lesz, de kicsapódása közben vizet is vesz fel:  $\text{Mg CO}_3 + 3 \text{ H}_2 \text{ O}$ .

A vashidrogén-karbonát-oldatból a léggel való érintkezésre azonban nem egyszerű vaskarbonát, hanem vashidrogén-oxid csapódik le; mert az oxygen és a víz egyesült erővel kiűzi a szénsavat az összeköttetésből. A levegővel érintkező, nyugvó tükrű, vashidrogén-karbonát-tartalmu vizek felületén a szivárvány színt mutató végtelen finom bevonat a képződő vashidrogén-oxidtól származik\*). Ez mielőtt jelentékenyebb vastagságot érne el, származott szilárd tömegei lesüllyednek s a víz fenekén levő minden tárgyat sárgabarna finom iszap alakjában vonnak be. Így képződik a mocsárvas és a vasokker. — Ha ellenben a vashidrogén-karbonát tartalmu víz a sziklák repedékein és rétegei közt a mélységbe hatol, hol oxygenal nem érintkezhetik, és ha eközben a víz szabad szénsavát, valamint a bikarbonát egyik szénsav tömegeit a kőzetek bizonyos alkatrésze, pl. kalcit, különböző szilikátok stb. elvonják, akkor itt is beáll azon eset, hogy egyszerű vaskarbonát csapódjék le, vaspát alakjában.

Mindezen ásványok természetesen magában a talajban, annak legfinomabb hézagaiban is képződhetnek, ha ott az ahoz megkívántató feltételek megvannak; habár azokat finom elosztásuknál fogva, mint ásványokat, szabad szemmel felismerni nem is tudjuk.

Ami az oldhatóság fokát illeti, az annál nagyobb, mennél gazdagabb a víz a szénsavban, és mennél finomabbul van osztva, vagy víz által mennél könnyebben átjárható az illető ásványtömeg. Így pl. szénsavval telített vízben a kicsapódás által keletkezett mész oldhatósága  $\frac{1}{500}$ -nál a krétáé  $\frac{1}{1000}$ -nel is nagyobb lehet, míg a kalcit poré  $\frac{1}{1600}$ -at is meghaladhat; a vaskarbonaté körülbelül  $\frac{1}{1600}$  a dolomité  $\frac{1}{3500}$ .

Az apatit nem alkot ugyan kőzeteket, de igen sok kőzetben mint lényegtelen alkatrész fordul elő; azonkívül fel lehet tennünk, hogy minden, növényzetet táplálni képes talajban is végtelenül elosztott állapotban lappang. Megemlítése azért szük-


\*) Azonban más anyagok is, pl. kőolaj, okozhatnak szivárványzó felületet.



séges, mert a növények táplálására annyira fontos phosphorsav ezen ásvány vegyi összetételéhez tartozik; ugyanis phosphorsavas calciumból áll, melyhez még chlorcalcium vagy fluorcalcium is csatlakozik. Képlete:  $\text{Ca} (\text{Cl} \text{ Fl})_2 + 3 (\text{Ca}_3 \text{ P}_2 \text{ O}_8)$ . A víz, kivált ha szénsavat, s még inkább humuszsavas alkálikat, ammoniasókat, salétromot vagy konyhasót tartalmaz, képes ez ásványt is kis mértékben feloldani.


A magnetit, a vörös- és a barnavaskő, mindnyájan a vasnak oxygennal való vegyületei; de utóbbi még vizet is tartalmaz. A magnetit és vörös-vaskő, s még inkább a barnavaskő, makacsul ellenállanak a légkörbeli hatóknak; bizonyos körülmények közt azonban, pl. ha az oxygentől elzárt nedves helyeken korhadó szerves anyagokkal jönnek érintkezésbe, desoxydatio és ferri-sók képződése állhat be; mely utóbbiak oldott állapotban más körülmények közé jutván, vagy bármely úton oxygennal érintkezésbe jöven, vashydroxyddá változnak (l. fennebb 27. lapon). Ezenkívül a magnetit oxygen és víz, a vörösvaskő pedig ez utóbbi felvétele által egyenesen is átmehetnek lassanként barnavaskőbe, illetve átváltozhatnak hydroxyddá.

A pyrit és markasit (olv. pirit és márkázit) mindketten ugyanazon összetétellel birnak:  $\text{Fe S}_2$ . A lég oxygenjának hatása alatt is ugyanazon átváltozáson mennek át, ami egyelőre abból áll, hogy oxygen felvétel folytán, kénessav fejlődése mellett, kénsavas vassá\*) változnak át, amint alábbi képlet mutatja:



A pyrit és markasit felbomlása igen gyorsan megy és a kőzetek elmállására igen nagy jelentősége van; mert ez ásványok igen sok kőzetben fordulnak elő, és bomlási terményeik, amint alább látni fogjuk, további erélyes vegybontásokat idéznek elő a kőzetnek más ásványain. A fennebb leírt átalakulással ugyanis még nincsenek befejezve a megindult vegyi folyamatok. A kiszabaduló kénessav akár szénsavas mészszel, akár szilikátokkal, pl. földpátokkal, augittal v. ámfibollal stb. jó érintkezésbe azokat, további oxygen felvétele mellett megtámadja, s a szénsavat illetve

\*) A kénsavas vas 7 tömees vízzel alkotja a kristályos vasgáliczot, vagy zöld gáliczot:





kovasavat kihajtván, a fémekkel (kalium, natrium, calcium, magnesium, aluminium, vas stb.) egyesül, s az így képződött oldható sók a kőzetből kimosódnak. De még evvel sincs vége a bomlások sorának; mert a kezdetben képződött vasgálicz sem nyugszik meg. A vízben könnyen feloldódva és elmosódva, ahol oldata szénsavas és kovasavas vegyületeket talál a kőzet felületén, repedéseiben likaicsaiban, ott a víz által elnyelve tartott oxygen felvétele folytán vashydroxyddá válik és a kiszabaduló kénsav, úgy amint előbb már mondvá volt, hathatósan bontja fel a talált ásványok majd mindenikét; miközben a vashydroxyd lerakódik. Innen erednek a sárgás vagy barnás sávok a pyrit tartalmu kőzeteknek s a bányákból kihordott kőhányásoknak (Halden) málló felületén. Így magyarázhatjuk meg a bányákból kifolyó gáliczos vízből a csermely ágyát képező minden szilárd testre lerakódó barna kéreg eredetét; csak hogy itt a vízben feloldott szénsavas, s esetleg kovasavas álkálik is közre működnek a vashydroxyd képzésében és kicsapásában.

#### IV. A kőzetek elmállása vegyi úton.

Víz, oxygen és szénsav a fennebbiek szerint szünet nélkül a kőzeteket alkotó ásványoknak felbontásán és feloldásán dolgoznak. Azon roppant mennyiségű víznek, mely eső és hó képében lehull, s melyet a csermelyek, patakok, folyók, folyamok vize szünet nélkül a tenger felé hömpölyget, egy cseppje sem hagyja el a földsegeket (Continens) a nélkül, hogy kimutatható mennyiségű oldott anyagot ne vinne magával. Leginkább meg vannak terhelve ásványi anyagokkal az u. n. ásványvizek. Így tartalmaz pl. a szklenói Vilma forrás 1 literben 2·25, a polhorai víz 44·15, a koritniczai 2·95, a tusnádi 3·58 gramm szilárd alkatrészeket<sup>1)</sup>, melyekben a kőzetek minden alkatrészét megtaláljuk kisebb-nagyobb mennyiségben. De éppúgy megtaláljuk azokat a kőzetek felbomlásának és oldhatóságának arányában a hegyi forrásokban is habár csekélyebb mennyiségben. Ezek ugyanis literenként 0·5—0·6 g. szilárd anyagot tartalmaznak<sup>2)</sup>. E szilárd anyagok fő alkatrésze a szénsavas és kénsavas mész; ezen kívül magnézia, káli, nátron,

<sup>1)</sup> Szabó, Geologia, 357. l.

<sup>2)</sup> Appelt, Pflanze u. Boden. 1889.



ammoniók, vas, mangán, chlor, salétromsav, kovasav, phosphorsav stb. A növények táplálására szolgáló főbb anyagokat véve tekintetbe, tartalmaznak a források 44 elemzés átlagában literenként<sup>1)</sup>: Ca O 2—241, Mg O 0—72, K<sub>2</sub> O nyom — 9, Na<sub>2</sub> O nyom — 121, NH<sub>3</sub> 0—3·3, SO<sub>3</sub> 0—184, N<sub>2</sub> O<sub>5</sub> 0—20, N<sub>2</sub> O<sub>3</sub> 0—0·6, Cl nyom — 76. A források ezen ásványi anyagoknak egy részét megint átadják azon talaj-, illetve földrétegeknek, melyekkel érintkeznek. Így különösen a szénsavas meszet ha nagyobb mennyiségben tartalmazza, azt lassanként megint lerakják, méginkább a vasat. Az esővíz, mely a kőzeteknek csak felületén fut le, sokkal szegényebb ásványi anyagokban; s mivel a folyók vize részint forrás- részint esővízből áll; ennél fogva ásványi anyagokban a forrásoknál szegényebb, s átlag 1 literben 0·12—0·25 gramm szilárd anyagot tartalmaz. A Duna vízének 1 literében (Bécsnél<sup>2)</sup>) van szénsavas-mész 0·0837, szénsavas magnézia 0·0150; kovasav 0·0049 vas-oxyd 0·0020, kénsavasmész 0·0029, kénsavas magnézia 0·0137, kénsavas nátron 0·0020, chlorkaliumnak és chlornatriumnak nyoma; összesen 0·1242. A Themseben Greenwichnél találtatott közel 0·40 gr. 1 literben, melyből közel 0·25 a szénsavas mészre esik. A Duna tehát aránylag csekély mennyiségű kőzetanyagot tartalmaz feloldott állapotban és mégis, ha az évenként ily állapotban lezállított anyag mennyiségét kiszámítjuk, bámulatos összeget kapunk ki. — Hunfalvy János adatai szerint<sup>3)</sup> kiszámítva, a Duna Budapestnél a víz közepes magassága mellett másod perczenként mintegy 73000 köbláb vizet hőmpölyget lefelé, ami 2300 köbméternek felel meg. Feltéve — ami fel is tehető — hogy a vízben oldott szilárd anyagok mennyisége Budapestnél is körülbelül annyi, mint Bécsnél, azaz 1 literben 0·1242 gramm, vagyis 1 köbméterben 0·1242 kilogramm, akkor lemegy a Dunán Budapestnél évenként 9 ezer millio kilogrammnál, vagyis 90 millio métermázsánál több feloldott kőzet. Ha továbbá Sonklar adatának, hogy Orsovánál a Dunában másoperczenként közép vízállás mellett 324,000 köbláb, vagyis 10238 köbméter víz foly el; akkor e folyamnál évenként 400 millio métermázsa kőzet hagyná el ha-

<sup>1)</sup> Dammers Lexicon, pag. 925—926.

<sup>2)</sup> Bischof, Geologia, Bonn, 1863. I. 271. l. átszámítva.

<sup>3)</sup> A magyar birodalom természeti viszonyainak leírása, III-ik kötet Budapest, 1865. pag. 185. és 189.



zánk határát. Nem mond tehát igen nagyot a Geolog midőn azt állítja, hogy évenként láthatatlan hegyeket nyel el a tenger, és új kőzeteket képez azokból. Kell-e ennél nagyobb szerű bizonyítvány, a kőzetek lassankénti vegyi felbomlására és feloldódására nézve?

De ezen vegyi felbomlás és oldódás a melegnek, víznek és fagynak már ismertetett működésével karöltve munkálkodik, úgy hogy a kőzetek felületén mutatkozó elmállási jelenségek a fizikai és vegyi erők együttes működése eredményeinek tekintendők; habár a vegyi működésnek általában véve sokkal nagyobb része van az eredményben. Azért az alábbiakban együttesen tárgyaljuk az egyes kőzeteknél ismeretes elmállási tüneteményeket.

Ezek kiválóan azon ásványoktól függenek, melyekből a kőzet áll; mert ezek felbomlásának vagy feloldódásának gyorsasága, és a bomlási terményeknek egymásra és a kőzetre való visszahatása, az egyes kőzeteknél különbözően módosítja az elmállás lefolyását. Ez egyébiránt a szilikátkőzeteknél, azok fényének megbágygyadásával, a színeknek elhalványodásával kezdődik, a felületen számtalan apró repedések támadnak, az poros kinézésüvé, földessé lesz; a földesség mind beljebb és beljebb hatol, míg a könnyebben mállók földes tömeggé hullnak szét, mely a nehezebben málló ásványok által képezett törmelékkel van keverve.

Még a kőzet lényeges ásványi alkatrészeiből nem lehet biztosan következtetni az elmállás gyorsaságára és lefolyására; mert ezt némely mellékes (accessoricus) alkatrész pl. a pyrit, igen lényegesen módosíthatja; de ezen kívül a kőzet szerkezete, települési viszonyai, környezete s általában külső körülményei is befolyással vannak arra. Minden oly szövet és települési viszony mely a víznek behatolását és a kőzet mechanikai szétrombolást elősegíti, pl. a likacsosság, lemezesség, repedezettség, a rétegeknek nyílt fekvése, (midőn t. i. a föld felülete őket metszi), valamint a durvaszemcsés szövet is, gyorsítja; ellenben a finom szövet, tömörttség, repedések hiánya, a rétegek zárt fekvése stb. hátráltatják az elmállást. Végre gyorsabb az meleg és nedves, ellenben lassabb száraz és hideg klimában; gyorsabb nedves növénytakaró alatt, mint oly kopasz sziklafalakon, melyek a nedvességet nem tartják stb. Leggyorsabb pedig és legtökéletesebb ott, ahol a kőzetet szénsavban gazdag víz járja át folytonosan, mert annak csak a tiszta kvarcz állhat ellent.



Az elmállásra, s ez által közép mélységű talaj képzésére, szükséges idő nagyságát a tudomány mostani állása szerint még meghatározni nem lehet; hanem annyi bizonyos, hogy e folyamatokra rendkívül különböző, de némely szilárd és ép kristályos kőzetnél roppant hosszú idő, — nemcsak századok, hanem ezred évek szükségesek. Ez ellentétben látszik lenni avval, a mit a vizek által szállított kőzetanyagról fennebb mondottunk. De ha meggondoljuk, hogy mily roppant területről ered azon feloldott kőzetanyag, melyet egy oly folyam, mint a Duna, magával visz; akkor ezen ellentét elenyészik.

Dietrich kísérletei szerint a légköri hatóknak 2 évig kitéve, szolgáltattak\*)

|              | finom földet | apró követ |
|--------------|--------------|------------|
| a homokkővek | 2·3 %        | 8 %        |
| tarkahomokkő | 2·5 %        | 49 %       |
| kagylómész   | 0·8 %        | 9 %        |
| bazalt       | 0·6 %        | 1 %        |

Lássuk már most az általánosan elterjedett, honunkban gyakrabban előforduló s egyszersmind a talajképződésére fontosabb kőzetek elmállásánál észlelt jelenségeket.

A kőzetek előszámlálásánál nagyjából Hauer beosztását követjük, mely elég egyszerű és céljainknak megfelelő.

#### A) *Kristályos tömeg-kőzetek.*

A Gránit kovasavban gazdag földpátnak (ortoklász, oligoklász) kvarcczal és csillámmal való elegye. Néha azonban kevésbé savas földpát, (pl. az andezin) is hozzá járul összetételéhez. A csillám lehet fekete (biotit) vagy fehér (muskovit), vagy pedig mind kettő. Néha jelentékeny mennyiségben fordul elő benne (kivált a biotitosban) az amfibol is, s ha egy idejűleg a kvarcz apad, átmehet a kőzet szienitbe. Steatit-granitnak vagy protaginnak nevezetik az olyan, melyben a fekete csillám mellett zöldes zsírfényű pikkelyek is jelentékeny mennyiségben vannak jelen, a csillámot többé-kevésbé helyettesítve. — Az ásványi alkotó részek mennyiségére nézve a kvarcz van legkisebb ingadozásnak alávetve, mely ritkán tesz ki többet 30—40 % -nál, a földpát és

\*) Dr. Ad. Mayer már id. munkája II. r. 26. l.



csillám viszonya azonban nagyon változó, mert előbbi meghaladhatja az 50, sőt elérheti az 55 %-ot is, midőn a csillám mennyisége 15 %-ra száll le. Ez esetben szokott a földpát nagy kristályokban válni ki. Máskor ellenben a csillám haladja meg az 50 %-ot s a földpát ekkor 15—20 %-ra száll le. A három fő ásványi alkotó részt a gránitban mint szemcséket (kvarcz), jól hasadó kristályos részeket (földpát), vagy lemezkéket (csillám), mindig meg lehet különböztetni, többnyire szabad szemmel is. A gránit nagyobbára durva szemcsés; de lehet tömege igen finom szemcsés is, melyben egyes nagy földpát kristályok tűnnek fel. Az ilyet porfirszerű gránitnak mondják.

A tulajdonképeni gránitok vegyi összetételükre nézve tartalmaznak 70—73 % kavasavat, 6—9 % kálit és nátront (utóbbit rendszeren csekélyebb mennyiségben mint előbbi); 12—19 % alumíniumoxydot, 2—4 % vasoxydult, 2—4 % calciumoxydot és magnéziumoxydot. \*)

A gránit szikla rendszeren vastag táblákra, s ezek megint kőtuskókra vannak szétválva, ami a víznek mélyre való hatolását elősegíti, a felületet sokszorozza és így az elmállás erélyét fokozza. Mindazonáltal a tömöttebb, kvarczban gazdagabb és kavasavban egyáltalában dúsabb, a földpátok közül legfőképen orthoklászt tartalmazó gránitok ezredévig daczolhatnak az elmállással, amint ezt az ilyenből készült építmények, emlékkövek stb. bizonyítják. Az ily gránitok földpátja ép és üvegfényű, nem repedezett és szerkezete finom. A gránitnak mondaszerű állandósága azonban korántsem általános, sőt csak is egyes kedvező esetekre vonatkozik; a legtöbb esetben meglehetősen mállik, mint ez a durva szemcsés és plagioklászokban dús fajtnál tapasztalható. Ez ásványok igen könnyen elvesztik jeles hasíthatóságukat, bágygyadtak, viaszszerűek s aztán földesek lesznek s ha az egész kőzet át van a plagioklászoktól hatva, annyira elveszti végre összetartását, hogy egy ütésre egész szikladarabok ködarává hullnak szét, melynek kvarcz-, csillám- és már megtámadott orthoklászából álló, és az oligoklász földes málladékával kevert szemcséi a kőzet szerkezete szerint nagyobbak vagy kisebbek. Az orthoklász néha igen sokáig ellent áll az elmállásnak. Ezt mutatja sok homoknak jelen-

\*) Hauer, Geologie, 1878.



tékeny orthoklász tartalma és az ismert ikerjegeceknek szántóföldeken való előjövetele. Azonban nem mindig a fennebbi módon foly le a gránit elmállása. Néha ugyanis a földpát benne általában elvesztvén fényét, a közet szinei mindinkább elmosódnak, a csillám felülete vashydroxyd kiválása folytán megbarnul, s végre fehér vagy halványsárgás kaolin marad hátra kvarcz szemekkel és kevés fehér csillámmal keverve. Ezen teljes elmállás azonban nem gyakori. — *Bischof* szerint a gránit földpátjában lévő csekély vastartalom jelentékenyen elősegíti annak felbomlását; mert ez oxygen tartalmu nedvesség jelenlétében oxydálódik. Ezért árulja el szerinte a gránitok elmállásának megkezdődését a felszínnek megvörhenyesedése. Nevezett szerző azt állítja, hogy a csillámok szélein lerakódó porszerű vashydroxyd nem ezekből, hanem a földpátokból származik, melyekben — mint nem lényeges alkatrész — kevés vas is szokott lenni.

A szilikát kőzetek elmállásának gyorsaságát a talajtanok leírásai szerint hajlandó az ember igen kedvezően megítélni. Ezt a kedvező nézetet támogatják azon tapasztalatok, melyeket az ember a kőzetekben tett bevágások sziklaoldalain néhány év alatt tehet. De ezen tapasztalatok könnyen tévutra vezetik az embert, ha nem gondolja meg, hogy e bevágások rendesen már a légbeliek hatásának évezredek hosszú sora óta ki voltak téve, miután a víz a kőzetek repedésein, elválási lapjain, rétegein nagyon messze behatolhat. Ily téves nézetek helyre igazítására szolgálhatnak talán azon számítások, melyeket a már ismert adatok alapján tehetünk. E számítások nincsenek ugyan elég szilárd alapra fektetve, mindazonáltal elég jók arra, hogy meggyőzzenek a kristályos kőzetek elmállásának lassú menetéről.

Egy ily számítást kísértünk meg a következőkben:

Tegyük fel, hogy valamely gránitban a kalciumoxyd és magneziumoxyd együttesen 3%-ot tesz ki; ami nagy átlagban így is van. Tegyük fel, hogy 35 cm. vastag talajréteg képzéséhez 30 cm. vastag gránit réteg szükséges; mert igaz, hogy ha az összes kőzetanyag talajjá változnék, akkor kevesebb is elég volna, de arra is kell számítnunk, hogy ez idő alatt a kőzet anyagának 15–20%-a, részint oldott állapotban, részint iszap alakjában elmosatik. Egy 30 cm. magas és 1 dm<sup>2</sup> átmetszetű gránitoszlopocska súlya kereken 8 kgr. Ebben van fennebbi adat szerint 0.24 kgr. Ca O és Mg O. Egy gránit hegységből eredő forrásvíz tartalmazott\*) literenként átlag 39 milligramm = 0.000039 kilogramm CaO-t és MgO-t. Feltéve azon kedvező esetet, hogy az 1 dm<sup>2</sup>-ra lehulló évi csapadékokból 4 liter szívárog le a szikla mélyébe a források vizének táplálására\*\*). Ez tartalmaz 0.000039 × 4 = 0.000156 kgr. CaO-t és MgO-t. Ha ez mind a kőzet felső rétegéből eredne, akkor kellene 0.24 kgr. Ca O és Mg O feloldására 1538 évnek

\*) Appelt Pfl. u. B. 127. 1.

\*\*) Lásd ennek okadatolását a mészkőzetek elmállásánál!



lehulló csapadéka; mert  $0.24 : 0.000156 = 1538.5$ . De fel kell tennünk, hogy ama  $\text{Ca O}$  és  $\text{Mg O}$  a forrásokban nem csak a felső rétegből eredett, hanem valószínűleg több mint fele részben a szikla mélyében oldódott fel. Így hát azon idő mely szükséges lenne, hogy egészen ép gránitból a felvett körülmények közt 35 cm. vastag talajréteg képződjék, mintegy 3000 évre tehető.

A szienit ép oly szemcsés kőzet mint a gránit, de összetételében lényegesen csak két ásvány faj vesz részt, u. m. a kovasavban gazdag orthoklász vagy e mellett még más, a gránitban is előforduló földpátok és az ámfibol. Ez ásványokhoz azonban kisebb-nagyobb mennyiségben a csillám (biotit) és a kvarcz is szokott csatlakozni. Hauer szerint tartalmaz 58—62 % kovasavat, 13—20 % alumíniumoxydot, 7—10 % vasoxydult, 7—11 % mészoxydot és magneziumoxydot, s végre 4—9 % alkáliát. Földpátja ámbár kovasavban gazdag nem nehezen mállik; de ámfibola meglehetősen sokáig képes ellenállni és elmállása nem tökéletes. A származott föld vashydroxydtól barnára festett agyag, az ámfibolnak félig mállott töredékeivel és néha zöldfölddel keverve. Némely finom szemcsés szienit azonban az elmállásnak meglehetősen jól ellenáll.

A diorit az oligoklász és andesinnek vagy labradoritnak az ámfibollal s ezen kívül gyakran valamely pyroxennal képezett szemcsés keveréke, melyben azonban kevés biotit is előfordulhat. Lehet durva vagy finom szemcsés, mely utóbbi esetben az alapanyagból kiváló nagyobb jegeczek szerkezetét porfirossá tehetik (dioritporfir); de lehet oly finom szövetű is, hogy benne az egyes kristályos alkatrészeket egymástól megkülönböztetni szabad szemmel nem lehet, a mikor diorit-afanitnak mondják. Előjöhethet még palás szövettel is, a mikor neve dioritpala. Kovasavtartalma még csekélyebb mint a szienité, tehát e kőzet még bázisosabb. Tartalmaz 48—55 % kovasavat, 4—7 % alkáliákat, 15—22 % alumíniumoxydot, 6—16 % vasoxydult, 8—15 % mész- és magneziumoxydot. Elmállására nézve egyezik a szienittel, csak hogy földpátja könnyebben felbomlik. A származott földes anyag itt is vashydroxyd által barnára festett agyag, félig mállott ámfibol töredékekkel s gyakran még zöld földes anyaggal keverve. Némely dioritban sok a pyrit, ami elmállását nagyon sietteti (lásd 28. és 29. lapon); mikroszkop alatt az apatitot is mindig\*) meg lehet benne

\*) Hauer, Geologie, 41—42. l.



különböztetni, ami a belőle származó talajnak phosphor-tartalmára nézt fontos.

Megkülönböztetik a többek közt a kvarcz-dioritot, mely Szabó szerint\*) áll biotitból, kvarczból, oligoklász- és andesinből (néha igen kevés orthoklászból), ezen kívül van még benne apatit és magnetit. — Ezt tehát a diorit savasabb, illetve kovasavban gazdagabb fajának kell tekintenünk, mely ennél fogva átlag tán valamivel nehezebben mállik el.

A diabáz (diabas) az augitnak és mészplagioklásznak kristályosan szemcsés elegye, melyekhez mint lényegtelen ásványok chlorit, magnezium, titanit és mikroszkópos apatit is csatlakozik. Néha előfordul bennük a kvarcz és biotit is és az ámfibol nagyobb mennyiségben való előfordulása által a diorithoz is közeledhetik, sőt abba át is mehet. Van durvább és finomabb szemcsés, sőt afanitos is. Ebben néha hólyagüregek is vannak mészpáttal kitöltve; a mely esetben diabáz-mandulakőnek mondják. Átlagos vegyi összetétele 48—53 % kovasav, 14—17 % alumini-umoxyd, 7—15 % vasoxydul, 10—17 % mész és magnezia, 4—9 % alkálík. E szerint a bázisos kőzetekhez tartozik. A diabáz többnyire elég könnyen mállik, s a felbomlási folyamatokkal kapcsolatban mészpát képződik, mely a kőzet üregeibe s repedékeibe lerakódik; azért a legtöbb diabáz pezseg, ha erős savval öntjük le. A mészplagioklász lemezes szövétét gyakran már a kőzet belsejében szemcsés szövettel cseréli fel. A lég behatásának kitéve felbomlása rendszeren a középpontból indul ki. Az augit is gyakran változást szenved már a kőzet belsejében, fényét veszti, vizet vesz fel és chloritos ásványnyá lesz. A diabázból származó talajanyag vaséleghydroxydban gazdag, zöld földdel kevert agyag.

Az előbbieken azon régi úgynevezett plutói tömegkőzeteket soroltuk elő, melyek a földkéreg alakulásának régiebb, névszerint az ősz, ó és közép (eozoi v. archei, paleozoi és mezozoi) érájában keletkeztek. Előbb a kovasavban utoljára pedig a mészben és vasban, s általában a bázisokban gazdagabbakat tárgyaltuk. A következőkben a trachitok nagy és fontos családjának tagjait fogjuk ugyanazon elv szerint felsorolni.

Trachit alatt Szabó után oly ujkori (harmadkori és fiata-

\*) Szabó, Geologia, 262. l.



labbb) kristályos földpát kőzeteket értünk, melyeknek tagjai gyakran tűnnek fel érdes felület és üveges kiképződés által, olivint azonban lényegesen nem tartalmaznak. A földpát lehet orthoklász vagy annak összetételével bíró szanidín, oligoklász, andesin, labradorit vagy anorthit; de a földpátos részt rendszeren több, egy-máshoz összetételére nézve közelebb álló földpát faj alkotja. A kovásvanban gazdagabb földpátok társaságában gyakran jelentékeny mennyiségben lép fel a kvarcz, a mikor a kőzet neve kvarcztrachit; kvarczczal együtt vagy a nélkül fellép a savasabb földpátokkal a biotit, a mikor a kőzetet Szabóval biotittrachitnak mondjuk; ha az ámfibol jelentékeny mennyiségben mutatkozik; ámfiboltrachitnak. Végre a mésznátron- és mészföldpátokkal együttesen nagy mennyiségben járul a kőzet alkotásához a piroxen-nek egy vagy más faja (pl. augit, hypersten), a mi a legujabb képződésű u. n. piroxentrachitoknál áll; melyeknél a biotit nem szokott előfordulni. Általában a savasabb biotit és kvarcztrachitok régibb származásuak. Szabó után\*) a piroxentrachit áll százalékokban átlag 56·5 kovásv, 21·6 alumíniumoxyd, 2·5 vasoxydul, 2·4 vasoxyd, 3·12 magnesia, 8·52 mész, 2·3 nátron és 2·2 káliból. A trachitnak szöve is igen különböző és e miatt gyakran külön nevet kap a kőzet. A legtipikusabb trachit világos színű, fénytelen, likacsos és durva alapanyagában repedezett szanidín, oligoklász, s ezen kívül ámfibol vagy fekete csillám kristályok vagy szemcsék tűnnek elő. Az alapanyagban a mikroszkop jelentékeny mennyiségű üvegnemű anyagot is tüntet fel. Az ily tipikus trachit átlagos vegyi összetétele Hauer szerint 60—67 % kovásv, 15—21 % alumíniumoxyd, 4—8 % vasoxydul, 1—4 % mész és magnesia, s végre 7—12 % alkáli. Néha az üvegesedés az egész alapanyagot áthatja, a mikor a kőzetet félüveges trachitnak mondják. Máskor az alapanyag finom mikrokristályos, szabad szemmel nézve egészen tömött, szarukőhöz hasonló; a mikor azt felzítnek (felsit, petrosilex) szokás mondani.

A trachitok néha vulkánikus gőzöknek rajtuk való átáramlása folytán a föld mélyében jelentékeny módosulást szenvedtek. Ezen módosulás lényege abban áll, hogy a fekete ásványok u. m.

\*) Geologia, 1883. 290. l.



biotit, augit és ámfibol, vízfelvétel mellett elchloritosodnak, zöldessé válnak, ami olykor az alapanyagon is mutatkozik. Ehez járul az is, hogy a mész-nátronföldpátokból epidotképződés is indul ki. Fontos ezen kívül az is, hogy a magnetit piritté változik, ami azután az elmállást lényegesen elősegíti a kőzet felszínén. Az így módosult trachit-kőzetet zöldkőtrachitnak nevezik.

A tipikus trachitok, melyek felülete durva és érdes, szövetük likacsos, ezen szövet és a nagy földpát tartalom miatt könnyen mállnak, és az elmállás a víznek mély behatolása folytán a felülettől lefelé fokozatosan terjedve még 2–3 méternyi mélységben is észre vehető. Az elmállás származéka mindig vaséleg hydroxyd által vagy már a kőzetben előjövő vörösvasoxyd által festett agyag, mely a nehezebben és tökéletlenül málló mellékes ásványok töredékeit magába felveszi. Ugyanez a végeredmény a zöldkőtrachitoknál is, csak hogy ezek elmállása a pyrit jelenléténél fogva gyorsabb és a talajhoz zöldes föld is vegyül. Különben hasonló szövet mellett a mész-nátron földpátok és augit tömeges jelenléte az elmállást elősegíti; de ha az alapanyagban az üvegesedés nagy foku, akkor ezen utóbbi körülmény az elmállást felette megnehezíti.

Mennél tömöttebb az alapanyag s mennél nagyobb annak kvarcztartalma, annál nehezebb és tökéletlenebb az elmállás; amit némely nagyon savas felzít kőzetnél tapasztalunk. Az ilyennek százalékos összetétele Hauer után 72–82 kavasav, 8–13 alumíniumoxyd, 1–3 vasoxydul, 0.5–3 mész és magnézia, 5–11 alkáliák. Az ily felzit néha rendkívül nehezen mállik, a miről az ily kőzetből álló ezred évekig daczoló éles, meredek sziklafalak és tornyok tanuskodnak; könnyebben elmállanak az u. n. felzitporfirban előforduló földpátjegecek. Némely ily kőzetből plutonikus hatások már kifürkészhetetlen idő előtt eltávolították az üregeket kitöltő földpátokat, s az üregecskéik falait kvarczos anyaggal vonták be. Ez az úgynevezett malomkő porfir. A felzit azonban lehet kavasavban szegényebb, s így földpátban aránylag gazdagabb is, amikor aztán az elmállás lassanként az alapanyag egész tömegére kiterjed, s az végre kavasavban gazdag kaolinanyaggá válik, (finom kvarcczal és esetleg csillámlemezekkel), mely gyakran ipari célokra is felhasználtatik. Egy és ugyanazon sziklatömeg, egyes részeiben különböző szerencsével



képes az elmállással megküzdenni. Ez által jönnek létre azon változatos, gyakran csodás szikla alakok, melyek ezen kőzetet annyira jellemzik, s merevségükben is annyi mozgást, annyi életet, a természetnek soha sem szünő működését fejezik ki. Vannak a fennebb leirthez egészen hasonló, de a trachitnál régibb kőzetek, melyeket felsitporfirnak, s ha kvarcztartalmuk nagy, kvarcsporfirnak neveznek; de ezeket külön választani, talajtani tekintetben nem tartottuk szükségesnek.

A bazalt a trachitoknál fiatalabb, igen tömött kőzet, finom, vagy alig kivehető, vagy épen rejtett kristályosodással, tulnyomó augittartalommal, mely mésznátronföldpátokkal, kivált oligoklász és andezinnel a legbensőbb módon van elegyülve; s az egész tömegbe egyenletesen elosztva, igen finom magnetit van jelentékeny mennyiségben beszórva. Ezenkívül mint jellemző ásvány az olivin is sok basaltban előfordul. Némely fiatalabb, külföldi basaltban a földpátféle alkatrészt leucit vagy nephelin helyettesíti. A basaltok elemzéséből kiderült, hogy valamennyien tartalmaznak vizet, még pedig néha 4 %-on felül; ami arra mutat, hogy bennük hydrosilikátok vannak jelen. Evvel összefüggésben van azon körülmény is, hogy savakban oldható részeik 40 %-t felül haladják, míg a trachitoknál ezek csak 5—6 %-t tesznek ki. Szabó szerint a bazaltban van átlagosan százalékokban 50·5 kavasav, 14·1 alumíniumoxyd, 16·0 vasoxyd, 9·2 mész, 5·0 magnézia, 2·1 natron, 1·0 kali, 1·7 víz, és tömöritségük 2·9—3·2.

E kőzetekben úgy látszik először az augitot támadja meg a szénsav és oxygen-tartalma víz; minek folytán előbbinek vastartalma közvetve vagy közvetlen vashydroxyddá változik s megbarmitja a felületet; hasonlókép oxydálódik és ittott setétbarna színt kölcsönöz a felületnek a ritkán hiányzó mangán is. Egyidejűleg mészbicarbonat is származik, mely részint a felületről és a sziklatuskó legkülső részeiből kimosatik, részint pedig néhány milliméternyire annak belsejébe, sőt az ilyenkor nagy számmal jelenlévő hajszálhézagokon több centiméternyire is beszivárogván, s ott az oldat szabad szénsava felhasználtatván, mint szénsavas mész rakódik le. Ennek lehet tulajdonítani, hogy ha az elmállásnak indult sziklatuskót széttörjük, az savval leöntve itt ott felpeszsdül. Ezen kívül a kőzetnek hézagaiba zeolitok és calcedon is van lerakódva, melyekhez az anyagot a felbontott és feloldott földpátok szolgáltatták.



A vasélegnek a felületről való eltávolítása után a földpát inkább előtérbe lépve, szürkessé válik az eredetileg fekete vagy kékesfekete szín. Ilyenkor a vashydroxydot mélyebben találjuk fel, úgy hogy a sziklatuskót kívülről egy szürkébb, valamivel bennebb pedig vasélegtől barnított héjas réteg burkolja be. Régibb elmállási felületeken agyagos finom bevonat mutatkozik. Az elmállás folyamata általában lassan megy és az eredmény tökéletlen. Csak bizonyos nephelin - nagy leucittartalmu (nálunk elő nem forduló) basaltok mutatnak az elmállásra nagyobb hajlamot. Úgy látszik, hogy az olivintartalom nagyobb mennyisége is elősegíti az elmállást. Némely bazalt pl. amely a selmeczi Kalvária hegyet képezi (jelentékeny olivintartalommal), az elmállás magasabb fokán csupa kerekded, golyó és göbecs nagyságú darává hull szét, melyek felülete sötétbarna, itt ott kékes, tejes lehelettel befuttatva, mely később kávébarna színnek ad helyet. Ilyen törmelék szokta képezni, kávébarna porral keverve, a bazalttalajt; melyben a földes rész általában igen alárendelt szerepet játszik. Ahol ily bazalttörmelék húzamos ideig földbe temetve van, ott szürkeagyag színűvé válik és súlyából tetemesen veszít; jóllehet kődara állapotát igen sokáig megtartja.

A félig mállott bazaltot, melyből az alkalis alkatrészeket, továbbá a meszet és magnéziát a víz nagyobb részben kilugozta, bazaltvakkénak mondják. E mellett a kő megtartja a bazalt eredeti szövetét, s gyakran, mint az, hólyagos szerkezettel bír.

A most leírt tömött bazalton kívül van még aprón szemcsés, melyet a n a m e z i t n e k és durván szemcsés, melyet d o l e r i t n e k mondanak. Ezen kívül van egészen üveges bazalt is melyet t r a c h y l t - n e k neveznek.

A melafir minden tekintetben megegyezik a bazalttal s ezért attól való megkülönböztetése sem összetétele, sem szövege által nincs megokolva. Az ily bazaltszerű kőzet csak akkor nevezetik melafirnak, ha régibb koru, mint a tulajdonképeni bazalt. A megkülönböztetés tehát tulajdonképen nem a petrografián, hanem a geológián alapszik.

Ámbár nincs okunk kétségbe vonni, hogy az elmállás jelen viszonyai közt is rakódnak le ezen, s más földpáttartalmú kőzetek belsejének hézagaiba calcedon és zeolitok; mindazonáltal azon



basaltok, melyek ez ásványokat nagyobb mennyiségben tartalmazák hólyagaik és hézagaikban (mandulakövek), sok esetben a jelenkort megelőző időkben, s némely melafirnál minden esetre hévvi-zek hatása alatt változtak át ilyképen, amit az augitokból kivált vörösbarna vaséleg (nem vashydroxyd), is bizonyítani látszik.

A fonolit (Phonolith), sötétszürke vagy sárgásszürke, tömött sőt néha üveges alapanyagból áll, melyet nefelin és sanidin elegye képez. Ez alapanyagot ugyanez ásványok, különösen utóbbi gyéren behintett kristályai tarkázzák. Ezen kívül mikroszkóp alatt meg lehet még benne különböztetni az ámfibol vagy augit tűskéket, noseant, magnétitot, apatitot, csillámot, stb. Gyakran vékony táblákra válik szét, melyek ütésre konganak (Klingstein). Tartalmaz 56—61 % kovásvat, 18—21% alumíniumoxydot, 1—6% meszet, magnéziát és 11—15% alkálikat. Nefelintartalmánál fogva a kőzet egy része savakban oldódik. Ugyanezen szilikátnak tulajdonítható, hogy a kőzet üregeibe és repedékeibe az elmállás folyama alatt nátronban dús zeolitok rakódnak le. Ezen nálunk igen ritka kőzet különben az elmállásra igen nagy hajlandóságot mutat, melynek végeredménye ugyanaz, mint a trachitoknál.

Régibb és újabb eruptiók alkalmával képződtek csekély nyomás alatt üveges kőzetek is, melyeket tekintet nélkül azok korára sorolunk fel.

A szurokkő többnyire szurok fényű, barna, vöröslő, vagy zöldes fekete, kagylós. törésű, üveges alapanyagból áll, melybe sanidin, plagioklász, kvarcz és csillám van beágyazva. Jellemző a szurokkőre, hogy benne 5—9% víz van. Összetétele egy vagy más trachittal egyezik.

A gyöngykőnek vagy perlitnek anyaga inkább zománcszerű mint üveges, színe sárgásbarna és szürkés-kék közt változó és a bele ágyazott lekerekített szögletű szemecskéket gömbhéjasan burkolja be.

Az obszidián egészen egyöntetűnek látszó, tökéletesen üveges, kagylós törésű anyag, tiszta üvegfénnel, fekete színnel; finom lemezekben átlátszó. Valódi vulkáni üveg, mely a trachitok összetételével bir és csak 0.2—0.7% vizet tartalmaz.

A habkő (horzsakő, Bimsstein) anyaga valódi vulkáni üveg, melyet izzó folyó állapotában a benne foglalt nagy mennyiségű túlhevített víz, amint csekély nyomás alá került, hirtelen gőzzé



változván, habbá fujt fel. Szövetére nézve egyközű vagy összekészált üvegszálakból áll. A felhabzás csekélyebb fokai által salakszerű lesz, vagy a szurokkőbe és obsidiánba megy át. Összetétele az előbb leírt üveges kőzetekkel megegyezik.

Mindezen kőzetek elmállása üveges állapotuknál fogva, nehezebb mint a trachitoké, de ha egyszer megkezdődött, éppoly gyorsan és teljesen véghez megy, ugyanazon eredménnyel, mint amazoké.

Láváknak nevezzük a jelen is működő, vagy nem régen kialudt vulkánokból kitódult kőzeteket, melyek hol a trachitokhoz, hol a basaltokhoz hasonlítanak jobban, s azért mint trachit lávákat és basaltlávákat különböztetik meg őket. Ezeknél az üveges és habköves módosulatok igen gyakoriak. Vegyi összetételükre megkülönböztetik a savas és bázisos lávákat. Mindazonáltal sajátságos, hogy a jelen működő vulkánok lávaiban kvarcz kristályokat találni nem lehet.

Elmállásukra nézve, a hozzájuk hasonló, az előbbieken felsorolt vulkáni kőzetekkel megegyeznek.

Meg kell itt még említenünk:

A vulkáni vagy eruptív breccziákat, (olv. brecsák) melyek az által jöttek létre, hogy a kitóduló vulkáni kőzet, a kitörés alkalmával összerombolt kőzetek töredékeit magába felvette. Ezen töredékek lehetnek a dolog természete szerint vulkániak vagy üledék kőzetek is; az összekötő, kitöltő tömeget pedig a kitódulási kőzet szolgáltatja, melyből a breccia a nevét veszi. Így van trachitbreccia, bazaltbreccia stb. Az elmállás főképen a törmeléköt összekötő kitódulási kőzettől függ, s azért további tárgyalása szükségtelen.

Végre bezárjuk a tömegkőzetek sorát a serpentin kőzettel, mely más kőzetek közt tömbökben és ereken fordul elő. Főkép serpentin ásványból áll, melyben a magnézia egy részét vasoxydul helyettesíti. A serpentin kőzetek valószínűleg többnyire olivin tartalmu kőzeteknek nagyobb mélységekben a víz hatása alatt történt átváltozásából származnak. A serpentin kőzet elmállása rendkívül lassú s inkább csak felületének megrepedezéséből, csekély foku elporlódásából áll.



## B) Kristályos palaközetek.

A gnájsz (gneisz) ásványi összetételére nézt a granittal megegyezik, de átlag kevesebb földpátot és több kvarczot és csillámot tartalmaz. Főkülönbség a két közet közt azonban, hogy a gnájsz szövete palás. A palásságot az okozza, hogy a csillámlemezek, a különben szemcsés-kristályos tömegben, egymással egyközűen fekszenek. Különböző foku átmeneteket is képez a gránitba; innen ezen elnevezések: gnájsz-gránit, gránit-gnájsz. Esetleges ásványai is ugyanazok. A csillámot helyettesítheti a chlorit, s ekkor neve chlorit-gnájsz: továbbá a steatit, ekkor protagin-gnájsz stb. Mindazonáltal az alább felsorolandó palás közetekbe is különböző fokban, gyakran észrevétlenül átmenvén, természetesebbnek látszik azokkal kapcsolatban tárgyalni. Ha palássága csekély, akkor elmállása a gránitéval teljesen megegyezik. Ha azonban sok benne a csillám, s még inkább, ha e mellett a kvarcztartalom is emelkedik, akkor a csillámlemezek közé toluló és megfagyó víz nagyobb réteges darabokra hasogatja ugyan a közet felületét, de az elmállás mélyebbrehatása annál inkább akadályozva van, minél inkább közeledik a rétegzet iránya a szintes fekvéshez. A közetet beborító réteges sziklalapok földpátját megtámadja ugyan az elmállás ahol hozzá férhet, de amint a hasonlóan réteges elhelyezésű és a csillámmal összenőtt kvarcz lemezekhez jut, további behatolása meg van akadályozva. Így e fekvő sziklalapok fedélcserepként védik az alsóbb rétegeket az elmállástól. Mélyebbre hatol az elmállás, ha a rétegek nyíltak; s még inkább, ha a közet folytonos nedvesség hatása alatt van, pl. iszapba temetett sziklatuskók stb.

Ha az ily közetből kimarad a csillám, előáll a gránulit, mely a kvarcznak és savas földpátnak palás elegye; előfordul benne még a gránát, csillám, turmalin, ámfibol stb. A palás szerkezetet a kvarczlemezeknek egyenközü fekvése okozza. Vegyi összetétele százalékokban: 69—75 kavasav, 8—12 aluminiumoxyd, 4—8 vasoxydul, 1—4 magnézia, 4—9 alkálik. Elmállása földpát-tartalmától függ, s egészben a gnájszéhoz hasonlít; csakhogy szét-hasogatódása a csillám hiánya miatt sokkal nehezebb.

A csillámpala kvarcznak és csillámnak palás szövetű keveréke. A csillám lehet muszkovit vagy biotit, vagy mindkettő



együttessen, de néha fel válthatja ezeket valamely más, e családba tartozó ásvány is. Mellékes ásványi alkatrészekben e kőzet gazdag s azok tömeges fellépése által más közzetté alakulhat át. Ilyenek a gránát, földpát, amfibol, turmalin, chlorit, steatit, calcit, grafit, magnetit, vasfényle (Eisenglanz) stb. Ha a kvarczot többé-kevésbbé a calcit helyettesíti, akkor mészcillámpala; ha a csillámot grafit, akkor grafitcillámpala; ha vasfénylepikkelyek, akkor vascillámpala a neve. A tulajdonképeni csillámpalában is igen különböző a kvarcz mennyiségi viszonya a csillámhoz, s ezért a kőzet vegyi összetétele és elmállása is nagyon változó. Ha benne földpát nincs, majd teljesen ellenáll a vegybontásnak, jóllehet meglazul és a felületet borító szabálytalan lapokra hasadozik szét, mint a gnájsz; sőt ha kvarczban szegény, csillámhomokká hull szét. Általában főkép csillámhomokból és kvarcztörmelékből s szemcsékből álló, földes részeken szegény és annál kevesebb talajt ad, mennél kvarczosabb volt az anyakőzet.

Az amfibolpala, amfibol tükből áll, melyeknek többé-kevésbbé egyközű fekvése a kőzetnek palás szövetet kölcsönöz. Mellékesen igen gyakori bennük a gránát és magnetit, néha földpát, kvarcz, csillám stb. Ugyanezen kőzet azonban tömegkőzet alakjában is előjő, amikor amfibolsziklának vagy amfibolitnak mondják. Átlagos összetétele százalékokban: 48—50 kavasav, 13—20 aluminiumoxyd, 12—27 vasoxyduloxyd, 3—14 mész és magnézia, 2—4 alkáli. Ebből láthatni, hogy a bázisos kőzetekhez tartozik. Vegyi felbomlása a légkör hatása alatt az amfibol ásványról mondottakkal megegyezik s bővebb fejtegetése itt felesleges.

A chloritpala ha — ami ritka — tiszta állapotban fordul elő, akkor finom chloritlemezekből áll, szövete inkább vastag-palás; színe zöld, tapintata lágy, sík. De ezen ásvány többnyire kvarcczal van elegyülve, mely vagy finoman eloszolva hatja át a kőzetet és annak nagyobb keménységet és érdességet kölcsönöz, vagy pedig vékony rétegecskékkal, fonalokká és lapos lencsealakú lemezekké van egyesülve a chloritos-alapanyag közt. Majd mindig van benne magnetit is. Százalékos vegyi összetétele: 31—42 kavasav, 3—5 aluminiumoxyd, 10—26 vasoxydul és oxyd, 17—41 magnézia és 9—10 víz.



Elmállása igen nehezen megy, s e tekintetben a légköri hatóknak inkább csak fizikai és mechanikai működésük nyilvánul.

A *steatitpala* (Talkschiefer) tömegét palás steatit alkotja, mely többnyire kvarcczel és földpáttal társul. Színe fehér, zöldesfehér, vagy világos zöld. Százalékos vegyi összetétele: 50—58 kavasav, 4—9 alumíniumoxyd, 2—7 vasoxyd és oxydul, 22—31 magnézia és 2—6 viz. Elmállása nehéz és főképp fizikai és mechanikai úton történik. Kevés földpáttartalmu agyagot szolgáltat, mely a steatit lemezkék és esetleg a finom kvarcshomok közé vegyül.

Az *agyag-csillám-pala* (Phyllit, ős agyagpala) szürke vagy zöldes finom palás kőzet, mely a hasadási lapokon kissé csillámpalaszerű vagy selyem fényt mutat. Főképp igen apró csillám lemezekből és finom kvarc szemcsékből áll, mint a csillámpala; de ásványegyedeit csak mikroszkop alatt lehet megkülönböztetni. Mellesleg benne néha földpát is van. Ásványainak nagyobbodása által egyfelől a csillámpalához, másfelől a nem kristályos iszapszerű elmállási anyagoknak szaporodása által az üledék kőzetekhez, névszerint a már szerves maradványokat tartalmazó agyagpalákhoz képez átmenetet. Vegyi összetétele igen változó. Tartalmaz átlag százalékokban: 47—65 kavasavat, 13—24 alumíniumoxydot, 6—18 vasoxydot, 2—15 meszet és magnéziát, 3—9 alkálit.

Elmállására nézve a finomabb szemű csillámpalával egyezik meg.

A kvarcit ugyan rendesen szemcsés szövetű: de minthogy a kristályos palakőzetek közé szokott települve lenni, s azon kívül néha a benne előforduló csillámlemezeknek egyközű fekvése által gyakran palás szövetet vesz fel: azért itt adunk neki helyet. A palás szerkezetűnek neve *kovapala* (Kieselschiefer), mely gyakran fekete színű. Vulkáni kőzetek közelében találjuk itt-ott az u. n. édesvízi kvarczt, melyet melegforrások lerakódásának tartanak. Ez részint amorf és víztartalmu, részint későbbi átalakulás folytán finom jegeczes szövetű. Bármilyen legyen is a kvarc szikla, az minden kőzet közt a legnehezebben mállik, mert azon a légkör vegyi hatói nem fognak. Azért a kvarc sziklákon található csekély talajréteg kevés kvarc porból, kavicsból és a növényekből származó korhadékból szokott állani.



Kivételt képez a Tripoli mely finom por alakban elosztott kovasavhidrat anyagból áll s igen finom rétegzetű, csekély összetartású vagy éppen laza; de ritka előjvetelénél fogva itt el is lenne mellőzhető.

## C) Üledékes kőzetek.

### a) *Agyagos kőzetek.*

Az agyag víztartalma aluminiumszilikát, mely vas sókkal, vasoxyddal s más anyagokkal színezve szokott lenni; néha kékes szürke, máskor sárgás, barnás vagy vöröses; vagy pedig humusz által feketére van festve. Nedves állapotban gyurható, száraz állapotban földes, tapintata lágy, kissé zsíros; a vizet mohón szívja magába és nehezen bocsátja át, gyakran víz által majd teljesen átjárhatatlan. Ha száraz agyagra lehelünk sajátságos, u. n. agyag szagot terjeszt. Ipari használata szerint megkülönböztetik a fazekas agyagot, pipaagyagot, porcellán földet (kaolin), tűzálló (mészmentes) agyagot, stb. a hozzá elegyült ásványok szerint sós agyagot, gipszes agyagot, timsós agyagot. Tálagnak (Tegel) nevezik némely régibb, mésztartalmú fajtáját, mely képlékenységet elvesztette, de a légbeliek hatása alatt megint vissza nyeri. Nyíroknak nevezi Szabó a nép után azon igen képlékeny vöröses agyagot, mely annyira mészmentes, hogy savval nem pezseg és valamely földpátos — különösen trachit — kőzet elmállása által jött létre és vagy képződési helyén van, vagy attól nem messze telepedett le.

A meglehetősen tiszta agyagnak százalékos vegyi összetétele: 68—75 kovasav, 17—20 aluminiumpyd, 1—2 vaséleg, 1—2 mész és magnézia, 0.5—2 alkáli és 5—6 víz.

Vályog\*) (Lehm) alatt oly agyagot értünk, melyhez jelentékeny mennyiségű finomabb és durvább homok van keverve. A vashydroxyd rendesen barnára vagy sárgára festi s meszet is szokott tartalmazni. Porlékonyabb és kevésbé képlékeny mint az agyag. Ez minden további változás nélkül kész talajt ad.

Löss alatt értik a geológok az agyagnak, homoknak és

\*) Hensch Árpád, az okszerű talajmívelés 27. l. Innen vettük e várvavárt szót, mely úgy hisszük most már megmaradhat a „Lehm“ magyar kifejezésére. Igaz, hogy a vályogtéglák készítéséhez leginkább ezen anyagot használja a nép.



mésznek többnyire vashydroxyd által sárgára vagy sárgásbarnára festett, durva, laza és likacsos elegyét, mely hazánk jelentékeny területeit borítja és a legtermékenyebb talajt szolgáltatja, minden további vegyfelbomlás nélkül. Jellemzők benne a burgonya, gyökérdarab, csont, s más szabálytalan alakú, megkeményedett márgakonkrécziók. A fűvek, dudvák elkorhadtt gyökerei és szárai által hátrahagyott függélyes (de ezen kívül még más irányú) csövek által van át szőve, melyek falait gyakran szénsavas mészkéreg fűdi. Víz-vájának kiteve és leomolva, függélyes falakat hagy hátra.

A pala agyag vagy palás agyag kvarcz szemcsék- és csillámlemezkekkel kevert oly agyag, mely a felette lévő (illetve volt) rétegek nyomása alatt már szilárdabb lett és kissé palás szerkezetet vett fel. Színe szürke, barna vagy fekete. A felületre jutva a nedvességnek és kiszáradásnak, kifagyásnak és felengedésnek kiteve, földes halmazzá hull szét.

Az agyagpala ugyanazon ásványi összetétellel bír, mint előbbi, melytől nagyobb keménysége és határozottabb palássága által különbözik. Utóbbi tulajdonsága gyakran oly fokra hág, hogy finom lapokra lesz hasogatható. Ezek aztán ház fedésre (fedőpala), író táblákra és író vesszőkre (író pala), fenő kövekre (fenő pala) stb. használatnak. Mikroszkóp alatt vizsgálva az agyagpala részint oly ásványi anyagokból áll, melyek a különböző kőzetek elmállásából származva, a vizek által hordott iszapot képezik, u. m. agyag, finom kvarcz-szemek és csillámlemezkek; részint pedig ezekhez csatlakozóan, ezeket átalakítva és ezek közt, utólagosan (minden esetre nagy nyomás alatt) képződött mikro-kristályos ásványokból. Ez tehát oly üledék kőzet, mely utólag átalakuláson ment át. Egy felől tehát át megy a palás agyagba, más felől pedig, a kristályosodás nagyobb foka által az agyag-csillámpalába. Gyakori sötét színét valamely szervi eredetű anyag okozza. Vegyi összetétele nagyon változó. Hauer szerint tartalmaz százalékokban körülbelül 50—67 kavasavat, 14—34 alumíniumoxydot, 4—9 vasoxydot, 3—7 meszet és magnéziát, 2—7 alkalikat. — Nagyon különböző a keménysége is. Elmállása keménységi foka szerint különböző; de jóval könnyebb, mint az agyag-csillámpaláé és sok esetben a palás agyagét megközelíti. Utóbbi esetben a légkör fizikai és mechanikai hatása, előbbiben a vegyi hatás szerepe



nagyobb az elmállás folyamatánál. A származó földes anyag homokos, fővényes agyag.

### b) *Meszes kőzetek.*

Lényegükben mészpátból állanak. Sósavval leöntve még nagy darabban is pezsegnek, amit a szénsav ( $\text{CO}_2$ ) gyors kihajtása okoz. Megkülönböztetjük következő fajait:

**F o r r á s m é s z** alatt értjük, a legújabb korban a forrásokból lerakódott mészkövet. Ennek egyik fajtája a **m é s z t u f f**, mely szivacsos, laza szövetű, gyakran földes- és élő mohokra, moszatokra, fűvekre s más növényekre és mindenféle növény-hulladékokra lerakódott finoman kristályos vagy poros mész. A forrás-mész tömöttebb fajtája a **t r a v e r t i n**. Ide számítható továbbá némely tavak és mocsarak fenekére lerakódó, krétaporhoz hasonló **m o c s á r m é s z** (Wiesenkalk, Seekreide) is. A kréta finom földes lágy, finomlikaesű mészkő, melynek legfinomabb fajtája tudva levőleg írásra is használható. E kőzet apró élő lények, különösen az állatokhoz számított foraminiferák mikroszkópos pánczélaínak tengerfenekén való lerakódásából képződött és képződik ma is.

**K ő z ö n s é g e s m é s z k ő** neve alatt foglaljuk össze mindazon tömött, kemény mészköveket, melyek többé-kevésbé tisztátalan mikro-kristályos szénsavas mészből állanak. Bennök több vagy kevesebb magnézia, vasoxyd, aluminiumoxyd, kovasav stb. is fordul elő.

**S z e m e s é s m é s z k ő** alatt értjük azon nagyobbára régibb eredetű világosan kristályos mészköveket, melyek rendesen a kristályos palakőzetek társaságában szoktak előfordulni.\*)

Mindkét utóbbi mészkőzetek közt megkülönböztetik ipari tekintetben a **m á r v á n y t**, mely tömötsége- és keménységénél fogva szépen fényezhető.

A fennebb elősorolt mészkőzetek elmállásáról együttesen szólhatunk. A forrásmeszek között a mocsármész már is laza földes állapotban lévén, kész talajanyagnak tekinthető; a likaesos mésztuff és a kréta a légkör fizikai és mechanikai hatása alatt könnyen széthull. Ellenben a tömött mészkövek rendkívül hosz-

\*) Mindazonáltal természetesebbnek tartottuk itt elősorolni.



szas ideig daczolhatnak a légkörbeliekkel és igen csekély porladást tanusítanak. A négy ezer év előtt épült egyiptomi pyramisoknál alkalmazott mészkövek szögletei kevésbé vannak megömbölyödve, mint a gránitkövekéi.\*) Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy az éles, porladást alig mutató mészkőszikrtek ezredévekig is majdnem ugyanazon alakot tartják meg. Mindazonáltal épen ezen a mészhegységben oly gyakori falmeredekségű sziklaoldalak, mélyen befürészelt, berovátkolt széleikkel, öbleikkel, szin-fal szerű kiszökelléseikkel, obeliszk alaku kőszálaikkal, épúgy tanuskodnak a víz által való feloldás és elmosatásról, valamint a nagyszerű barlangok, melyek nagyobb méretekben kifejlett mészkőterületeken mintegy összefüggő, patakokkal és folyókkal ellátott, saját faunával bíró alvilágot képeznek, nem különben a mészkő tömegek összeroskadása által a barlangos helyek felett képződő töbrök (debrök), amelyek által elnyelt víz a szikla méhében kivájt utakon halad tova; végre bizonyítja ezt az ily kőzetekből eredő vizek nagy mésztartalma is. Mindez meggyőzhet arról, hogy a szénsavas víz oldó hatásának az évezredek hosszú során e kőzeteksem állhatnak ellent. Ha a kemény mészkőzet tisztán calcitból állana, akkor talaj képzésére alkalmatlan volna; mivel a víz a feloldott meszet magával ragadván, semmi talajképzőanyag nem maradna hátra. Csakugyan vannak is oly mészkőzetek, melyeknek szénsavas mésztartalma a 90 százalékot jóval meghaladja. Ezek feloldása után tehát rendkívül kevés talajanyag maradhat legkedvezőbb esetben is hátra; sőt a nagyon tisztátalan mészkő feloldódása által is csak sok évezred folytán képződhetik annyi földes anyag, amennyi az erdő szerény igényeinek megfelelhessen.

Ennek kimutatására megkísértjük a szükséges időt részint tudományosan konstatált adatok nyomán, részint a természetben előforduló középszerűnél valamivel kedvezőbb körülmények felvétele alapján kiszámítani. Oly tisztátalan mészkő, mely 25% talajképző anyagot, u. m. agyagot, homokot, vaséleget, szóval vízben nem oldható részeket tartalmaz, ha annak 1 méter vastagsága rétegét a víz feloldaná és elmosná, visszahagyna 25 cm. vastag, a kőzet tömörségével bíró réteget. De minthogy a talajnak tömörsége sokkal csekélyebb, mert számtalan apró hézagtól van átjárva, tegyük fel, hogy ebből 35 cm. mély talaj keletkeznék, ha abból a víz a képződés alatt semmit el nem mosna, a szél semmit el nem hordana. De azon sok ezer év alatt, amely a talajképződéséhez a felvett viszonyok mellett szükséges, a legkedvezőbb esetben is sokat elhordanak a légkörnek emli-

\*) Szabó, Geologia, 1883. 207. l.



tett, soha nem nyugvó tényezői. Azonban hogy számításunk igen magasra ne üssön ki, vegyük fel, hogy az így elhordott talajanyagot a talajban apró törmelék és por alakban visszamaradó mész pótolja.

A feloldott kőzetanyag mennyiségét más megbízható adatok hiányában a források vizéből kell kiszámítanunk. Ezen vizekbe a kőzetanyagtartalmat azonban nemcsak a felső, hanem valószínűleg még inkább az alsóbb fekvésű sziklatömegek szolgáltatják és az ily mélységben képződő talajanyag részint a kőzet mellékes alkatrészeinek viszonylagos emelésére fordítatik, részint még nagyobb mélységbe mosatik alá. Ha tehát feltesszük, hogy a feloldott kőzetanyag mind a felső, 1 méter vastagságú mészkőrétegből kerül ki, időszámításunk a valóság mögött jóval hátra marad. Hogy milyen mértékben történik a feloldás, arra nézve némi felvilágosítást adnak a mészkőzetekből eredő források, és az évi csapadékok mennyisége. Feltesszük, hogy az illető terület Magyarország valamely felvidékén lévén, meglehetősen sok csapadéka van, melyből évenként 80 cm. magas vízréteg áztatja a kőzet felületét. Ennek az eddig tett még egyébiránt nagyon ingadozó eredményű kísérletek és tapasztalatok szerint<sup>1)</sup> igen kedvező esetben eljuthat 50%-a a kőzetek mélyébe, s képezhet azután forrás vizet<sup>2)</sup>.

E szerint a feloldást végezi minden négyzetdeciméter ( $\text{dm}^2$ ) területen  $8 \times 0.5 = 4$  liter víz. Egy kagylómészhegységéből eredő forrás vizének literjében volt Dammer lexicon<sup>3)</sup> szerint 129 milligramm calciumoxyd ( $\text{Ca O}$ ) és 29 mgr. magneziumoxyd  $\text{Mg O}$ ; egy dolomit-mészkőzethől eredő forrásban pedig találtatott literenként 140 mgr.  $\text{Ca O}$  és 65 mgr.  $\text{Mg O}$ . Mivel ez utóbbi eset kedvezőbb, vegyük ezt a számítás alapjául. 140 mgr.  $\text{Ca O}$  megfelel 250 mgr. szénasavas mésznek  $\text{Ca CO}_3$ , 65 mgr.  $\text{Mg O}$  pedig 136.5  $\text{Mg CO}_3$ -nak. Összesen tehát tartalmazott 1 liter forrás víz 387 mgr.  $= 0.387 \text{ gr.} = 0.000387 \text{ kgr.}$  (kilogramm) kőzetanyagot feloldva. A feloldást eszközöl minden  $\text{dm}^2$ -re eső évi 4 liternyi csapadék tehát feloldott 0.001548 kgr. kőzetanyagot. Ha a kőzet fajsúlyát 2.7-nek, azzaz  $1 \text{ dm}^3$  (kőbdeciméter) kőzet súlyát 2.7 kgr-nak vesszük, akkor az évente feloldott kőzet tömege megfelel egy 0.0573 milliméter vastag rétegnek, mert  $2.7 : 0.001548 = 100 : x$ . Evvel a mennyiséggel (0.0573 mm.) csak el kell osztanunk az 1 métert  $= 1000 \text{ mm.}$  és megkapjuk azon réteg feloldódásához szükséges évek számát, mely közel 17500.

Megjegyzendő, hogy a fennebbi kedvező eset csak akkor feltételezhető, ha a kőzetet növényzet, pl. erdő fedi, mely a feloldáshoz szükséges  $\text{CO}_2$ -t bőven szolgáltatja; mert ha csak az esővíz, és a talajlég rendes szénasavtartalmát vennők számi-

<sup>1)</sup> Wollny, Forschungen, X. 321. és k. XI. 1. és k. XII. 147. és k. lapon.

<sup>2)</sup> Az eddig közölt kísérletek szerint 50–120 cm. mélységre a lehullott évi csapadékoknak 20–80 százaléka jut el. De e kísérletek mind vízszintes területen tétettek, holott hegységeink felülete lejtős tehát ott az 50% nagyon magas. Mindazonáltal e kedvező esetet vettük fel mert e mellett is roppant nagy idő kell a talajképzésre.

<sup>3)</sup> 925. és 926. l.; Appelt Pflanze u. Boden. 1889. pag. 127.



tásba, akkor Beneze Gergely tanár számításai szerint éppen 10-szer ennyi idő lenne szükséges 1 méter vastagságú mészkőzet feloldására.

A dolomit lényegére nézve a hasonnevű ásványból áll; mindazonáltal a vegyelemzések ritkán adják a szénsavas mész és szénsavas magnézia között ugyanazon viszonyt, mint ez az illető ásvány összetételének megfelel, hanem hol kevesebb a magnézia, a mikor a kőzet a mészkőhöz közeledik és a dolomitos mészkőhöz képez átmenetet, hol pedig több benne a magnézia, s ekkor szabad magnézit ( $\text{Mg CO}_3$ ) tartalmára következtetünk. A dolomit nagyobb darabban sósavval leöntve nem pezseg; de ha porrá törjük, akkor — bár lassabban mint a calcit — lassú pezsegés mellett annál teljesebben felolvad, mennél kevésbé van kovasavval, s más oldhatatlan vegyületekkel keverve.

Elmállásáról ugyanaz áll, amit a mészkőről elmondottunk, csakhogy még nehezebben oldódik fel a légköri víz által. Néha a dolomitkőzet a légköri hatások alatt kőporrá hull szét, mely folyamat a kőzet belsejébe is behat. Ha a dolomitot, ami gyakori eset, kvarczos erek járják keresztül-kasul, akkor a könnyebben oldható anyagok eltávolítása és a dolomit elporlódása által létrejövő a sejtes dolomit, melynek vázát a kvarczerek képezik, odvaeskái (sejtjei) pedig dolomit kőporral vannak többé-kevésbé megtöltve.

A márgakőzet nem egyéb, mint nagymennyiségű (40—70 %) agyaggal kevert mész vagy dolomit kőzet. Lágyabb mint ez utóbbiak és gyakran palás. Sósavval leöntve pezseg. Megkülönböztetnek összetétele szerint mészmárgát, melyben a mész —, agyagmárgát, melyben az agyagtartalom túlnyomó. Ha a márga jelentékeny mennyiségű szénsavas magnéziát tartalmaz, amiről azonban csak vegyi úton lehet meggyőződni, akkor dolomit-márgának szokás mondani. A nevezett ásványi anyagokon kívül szokott a márgakőzet még kisebb vagy nagyobb, néha jelentékeny mennyiségű, homokot is tartalmazni. Mennél több a márgában a szénsavas mész (illetve dolomit), annál keményebb s annál inkább közeledik a tömött mészkőhöz; ellenben mennél több az agyag, annál földesebb lesz az; úgy hogy a kemény kő és a porlékony föld között minden fokozatban előjöhet. A földművelő már akkor is „márgaföldnek“ mondja az ilyet, ha mész-tartalma 10 % -on alul áll, de az 5 % -ot meghaladja.



A kemény, sok meszet tartalmazó, m é s z m á r g a k ő , meglehetősen nehezen mállik, és a kőzet mésztartalma feloldása után mészporral legszorosabban egyesült és ezen kívül több vagy kevesebb homokkal kevert agyagot, vagyis úgynevezett m á r g a f ő l d e t hagy hátra. Mennél több a márga kőzetben az agyag és homok, annál könnyebben mállik, és annál több föld lesz az eredmény; úgy hogy az u. n. a g y a g m á r g a már a megázás és kiszáradás valamint a megfagyás és kiengedés többszöri ismétlődése folytán is apró kocka alakú darabkákra hull szét, mely nemsokára termékeny márgafölddé válik.

A márgaföldnek mésztartalma, mely az agyagot minden ízében áthatja, a légköri csapadékok által a legtöbb esetben lassanként kilugoztatik, tehát folytonosan apadni szokott. Kivételt csak azon nem gyakori eset képez, midőn agyagos talajt folytonosan szénsavasmésztartalomban dús vizek hatnak keresztül, s ekkor az ellenkező történik.

Függelék képen a meszes kőzetek után sorozzuk be Hauer szerint még a következő, ámbár mészpátot gyakran nem is tartalmazó kőzeteket.

A m á g n e s v a s k ő és a v a s p á t szikla lényegükben azon ásványokból állanak, melytől nevüket kapták és minthogy ezeknek elváltozását a légköri befolyások alatt, már ismerjük, itt csak annyit teszünk hozzá, hogy az ily kőzeteknek különben igen lassú elmállását a beléjük elegyedett más ásványok lényegesen módosíthatják. Egyébiránt csekély mennyiségben való előjvetelüknél fogva talajképzés tekintetében csekély jelentőségük. Annál fontosabbak a bányászatra és a vasiparra.

A g y p s z és a n h y d r i t is csak kisebb településekben jó elő, s ámbár vízben való oldhatósága sokkal nagyobb mint a mészkőé, mégis rendkívül nagy idő szükséges ahoz, míg a vele kevert tisztátalanító ásványok (agyag, fővény stb.) a gipsz feloldása és elmosatása után néhány deciméternyi földes réteggé gyűlhetnek össze. Sokkal nagyobb jelentősége van a gipsznek és anhidritnak amiatt, hogy ásványi trágyaszernek igen becses.

### c) Homokos és törmelék-kőzetek.

A laza vagy kötetlen h o m o k o t is a kőzetek közé sorozza a geolog; de ez egyszersmind már kész talajanyag, mely azonban



még sem egészen mentes további változásoktól. A homokszemek közt, melyek nagyobbára kvarcz- és csillámból állnak, vannak kisebb nagyobb mennyiségben az elmállásnak még alá vetett ásványok is, pl. földpátok, ámfiból, augit stb. melyeknek elmállási származékai a homokot földmívelési szempontból javítják; — de a homokszemek közt gyakran mésztöredékek is vannak, sőt a homokszemek maguk is lehetnek mészkéreggel bevonva, mely esetben az atmoszferai csapadékok bizonyos körülmények közt gyorsabban, máskor lassabban eltávolíthatják a meszet s ezzel más növényi tápanyagokat is, miáltal a talaj ezekben szegényebbé válik.

A h o m o k k ö v e k szemcséi is összefüggés nélküliek voltak valaha, de később valamely ragasztó anyag által összeköttettek. Ez lehet jegeczes vagy részben amorf kovásv, szénsavas mész, agyag, s mint e két utóbbi szoros keveréke, márga, továbbá vas-hydroxyd vagy vaséleg, stb. A szerint amint a szemcsék nagyobbak vagy kisebbek, lehet a szövet durvább vagy finomabb; amint a ragasztó anyag mennyisége változik, lehet tömöttebb vagy likacsosabb. A homokkövek különös fajtát képezi az a r k ó z e (arcose) mely a kvarcz szemeken kívül feltűnően sok földpát szemet tartalmaz. A ragasztó anyag különböző lehet.

A h o m o k k ö v e k elmállása a ragasztó anyag minősége és mennyisége szerint rendkívül különbözik. Ha nem elegendő a homokszemeknek szoros összetartására, s a közet ennél fogva egyszersmind nagyon likacsos is, akkor rendesen még kovakötszer mellett is könnyen szétmorzsolódik. Ha ellenben a ragasztó anyag mennyisége nagy és az nehezen málló, pl. kvarczból áll, akkor a szikla éppoly állandó, mint e kvarczit; hasonlóan ellentáll az elmállásnak a dús vasélegkötszerű homokkő. A szénsavas mészből álló ragaszanyag a víz általi feloldásnak van kitéve; az agyagragaszanyagot végre a víz szétáztatja stb. Ismerve ezen egyszerű eseteket, könnyen megfejtethjük magunknak a homokkövek elmállását a kötszer mennyiségének közbeeső fokain, valamint két ragasztó anyagnak (pl. agyag és kvarcz, kvarcz és vaséleg stb.) egyesülése mellett is. Hogy a képződő talajanyagra mind a homokszemek minősége, mind pedig a ragasztó anyag befolyással van, magától értődik.



Éppúgy mint a finom közettörmelék, a homok: borithat be kisebb-nagyobb területeket a kőzeteknek összefüggés nélküli durva törmeléke is, u. m. kavics és kőtuskók halmaza, a melyet kő-tengernek, kőgörgetegnek, kőfolyásnak stb. neveznek. Ily kőhalmazok elmállása többnyire nagyon lassú, vagy épen megakadva látszik lenni; mert épen a legállandóbb sziklatöredékek szoktak ilyeneket képezni; s amint talán már évszázadokon át daczoltak az idővel, daczolni tudnak a jövőben is.

Ily törmelékhalmozatokat igen gyakran összeköt valamely ragasztó anyag (ugyanazok, mint a homokkőveknél), s ez esetben

Brecscsia (Breccia) a neve a kőzetnek, ha a törmelék darabok szegletei élesek, tehát azok összeragasztattak, mielőtt a víz hőmpolygető hatásának hosszas ideig kitéve lettek volna. Ezeknél a breccciáknál nemcsak a ragasztóanyag, hanem a bezárt töredékek is befolyást gyakorolnak az elmállás folyamára és eredményére; mert ezek is gyakran épannyira, sőt néha még inkább alá vannak vetve a felbomlásnak. A ragasztó anyag befolyása ugyanaz, mint a homokkőveknél; a bezárt töredékeké pedig megegyezik azok anyakőzetéével.

Konglomerat (Conglomerat) a neve azon törmelékkőzeteknek, melyeknél a kavics-szerű törmelék igen hosszú ideig volt kitéve a hőmpolygetésnek és koptatásnak, s az ennél fogva többé-kevésbé meg van gömbölyödve vagy laposra koptatva, de mindig lekerekített, letompított élekkel. Az ily kőzeteknél épúgy mint a homokkőveknél, főkép a ragasztó anyagtól függ az elmállás gyorsasága, mert a bele foglalt hőmpolykővek képződésük alkalmával elég hosszasan alá voltak vetve a légbeliek hatásának s épen ellentálló képességüknél fogva maradtak meg. Ennél fogva a ragasztó anyag elmállása vagy feloldása után is holt részeket képeznek a talajban.

A gyakrabban előforduló ily breccsiák és konglomerátok rendszerint sokáig daczolnak a légbeliekkel.

Az üledék-kőzetek sorát olyanokkal zárjuk be, melyek képződésénél a tűz és víz működött közre. Ezek a vulkáni tuffok, melyek anyaga vulkáni hamuból, lapillik és vulkáni bombákból áll, melyek közé gyakran a kitörés alkalmával össze rombolt-kőzet törmeléke is keverve van. Ez utóbbi lehet régibb, korább már össze tömörült tuff, láva vagy más vulkáni kőzet (bazalt,



trachit, habkő stb.); de lehet esetleg valamely neptuni üledék kőzet is. A vulkáni hamu, mely a légkörbe kidobott, néha ott helyt maradva tömörült össze többé-kevésbé tuffá; de nagyobb részt vízmedenczékbe, tengerekbe szórva, vagy az esővíz által oda jutva ott rétegesen szétterítették, s így gyakran réteges szerkezetet vesz fel; sőt e közben iszapolási folyamatok által a durvább részek a finomabbaktól többé-kevésbé elkülönítettnek. Később a víz oldó hatása, valamint az ásványi anyagoknak ez oldatokból jegeczesedés folytán való ujra kiválása által a kőzet anyaga kisebb-nagyobb átváltozáson megy keresztül. Az így átváltozott tuffban azután nemcsak azon ásványokat találhatjuk fel, melyek már a vulkáni kitörések alkalmával benne jelen voltak, hanem utólagosan képződöttet is, melyek a tuffnak néha oly keménységet kölcsönöznek, hogy az építkezésekre használható. Némely trachittuff ez által a trachit kőzet kinézését és keménységét megközelíti. A vulkáni tuffok nevüket rendszerint azon vulkáni kőzettől nyerik, a melynek törmelékei és ásványai benne megkülönböztethetők. Így van pl. trachittuff, mely hazánkban nagy mennyiségben fordul elő, bazalttuff, habkőtuff (bimmssteintuff) stb. Még meg kell említnünk azon, Erdélyben (pl. Tordán és környékén), palának nevezett finom szövetű agyagos kőzetet, mely Hauer szerint a trachittuff anyagának iszapolási terménye. Ez néha mészkarbonát által annyira át van hatva, hogy márgába megy át.

A vulkáni tuffok, mint likacsos és földes kőzetek, könnyen mállanak. Az idő foga nagyon meglátszik az ily kőzeteken s ha a tuffba beágyalt egy-egy nagyobb, épebb darabja az anyakőzetnek megakasztja a víz további rombolását, az alatta lévő lágyabb kőzet több méter magasságu oszlopok alakjában magaslik ki a víz által elmosott környezetéből; mint ezt gyönyörűen látni a Maros völgyének azon részén, hol e folyó a gyergyóvidéki medenczét elhagyva a Hargita trachithegylánczát áttöri, éppúgy a Görgény völgyében is. A trachittuffok mély és termékeny agyagos talajt adnak.

## **B) Talajképzés és szállítás jégáramok, vizek és légáramlások által.**

Azon legujabb közetréteg, mely talaj neve alatt a földségek mélyedését és emelkedését hiven kísérve, azt kevés kivittel min-



denütt borítja, korántsem oly állandó a minőnek azt a lapályok lakója tekinteni szokta. Az idő hatalmas köszörűje csiszolja, koptatja azt folytonosan, korábbi korszakok lágyabb kőzettelepeivel és itt-ott kiálló kemény sziklaoldalaival együtt. Az időnek e köszörűje a víz, melyet a napsugarak hajtanak, felemelvén azt gőzalakban a légkörbe, hogy onnan hó, eső s más csapadékok alakjában a földre hullva, nemcsak a növényeknek táplálékot szolgáltatson, hanem végig járván a sziklák legmagasabb ormaitól a tengerfenekig, megfeleljen lehordó és egyengető szerepének. Ez útjában tör, horzsol, csiszol mint jégár; öröl és zúz mint hegyi zuhatag; szakít, rombol és szállítja az anyagokat lefelé mint folyó; vágja, ontja, koptatja és egyengeti partjait és fenekét mint tenger. De még a sokkal gyöngédebb anyagnak, a légnek is van szerepe, szél alakjában, a talajanyag egy nemének, a porszerű, laza homoknak a költöztetésében.

Ámbár a jégarak és a vizek nemcsak oly kész talajanyagot, költöztetnek tovább, mely már valóban lakásul szolgált a növényzetnek; hanem a régibb lágy sőt, kemény kőzetekből, működésük alatt képződöttet is tova szállítják, tehát az eredeti képződéshez is hozzá járulnak; mindazonáltal az így ujonnan képzett s egyzersmind elhordott új talajanyag mindig a sokkal nagyobb mennyiségben tova szállított, és már valóban talajúl szolgált anyagokkal együtt telepedik le újra, képezvén ott a másodlagos, vagy üledék-talajt.

Ezért itt van helye, a kőzetek szétrombolásának ezen tényezőiről szólni.

## I. A jégarak (Gletscher).

Ahol a hegységek nagy tömegét örök hó és jég fedi, melyet a nyár melege elolvasztani nem képes, s évenként új réteggel szaporodik; ott végre oly vastagságot ér el a jeges hó, hogy a nehézségerőnek engedve, a lejtőkön a völgyekbe kell csúsznia és azokban összegyűlve, gyűrődve, az úgynevezett jégarakat képeznie. Az összetorlódott jegeshó részint a roppant nyomás miatt, részint pedig a nyári oladás alatt a tömegbe szivárgó víznek újra fagyása által jéggé változik, mely a bezárt légtől néhol hólyagos szerkezetű, néhol pedig, ahol a víz a léget kiszorította, egészen tömött. Ezen jégarakon takarodik le, mint valami, láthatatlan moz-



gású jégfolyamon, mindazon hőtömeg, melyet e vidékeken a nyári olvadás és a párolgás az évente lehulló hóból meghagy. Hogy a jégárak valóban lassanként lefelé csúsznak, suhadnak, azt többszörös tapasztalat és mérés igazolja. E mozgás nagysága vízszintes irányban tesz az Alpokban évenként 30—150 métert. Ezen sajátos mozgás folytán a jégár vége függélyes irányban véve több száz (néha 1500-nál is több) méterrel lejjebb száll az örökhó hátáránál, azon régióba, hol az nagyobb mértékben olvadva, végre elenyészik. Az olvadás nagyobb a sziklavölgyek partjain, kisebb szokott lenni a jégár középvonalán, minél fogva az kihatásodik; meglehetősen gyors az olvadás az alsó végen, mely annál fogva gyorsan domborodik lefelé. Azon kötörmelék és sziklatuskók, melyek a jégáron felül emelkedő sziklafalakról, hegyormokról, éles gerincekről stb. annak hátára gurulnak, homokkal, sárral együtt annak szélein az úgynevezett oldal-morénákat (Seiten-Moränen) képezik; ahol két jégvölgy egymásba szakad, ott két oldal moréna egy közép morénába egyesül. Ahogy a jégár szélein olvad az oldal-morénák megfelelő részét hátra hagyja, végén pedig minden leszállított, sárral, homokkal kevert köromot lerakva, a végmorénát (Endmoräne) képezi. Az oldalmorénák magassága elér 10—30 a végmorénáké néha több száz métert.

Ha meggondoljuk, hogy a jelentékenyebb jégárak mélysége, azaz jegük vastagsága több száz méterre megy, beláthatjuk, hogy ily roppant súlyu tömegnek lefelé való mozgása nem suhan el nyomtalanul a sziklavölgy felett. A jégár oldalaiba és fenekén sziklatuskók vannak befagyva, melyeket vagy az őket körülölelő jégtömeg szakított le állóhelyükből, vagy az oldal-morénákról gurultak oda, vagy pedig a közép morénákból hullottak a mély repedéseken át a jégár fenekére. E kötuskók vésőket képeznek a jégár hatalmas óriásának kezében, melyek által mélyebbre és tábbra vájja a völgyet, s a fenekén lévő iszap és homok segítségével lecsiszolja medrének felületét. Még fokozódik e munka hatása azon esetben, ha az időjárási viszonyok több éven át kedveznek a jégár meghosszabbodásának; mely esetben lejjebb nyúló vége maga előtt tolja, gyűri a korábbi lerakott homlok morénákat is.

Az Alpokon a jégárak visszavonulása által sok helyen több négyszögkilométernyire maradt csupaszon az ily képen lecsiszolt sziklaterület, ez óriási működés nagyszerű tanujele képen.



A jégárok fenekén és oldalain képződött homok- és iszap-tömegeket az alóluk eredő kisebb-nagyobb hegyi zuhatagok magukkal viszik, s alantabb vidékeken, hol esésük kisebb, — az eső és hóvíz által a hegyoldalookról lemosott más hasonló terményekkel együtt — lerakják. Az alpesi jégárakból eredő északolaszországi folyók jelenleg is roppant homok- és iszaptömegeket telepítenek le, folyásuk alsóbb részén és több mint valószínű, hogy felső Olaszországnak összes termékeny talaja ezen az úton vándorolt le az Alpesekből.

Hazánkban ugyan jelenleg jégárok nincsenek, de ilyeneknek számos nyoma maradt fenn a jégkorszakból. A központi Kárpátokban éppúgy mint az erdélyi havasokban számos morénát találunk, melyek gyakran vízmedenczét zárnak körül, a tó alsó gátját a homlokmoréna képezvén. Nem lehet tehát kételkednünk abban, hogy az alföldeink síkját kitöltő homok és földesanyag egy, habár jelentéktelen része, még a Kárpátok hajdani jégáraiból származik.

## II. Az édes vizek.

### 1. *Eső és hóvíz.*

Ha a hazánkban lehulló évi eső és hó mennyiségét csak 60 cm. vízárással vesszük is egyenlőnek\*), akkor 10,000 év alatt ezen vízből 6000 méternyi mély tenger keletkezne. Ezen roppant víztömegnek egy csepeje sem hagyja el a földsegeket a nélkül, hogy azokból akár oldott, akár szilárd állapotban kőzet- és talajrészecskéket magával ne vinne.

Ha a vízecspep folyton egy pontra esik, a legkeményebb követ is kivájjá idővel, úgyszólván szemünk láttára. Ha ezt teszi a fedélről lecsepegő víz, akkor az eső csöppjeiről is ez áll és egész bizonyossággal állíthatjuk, hogy azok egyike sem esik le a kőzetre, s nem foly tovább anélkül, hogy abból valamit magával ne vinne. A lefolydogáló eső- és hóvíz nemcsak a talajban és a lágyabb kőzetekben mos árkokat, idéz elő szakadásokat, hegyesúsamlásokat; hanem a kemény sziklákban is hornyokat, öblöket, s az elmállással karöltve idővel mély völgyeket, völgyszorulatokat váj ki.

\*) Heller A. Időjárás, 1888., 232. és 233. l. szerint a nagy magyar Alföld kap évente 50—70 cm. csapadékot; a hegyes vidékek sokkal többet, Szinevér-Polyána 150 cm-t.



## 2. Csorgák és sziklafazatok.

Ha a kőzet egyes homok- és porszemecskékből van össze-  
ragasztva, mint a homokkövek és agyagtelepek, akkor a hatás  
gyors és szembeszökő. A legtömöttebb agyagot meglágyítja las-  
sanként a víz, s mint iszapot magával viszi; a homokkövek pe-  
dig a víz vájó, szakító, fűrészelő működésének a legváltozatosabb  
példáit mutatják. E tekintetben, mind változatosságára, mind nagy-  
szerűségére nézve ritkítja párját a *s ä c h s i s c h e S c h w e i z*, mely  
minden lépten-nyomon más és más művét mutatja a víz műkö-  
désének, mintha csak kiállítást akart volna itt ezekből rendezni  
a természet. Itt-ott csak néhány milliméternyi széles, de több  
centiméter mély csorgákat lát az ember bevájva a sziklalapok  
szélein, amott már több méter mélyen fűrészelte be magát a víz,  
melynek vágó erejét a magával sodort homokszemek sokszoroz-  
zák; míg amott éppen mély szakadás tátong előttünk; megany-  
nyian a víz művei, melyek valószínűvé teszik előttünk, hogy a víz  
okozta az egész hegységnek szétdarabolását azon megragadó osz-  
lopok, gulák, várromok s más festői alakokra, melyek az utasok  
ezreit csalogatják évenként e vidékre. Ahol a valamely kőcsorgán  
lesiető víz a kőzetben lágyabb helyre talál, ott mélyebbre vág be,  
s a magával vitt homokszemek és kődarabok körben forgatása  
által egész fazakat váj ki. Ha ez ki van száradva, megtaláljuk  
benne a homok mellett a malomkőül szolgáló néhány nagyobb,  
szépen lekerekített görgetegdarabot is. A kőfazék tágasabbá válik  
minden alkalommal, midőn az esők vagy a hóvíz újra megindít-  
ják a malmot, míg végre alsó része, mely úgyszólván leginkább ki van  
téve a vájásnak, s a túlárado víz felülről is fűrészeli, kiszakad,  
s fenéig kivájódva a csorgaárokkaal egyesül. Hasonló sziklafazako-  
kat képezhet minden vizesés, s így azok is, melyek a jégárok  
repedésein zuhognak le annak fenekére. *Luzernben* az *u. n.*  
*Gletschergartenben* 18 kisebb-nagyobb ily sziklafazatot  
láthat az utas, egy jégkorszaki jégár által lecsiszolt gránit szikla-  
lejtőn, a város északi szélén; melyek legnagyobbika 8-5 méter  
széles és 10 méter mély. E fazakokban találták felfedezésük al-  
kalmával még a természetes malomkővekül szolgált, szépen lecsi-  
szolt, kőgömböket is, melyek ott mindenféle nagyságban láthatók.



### 3. *Vízesések.*

Legfeltűnőbb a víznek fűrészelő hatása a vízeséseknél, melyek zúgója e miatt folytonosan hátrább hátrább vonúl. Ezen hátravonulás erélye nagymértékben függ a közettől. Legnagyobb-szerű példája ennek a világhírű Niagara esése, az Erie és Ontario tavak közt. A sziklafal, melyről a víz lezuhan, felül mintegy 25 méternyi vastagságban kemény mészkőrétegek rendszeréből áll, mely még vastagabb, lágy és könnyen elmálló palán nyugszik. Ezt a két ágra oszló, s összesen mintegy 900 méter széles és a víz színétől 48—50 méter magas óriási zuhatag örvénye könnyen ontja, szaggatja, kotorja és tova viszi, s a felette álló kemény mész-szikla ez által elvesztvén támaszát, időnként a mélységbe zuhan, miáltal évenként 30—50 méternyire vonúl hátrább a zuhatag.

### 4. *Sziklagátak átmetszése.*

Nem kevésbé érdekes példáját szolgáltatja a víz vájó hatásának a Simeto folyó ágya, mely az Aetna nyugati oldalán ömlik a tengerbe. E folyónak meglehetősen mélyen vajt ágya volt, midőn az 1603-ik évben azt az Aetnának egy lávafolyama, 10—12 méter magas gáttal zárta el. Ez természetesen feltolította a vizet, mely tavat képezve, nemsokára elérte a lávagát tetejét, s azon átömölve zuhatagot képezett, mely az egészen kemény, bazaltszerű lávagátat két és fél évszázad alatt teljesen keresztül vágta, úgyhogy már e század közepén a gátnak egész szélességében elérte régi ágyát, s most a folyó ennek további mélyítésén dolgozik.

### 5. *Talaj el- és lemosás.*

Természetes, hogy mennél lágyabb a kőzet, annál gyorsabban megy a vájás műve; s míg néhány méter kemény kőzet átmetszésére évszázadok szükségesek, addig a kiáradt patak vagy folyó néhány óra alatt több méter földes réteget hord le partjából, és laza agyag, homok vagy televény rétegekben már egy két záporosó vízének leszaladása is mély vágásokat idéz elő. Az erdőtől megfosztott, letarolt, legeltetett, felszántott vagy felkapált oldalakról a földet annál könnyebben lemossa a víz, mennél meredekbb az oldal, mennél simább a talajjágy, vagyis azon szikla felület,



melyen a talaj nyugszik, s mennél több bolygatásnak van az kitéve az ember és a legelő marha részéről. A talaj ily lehordásának, s a kopasz sziklák előtérbe való lépésének szomorú példáit az ország minden hegyes vidékén feltaláljuk; de legnagyobb kiterjedésűek az ily területek a mészkőzeteken, hol a természet a lemosott földet legnehezebben tudja ujjal pótolni. Ha e kedvezőtlen körülményhez még a folytonos legeltetés is járul, akkor a talaj lehordása, s evvel az elterméketlenedés azon fokát éri el, melynek ijesztő példáiképen Palaestinát, Persiát stb. szokták emlegetni: pedig még a Balkánfélszigetre sem kell ezért menni, mert hazánkban is igen sok helyen nagy kiterjedésben megtaláljuk, pl. Torna, Krassó, Alsófehér és Hunyadmegyékben s másutt. Klaszszikus vidék e tekintetben a Horvát és Dalmát tengerpart.

#### 6. Hegyecsuzamlások.

Rendkívül segíti a vizet ily tömegek megindításában azoknak teljes átázása mely az u. n. hegyecsuzamlásokat és az iszapáramokat okozza.

Ha valamely, a völgy vagy lapály felé dülő és a hegyoldal által metszett agyagréteg húzamos esőzés vagy hóviz által átázik, s összefüggése bizonyos fokra leszált, akkor a rajta nyugvó talaj vagy sziklatömeg lecsúszamodik, s jelentékeny változásokat okoz a domborulati viszonyokban. Kisebb ily jelenségek földsuhadások, a nagyobbak hegyecsuzamlások neve alatt ismeretesek. Előbbiek hegyes vidéken igen gyakoriak, s a talaj lefelé való vándorlásának egyik nem ritka módját képezik; utóbbiak ritkábbak, de annál rettenetesebbek. Egy ily borzasztó hegyecsuzamlást akarunk Reclus „A Föld“ cz. munkájából) ide igtatni.

A Rossberg a Rigitől északra azon félszigetszerű tér közepén áll, melyet a Zugi, Egeri és Loverzi tavak képeznek; tömör konglomerát rétegekből áll, s oly agyagfenéken nyugszik, melyet a beszivárgó víz fellágyít. Egyik nyulványának ismeretlen időben történt leszakadása már elborította volt Rotten helységet; de az 1806-ki katastropha még rettenetesebb vala. A megelőző évszak igen esős volt s az agyagrétegek lassankint egészen sárhalmazzá váltak; végre a rajta állott sziklák elvesztvén alapjuk szilárdságát, csúszásnak indultak a lejtőn s fölturták maguk előtt



a földet, mint a hajó orra a tenger vizét. Egyszerre csak megindult az omlás. A roppant tömeg erdőivel, rétjeivel, tanyáival s ezek lakósaival együtt egy szempillantás alatt alá zuhant a völgybe; az összeütközött sziklák horzsolódásából támadt tüzek lángkévéiben villantak elő a megnyílt hegyből; az alsóbb rétegek víze hirtelen gőzzé változván, robbanást okozott s úgy szórta a kőzapot és az iszapot, mint valami vulkán tölcsére. Golda híres mezői s még négy falu, a melyekben közel ezer lélek lakott, eltűntek az omladványok halmaza alatt, a Loverzi tó részben betemetődött, és az a szörnyű hullám, melyet az omlás 20 méternyi magassáig csapott fel a partokra, valamennyi ottani házat magával sodort. S ez a katastrophá oly rohamos sebességgel folyt le, hogy a madarak is megfuladtak a levegőben. A leomlott hegyrészlet nem kevesebb, mint 4 kilométernyi hosszúságu, 320 méter szélességű és 32 méter vastagságu, vagyis 40 millió köbméternél nagyobb tömegű volt.

### 7. Iszapáradatok.

Nem kevésbbé érdekesek az iszapáradatok. Agyagos vagy tuffos hegyoldalokon néha lávaszerűleg hömpölyög le a sárrá ázott tömeg. Hegyi zuhatagok néha a meredek oldalokról lemosott talajanyag által tökéletes iszapáradatokká lesznek, melyek barna vagy fekete tömegeiket a völgyek felé hömpölygetik. Folyásuk e közben meglassul, néha ágakra oszlanak, kisebb akadályokon átmennek, nagyobbak előtt feltorlódznak. Azon vastag, vörös iszapáram, amely az 1795-ik év nyarán a Rigiről leindult, negyed óra járásnyi széles és több öl magas volt és oly lassan folyt, hogy a lakosoknak idejük volt előle ingó javaikkal együtt elmenekülni. A közép wallisiak (Schweiz) minden évben látnak egy ily áradatot kitörni az u. n. pokolvölgyből. E völgy tölcsér alakú mélyedést képez az Ill folyó és a Canquella hatalmas mészkő sziklafalai közt, melynek oldalai mindenütt könnyen málló kőzetből állanak. Mihelyt tavaszkor, meleg esők után, a hó ezen tölcsér oldalain elolvad, 10—12 méter mély levezető csatornájában világossárga, félig folyó pép vonul lefelé, melyben 1—1½ m. átmérőjű szikladarabok s kőtuskók úsznak lefelé, s ha az ár partjain felül emelkedve kiönt, azokat ott le is rakja. A Rhoneba való beömlésénél e módon magas hátú Deltát alkotott magának így



az Ill, mely előbbi folyót egészen a völgy tulsó partjához szorította vissza\*).

Ugyanezen tüneményt látjuk ismétlődni kicsinyben igen sok apró hegyi zuhatagnál, sőt néha oly vízvájta sziklaszorulatokban is, melyekben nyáron át a víz rendesen egészen hiányzik.

#### 8. Iszap- és törmelék szállítás a folyókon.

A víz a megindított iszappal, homok- és törmelékkel a partakokba, innen a folyók, folyamok és tengerek felé siet. A kiáradt vizek partjaikat tovább ontják és vájják ágyukat, uj iszap és homoktömegeket keverve az érkezőkhez.

Ugyanazon sebesség mellett annál könnyebben viszi a víz a törmeléket, mennél apróbbak annak részecskéi, s míg az iszap finom porszemecskéi a vízben úsznak, addig a homokot fel-felsodorva s újra elejtve hajtja előre, a kavicsot ugratva, a kőtuskókat görgetve tolja maga előtt az áradat, melyek folytonosan egymáshoz ütödvé, surlódva, éleiket elvesztik, simára kopnak mi által megint egy rakás homok örlődik. A köveknek tova mozditását jelentékenyen könnyíti az, hogy azok a vízben súlyoknak átlag  $\frac{2}{5}$ -ét elvesztik\*\*). Egyébiránt azon, hogy a folyóvíz nála fajsúlyra nézve sokkal nehezebb homokot és kavicsot tova szállítani képes, egy csepp okunk sincs csodálkozni, hisz a szél minden nap bizonyítja szemeink előtt, hogy nemcsak porfelhőket, hanem a légnél több mint 2000-szer nehezebb homokszemeket is tova szállítani, sőt azokból halmokat építeni képes. Pontos vizsgálatok bizonyítják, hogy ha a víznek másodpercenkénti sebessége 8 cm., akkor medréből finom agyagot felsodorni és finom homokot vagy fővényt magával vinni képes; 15 centiméternél már közönséges, 20 centiméternél durva homokot ragad magával; 25 cm.-nél kődarát, 60 cm. sebesség mellett már apróbb, és 1 méter mellett tojás és ököl nagyságú kavicsot képes tova hömpölygetni.\*\*\*) Amely törmeléket a vizek rendes folyásuk alkal-

\*) Girard, Bodenkunde, Halle 1868.

\*\*) A földpátok fajsúlya 2·5—2·7, a kvarczé 2·6—2·7. Egy 2·6 kilogramm súlyú trachit, a zavaros vízben 1·6 kilónál kevesebbet nyom.

\*\*\*) Hogy vizeink hatalmát, törmelékszállító erejét, megítélhessük, szükséges azok sebességét a víz csekély, közép és magas állásánál kipuhatolnunk, amit a vízben úszó tárgyaknak egy másodperc alatt tett útja megmérése által bárki megtehet. Azon adatok közül, melyekkel e tekintetben birunk, tájékozásúl



mával medrükben nyugodtan hagynak, azokat áradásuk alkalmával, midőn nemcsak tömegük hanem sebességük is rendkívül gyarapodik, felszaggatják és lejjebb szállítják.

Tudvalevőleg a folyóvizek völgyei a hegységekben többnyire egyik oldalon nyitott tölcser alakú völgykebellel veszik kezdetüket, mely a hó, eső és forrásvizeket felfogja, összegyűjti. Innen vezetnek ki a folyók kezdetét képező, meredek fenék vonallal bíró hegyi zuhatagok, melyek ágyát részint maga a fekvő kőzet képezi, részint sziklatuskók borítják, a meder lankásabbá szelidülésével a durva kavicsnak adva helyet. A völgyek e tájon még mindig mély bevágások alakjával bírnak, keskenyek és csak kivételesen találunk partjaikon itt-ott egy-egy kis pázsittal borított lapályos foltocskát. Ez a folyam felső vidéke; a folyó medernek felső szakasza. Alább lassanként kiképződik a völgylapály, melynek közepén a meder már szelidebb esésű, de még mindig kavics fedi fenekét. A hegyoldalak közé fogott völgylapály kavics, homok és iszap által van kiegyengetve, melyet különböző növényzet borít, de időnkint áradásnak és elmosásnak van kitéve. A folyam medre nem állandó, a völgy egyik partjától a másikig csap át áradások alkalmával; költözik. Ez a folyam középfolyása. Végre kiér a folyam a hegységből a tágas lapályra: egy darabig még kavics és kődara borítja fenekét, mely az alábbi, tán lágy kőzetretegeket a felszaggatástól védi; a kötőrmelék mind apróbb lesz, míg homokba és iszapba megy át, — az esés ez által a vízsebesség folytonos csökkenésével. Ez a folyam alsó folyása, mely egy nagyobb folyamig, vagy a tengerig tart.

Ámbár a folyamok medrének számtalan módosulata a legnagyobb változatosságot tünteti fel; de abban kivétel nélkül meg egyeznek, hogy esésük csökkenésével fenekük anyaga fokozatosan finomadik. Ezt kellően megmagyarázza azon fennebb ismertetett

---

idéünk itt néhányat Hunfalvy János „A Magy. Birodalom term. viszonyainak leírása, Pest, 1865.” cz munkájából: A Tisza sebessége Viskén alól 1' 0" 0" víz-állás mellett 10278'. A tokaji hidon alól 17' 0" 6" v. á. m. 13'545', ugyanott 5' 9" 6" v. á. m. 4128'. Mikor a tiszai mérceze 1' 3" vízállást mutat, akkor a Taracznak közép sebessége 16'38' mélysége 2' 1". A Nagyg torkolatán felül 100 öltre, a Tiszának 3' 2" 0" víz állása mellett, közép mélysége 2' 6", közép sebessége 47'. A Bodrog közép sebessége a tiszai mérceze 17' 11" v. á. m. B. Keresztúrnál 78' mélysége 17'.



viszony, amely a folyóvíz sebessége és az általa elbirt kötőrmelék minősége között fennáll.

### 9. A szállított anyag lerakása.

Ahol az esés csekélyebbé válik, ott a leülepedő kavics és homok a folyó medrét évenként emeli, minek folytán a víz áradások alkalmával előbbi útjából kitér, s a medrét szegélyző korábbi lerakott földben új ágyat ás magának, a régit csak mellékcsatorna gyanánt használva, vagy egészen oda hagyva, mely esetben ott rendesen fűz, nyár és egerfaberek telepednek meg. Hogy a folyók a lapályokra érkezve, medroket feltölteni igyekeznek, erről igen szép bizonyítványt adnak az észak-olaszországi folyók. A Pó medre például magasabban fekszik, mint Ferrara város háztetői.

Ahol a folyó kiáradva, rendes medréből kilép, az egész völgyalapályt, vagy az alföld mélyebb területeit előnti, ott folyása egyszerre annyira lassúdik, hogy a magával vitt finom homok és iszap nagy részét lerakja, s így a területet termékeny iszappal emeli. A Nilus Aegyptomot Krisztus óta 2 méterrel, alsó Aegyptomot Thebe építtetése óta 6 méterrel emelte, több mint 600 négyszögmérföldnyi területen. Világos dolog, hogy az embernek czélszerű építmények (töltések, sarkantyúk, zsilipek stb.) rendszere által, melyek leírása ide nem tartozik, előmozdítani és szabályozni kell a természetnek ezen ingyenvaló munkáját, miáltal a part emelését és termékeny talajnak nyerését érheti el.)\*

Ha a folyó tóba ömlik, itt vize szétterül, esése és sebessége majd teljesen megszűnik, s minden magával hozott szilárd anyagot lerak, miáltal a tó medre lassanként egészen kitöltetik kavics-, homok- és iszappal; vagy ha előbbieket a folyó már fennebbi folyásában lerakta, akkor csak utóbbiakkal. A tó vize mindig sekélyebbé válik, végre mocsaras, lapos terület lesz belőle, melynek közepén a víz zöme halad, magának a medret megtisztítva az iszaptól. A tófenék emelkedését a lápnövényzet hatalmasan

---

\*) Helyes vízszabályozás és az iszaplerakás czélszerű vezetése és korlátozása által, a Tisza maga emelne lassanként magának áthághatatlan gátokat, és áldást árasztana maga körül évenként, a helyett hogy az Alföld ostroma legyen. Most ellenségének tekinti e folyót az Alföld lakója, pedig meg kellene vele barátkoznia, s elfogadnia amit hoz; nem pedig kihívni a természetet maga ellen, a hatalmas folyam igen szűk korlátok közé való szorítása által.



elősegíti, évenként jelentékeny televényanyagot termelvén, mely a tulságosan sok víz miatt csak nehezen és tökéletlenül korhad, s időnként a kiáradó folyó által iszaprétegekkel szaporodik, melyek lerakódását a lápnövényzet igen hatásosan mozditja elő. Lassanként a folyónak a tavon alóli folyása mélyíteni szokta medrét, minek folytán annak a lápos téren át kanyargó szakasza is mélyebben vágja be magát a régi tófenékbe. Ennek következése előbb utóbb az lesz, hogy a mocsáros hely víztelenül, s a régi tófenék így termékeny, fekete földü térséggé változik át. A hegységeknek minden oly lapálya, mely két hegyszoros közé van beigtatva, a talajszármazás hasonló módjáról teszen tanúságot.

Ugyanez történik bizonyos módosulással ott is, ahol a folyók csekély mélységű tengerbe ömlenek. A behordott iszap által a folyó, torkolatát feltölti, maga előtt az utat elzárja, ennek folytán előbbi medréből kitér, elágazik, minden áradáskor tovább szoritva vissza a tengert.

Adria és Ravenna városok a Rómaiak korában kikötők voltak, de a Po deltaképzése folytán utóbbi most a tengerparttól 1, előbbi pedig 2 órajárásnyira esik, s a kikötők helyén most a legpompásabb kertek diszlenek. Sőt a Po ágai közt előre nyúló földnyelv legvégső csúcsa most 33 kilométerre van már Adria városától.

A Duna a fekete tengerbe való beömlésénél torkolatát annyira eliszaposította, hogy ágai emiatt hajózhatatlanná váltak. Ezeknek hajózhatóvá tétele és ily karban való tartása végett nemzetközi bizottmány hivatott össze, melynek számítása szerint azon szilárd üledéket adó anyagok, melyeket a folyam naponként a tengerbe hord, nyáron és közép vízálláskor 331200 köbméterre, áradásoknál pedig 864000 köbméterre tehetők. Ezen iszaphól közép vízállásnál évenként 266 geogr. mérföld hosszú és ugyanoly szélességű, 1 láb vastagságú réteg rakodhatik le; ha pedig az árvíz egy évig tartana, 43 mérföld széles és hosszú és 1 láb vastagságú réteg képződhetnék belőle. A Ganges fővény- és iszaptömegei oly roppantak, hogy a tropikus esők szakában attól a tenger 20 órányira is zavaros. Angol geológok számítása szerint ezen iszaptömegek évenként legalább is 180 millio köbméterre tehetők. Az Amazon folyó zavaros vize még 50 geogr. mérföldnyire is behatol a tengerbe.

Ha a torkolat emelése a deltaképződés folytán már bizonyos fokig haladt, megtelepedik rajta a növényzet, s bár elejente évenként előntetik, később csak a legnagyobb áradások érik el azt. Még inkább biztosítja ezen területeket, s nagyobbítja azokat az eliszapolt tengerfenék kiemelése által a némely tengerparton észlelt u. n. secularis (szekuláris) emelkedés.



### III. A tenger.

Hazánk földirati helyzeténél fogva, ránk nézve a telepedett talaj képződése a tenger által, nem bir ugyan gyakorlati jelentőséggel; mindazonáltal evvel is meg kell ismerkednünk.

Épen az előbbieken láttuk, hogy mily roppant tömegű talajanyagot szállitnak a folyamok évenként a tengerekbe. Ezeket a tenger partjainak, szigeteinek, s a felületére nyúló sziklatömegeknek elrombolása és lehordása által ujjakkal szaporítja. A tenger hullámcsapása a partokon a legkeményebb sziklát kivájni, beontani, a kőtuskókat egymáshoz és a partokhoz verve lekoptatni, s a görgetegből idővel homokot örölni képes. A víz által a parthoz csapott törmelék és homok, mint milliárd véső hatván, a víz romboló hatását kiválóan előmozdítja.

A hullámok szélviharok alkalmával hihetetlen erőt képesek kifejteni. Péld. a plymouthi kikötő molójánál 1821. novemberében és 1829. kezdetén, a roppant vihar úgy felkorbácsolta a hullámokat, hogy azok 2—5 tonnás\*) mészkő és gránit darabokat hömpölygettek magukkal. Mintegy 300 tonnára menő ily szikladarabokat hajtott fel a tenger hullámja a moló lejtőjén, a parttól mintegy 60 méternyi távolságra. Egy helyen egy 7 tonna nehéz mészkő szikladarabot 50 méternyire lökött a hullám. A legmeglepőbb példáját szolgáltatja a tenger sziklavájó működésének a Fingal barlangja Staffa szigetén, (Hebridák), hol a tenger az oszlopos bazaltban 6—17 m. széles, 21—36 m. magas és fenekén 113, menyeyezetén mérve 76 m. hosszú alagútát vajt ki, melynek tetőzetét összefüggőbb bazalt képezi.

Hogy a lágy kőzetekből álló partokat még könnyebben szétrombolja a tenger, s így egyes szigetek teljes lehordása csak idő kérdése, azt sajnos tapasztalják az Északi tenger vidékeinek lakói.

De a tenger nemcsak ront, hanem bizonyos körülmények közt épít is, nemcsak lehordani, hanem talajt alkotni is képes. Az alig lejtő, lapályos tengerpartokon pl. az Északi tengert határoló lapályok némely részén, minden dagály iszapot és homokot hagy hátra visszahúzódása után. Előbbit azonban csak akkor nem viszi megint magával, ha a víznek ideje van azt lerakni, és visszahúzódása nagyon lassan történik. Magas dagályoknál (Hochfluth) a víz a növényzet által elfoglalt területeket is eléri, hol annál biztosabban marad vissza az iszap és homok, mely a növényeket letelepeli ugyan, de az erőteljesebbek felegyenesednek, a letelepelték a termékeny iszaphból kisarjadzanak és a talajt gyöke-

\*) 1 tonna = 1000 kilogramm.



reik és gyöktörzseikkel behálózván, azt a víz és szél által való elragadás ellen védik. E módon végre annyira emelkedik a talaj hogy felszínét már csak a legmagasbb hullámok érhetik el. Hogy az így képződött kitünő talajt (Marsch- oder Kleiboden) a magas hullámok homokkal el ne borítsák, vagy fel ne szaggassák, az azt hatalmába kerítő ember idején ellátja védő töltésekkel, árkokkal, tiltókkal és biztosítja a földművelésnek. Hollandiában és Jütl-landban évenként új meg új területeket nyer ily módon az ember a tengertől.

#### IV. A szél.

##### 1. *A futóhomok képződése általában.*

Az épen most leírt módon képződő, alig lejtő tengerpartokat a dagály nagy területen elöntvén, ha visszahúzódása elég gyorsan történik arra, hogy az iszapot magával vigye, de nem bír elég erővel arra, hogy ezt tegye a finom homokkal is: akkor nagy területeken fogja ezen laza és minden ragaszanyagot, még a finom iszapot is nélkülöző fővény a felületet kizárólagosan borítani. Ép ezt teszik azonban, habár nem oly szabályosan, a szél által felkeltett hullámok is a dagálylyal nem bíró beltengerek, és nagyobb tavak partjain. A kimosott iszaprészeket aztán a visszahúzódó hullámok a partoktól távolabb rakják le, ahol a víz mélyebb és csendesebb. A lehúzódott beltengereknek, vagy terjedelmes tavaknak megfelelő lapálymedenczék szélein, így a Nagy Magyar-medenczében is, terjedelmes területeket borít e finom homok, mely a szél játékanak folytonosan ki lévén téve, nélküli az állandóságot, s ezért *futóhomok* nevet kapott. E gyakori helyváltoztatás miatt a növényzet ékesítő takarója rajta néha sok ezer holdon, sőt négyszögmérőföldeken, egészen hiányzik, s ekkor a *sivóhomok* nevet valóban megérdemli. Hogy mennyire uralja a szél hatalma a futóhomokot, mutatja a talaj felületének apró hullámzatossága, körülbelül arasnyi hullámtávolsággal, a szélhullámoknak mintegy lenyomatát képezve; de még inkább a vihar körmei által vájt *gödörök* (vájások), a szél által felhordott s újra kikezdett *homokdombok* (buczkák), melyekből néhol csak egy-két méter vastag oszlop marad hátra, az elhordott talaj magasságának jelzésére. E czéltalan játék, e mozgó rendtelenség,



megdermedve, megtestesülve, a vájatos-, buczkák-, homokoszlopokban, s végre a finomhullámzatu felületben: ez a sívó homok a maga kietlenségében, melyen megnyugvást nem talál a szem s nézésekor oly magyarázhatatlan ür támad lelkünkben, mint a sivatag, a tenger vagy az egész láthatárt elfoglaló kopár sziklatömegek szemlélete alkalmával.

A tengerparti futóhomokot (Dünen sand), a tenger felől jövő szelek tovább-tovább söprik befelé és a parttal egyközű halmokat (Dünen) emelnek belőlük, melyeket nagyobb szelek újból megbontanak s le hordanak, hogy a tengertől távolabb más buczkasorokat alkossanak belőlük. Ily képen több rendbeli buczkalánczolat keletkezik egymás mögött, melyek tovább terjedésének gyakran a tenger felé igyekező, de mögöttük megtorlódó, megálló vizek állják útját. A homoknak a kontinens belseje felé való költözését különösen elősegíti azon körülmény, hogy nyári időben, midőn a homok leggyorsabban szárad, s különösen mennél szárazabb az időjárás, annál erősebb légáramok keletkeznek a tenger felől az erősebben felmelegedő földség felé.

A futóhomok, akár tengerparti, akár benlapályi, ha akadályra nem talál, nagy kiterjedésű termékeny vidékeket boríthat el, megsemmisítve az ember szorgalmának gyümölcsét, s kiszorítva őt lakhelyéből. Igaz, hogy ennek legtöbbször oka a homokot előbb utóbb elborító növényzetnek kiméretlen használása, a füves területek túlságos legeltetése, utak által való felvágása, felszántása, s főkép a természet által ezredek alatt megtelepített erdők kiirtása. Az elhomokosodás szomorú példáit mutatják — hogy történelem előtti időkről ne szóljunk — Aegyptom, a hires Landes Franciaországban és Északi Németország terjedelmes homok területei, valamint hazánknak sívó homokkal borított vidékei is.

## 2. A futóhomok képződése a Nagy Magyar Medenczében.

A homokos talaj kiterjedését a magyarországi lapályokon Dietz 600—700 négyzetmérföldre teszi, melyből jelenleg csak mintegy 189000 holdat fed erdő.\*) Előbbi igen jelentékeny területnek körülbelül fele lenne azonnal futóhomokká, ha védő nö-

\*) Bedő A., a Magyar állam erdőségei. I. k. 82. l.



vénytakarójától megfoszthatnék. E homokterületek kifejlődését következőképen lehet magyarázni,\*)

A Nagy Magyar Alföld medenczét nagy mélységig agyagos és homokos diluviál rétegek fedik, melyekre később, jelentékeny vastagságu lösz telepedett le, melynek képződését némelyek jégátraknak, mások állóvíznek, mások pedig (Richthofen, lásd alább a 4. p. alatt) a szélviharoknak és növényzetnek tulajdonítják. Ezen, a diluviális tófenék felett kiemelkedő lösztelepülés, a lassanként visszahúzódó vízmedencze körül koszorút alkotott, melynek maradványai megvannak a Duna jobb partján Veszprém, Somogy és Baranyamegyében, vonulata innen követhető tovább Horváth-Szlavonországba is. Folytatásának vehető innen keletre a telecskai és titeli löszplató, melyek előbbiekkal körülbelől egyenlő magasságra emelkednek, s a löszkoszoru elrombolt déli része maradványainak tekintendők. Az egykori vízmedencze északi és keleti szélein, Vácztól Miskolczon, a Hegyalján és Szathmármegyén át, azaz a váczi hegységtől a Bihar hegységig követhető a lösz koszorú.

A Nagy Magyar Medencze többi részein nem találunk valódi löszet, hanem csak annak iszapolási termékeit. Ugyanis részint a tó szélein a hullámok, részint a légbeli csapadékok, patakok, folyók, folytonosan hordották le a lösz felületét, a hullámok csapadosva, nyalva, ontották, mosták és szállították azt a tó belsejébe; miközben a durvább alkatrészt a finomabbtól elválva, a homok a partokon, ellenben a finom, agyagos iszap a tó belsőbb részein ülepedett le. Innen van az, hogy a Nagy Magyar Medencze szélein a löszre rendszerint a homokos területek s csak ezekre következik az agyag, mely a medencze belsejét foglalja el.

Hogy egyébiránt ezen iszapoláshoz nemcsak a lösz, hanem a tó fenekét képző más diluviális lerakódások is szolgáltatottak anyagot, az természetes. — Amint a nagy tónak vize a mostani Dunaszorosat Bázias és Orsova közt mind mélyebbre vágta, lassanként lecsapolódva, partjaitól visszahúzódott, s az iszapolást tovább folytatta, szélein homokot hagyva, mely annál finomabb volt, mennél közelebb rakódott le a tó közép részéhez, hol már

---

\*) Ezt valamint a Nagy Magyar Medencze homokos területeire vonatkozó többi adatot, Vessely J. „Der europäische Flugsand und seine Kultur, Wien, 1873.” című munkájából merítettük.



csak iszap települt le. A tó további lecsapolódása következtében végre csak nagyobb tavak és mocsaras vidékek maradtak hátra, s kifejlődtek a Duna és Tisza, valamint más folyók medrei is a régi tó fenekét képző lapályon, úgy amint azt ma látjuk. A parti homok koszorú a szél játéka lett és sok helyről, melyet kezdetben borított, máshová költözött, gyakran agyagrétegekre települt. Ez az oka, hogy most a homokkoszorú sok helyen meg van szakadva, s nem mindig találjuk azt közvetlen a lőszen belül, hanem gyakran attól határozatlan távolságban.

A vácsi és a Cserhát hegységre (Egerig), támaszkodó lőszterülettől befelé fekszik a Duna és Tisza közt a kunsági futóhomok; Miskolcznál a Bükkhegységre támaszkodó, s a Hegyalján végig, tovább a Vihorlát-Gutin hegység mentében Szathmárig és innen Nagyváradig terjedő s nagyobb részt lőszszel borított területre befelé, megint homokos területek következnek, melyekhez a Nyírség futóhomokja is tartozik; végre a lőszkoszorú déli részének, melyből már csak a telecskai és titeli lőszplató marad fenn, megfelel a deliblati futóhomok.

Ahol a homok növénytakaró által megkötve nincs, ott most is költözik a fő széliránynyal; így a Hajduságban délre, a Kunságban délkeletre és a bánsági sivatagon északnyugatra; mi által lassanként agyagos területek is boríttatnak el homokkal, ellenben attól helyenként újból meg is szabadíthatnak.

### 3. Magyarország legnagyobb homokterületei.

A Nagy Magyar Medenczében következő homokterületek legjelentékenyebbek és legismeretesebbek:

A kunsági futóhomokvidék, 160 □ mfd. kiterjedéssel. Ez a legnagyobb részét foglalja el azon halmos földhátnak, mely a Duna és Tisza mostani medre közt a vízválasztót képezi, Vácztól Szabadkáig terjed, csekély domborodással bir, és főkép a Kecskeméti pusztát foglalja magába. Ezen földhát tengerfeletti magassága Aszódnál 250, Albertinál és Czeglédnél 190. Kecskemét-nél 160 és Szabadkánál 116 méter; legalacsonyabb széle a Duna mellett Vácznál 100, Bajánál 65 méter.

A Nyír homokvidéke mintegy 70 négyzet mértföldre terjed a Tisza balpartján, a Nagy Magyar Medence északnyugati szegletét foglalja el, kiterjed Szabolcs, Szathmár és Biharmegye északi



részére, és a Tisza medre felett 30–50 méter magas földhátat képez. A Nyir homokja nagyobb humusztartalmánál fogva a többinél átlag sötétebb színű és termékenyebb. Torlatai magassága rendszeren 4 métert nem halad meg; de azok helyenként, mint Kálló, Bogdány, Anarcs, és Madánál igen magasra emelkednek. A Nyir legnagyobb részt jelenleg kopár, erdőtlen terület; csak itt-ott lehet még erdőt találni rajta és kisebb-nagyobb ákáczos foltokat és sorokat.

A bánási homokterület, mely nemcsak Magyarország, hanem egész Europa futóhomok területei között a leginkább felkelti bámulatunkat, egy nagy kerüléket képez, mely Alibunárnál elkeskenyedik, és Palánkánál a Duna mellett végződik;  $4\frac{3}{4}$  mrf. hosszú,  $1\frac{1}{2}$  mrf. a legnagyobb szélessége és 7 □ mértföldnél nagyobb a terjedelme. Ezen sivatag felülete hullámos, hosszúra nyúló hegyszerű homokbuczkákkal, melyek általában a terület hossz tengelyével egyközűleg, délkelettől északnyugatnak húzódnak. E buczkák a legközelebbi mélyedésektől mérve 30–55, a homokterület közép magasságától pedig 20–25 méternyi magasságra emelkednek; a homokot költöztető délkeleti szélnek fordított oldalakon szeliden lejtők, az ellenkező oldalon ellenben meredek.

Jelenleg a hajdani sivatag nagyobb részint erdő pásztákkal és azok közt füves helyekkel van átszeldelve; a fedetlen homokterület mintegy 3 □ mértföldre tehető, melyből  $\frac{1}{3}$  rész teljesen csupasz és folytonos költözködésben van.

A jársági homokterület terjedelme mintegy 26 □ mrfd. mely nyugati és keleti részre oszlik, Jászberényt közbe vévén.

A budapesti homokvidék nagy számú apró futóhomokterületre van oszolva.

Ezen nagy homokvidékeken kívül még számos apróbb van, melyek nagy része általánosan még nem is ismeretes.

#### 4. Lőszképződés légi uton.

Légi uton való képződésnek (subaërische Bildung) tartja báró Richthofen azon terjedelmes, néhol 600 métert elérő vastagságú lősztelepüléseket, melyeket Chinában tanulmányozott, s melyek egész 2400 tengerfeletti magasságra is emelkednek. Az ő felfogása szerint ezen lősz oly vízben szegény medenczékben képződik, melyeknek nincs lefolyásuk.



Ily helyeken halmozza fel lassanként a szél a medenczét körülvevő magaslatokról lehordott mindennemű talajanyagot, a mely részint a kőzetek málladékából, részint a növényzet elkorhadt maradványaiból áll. Ez elmélet valószínűségét nemcsak a futóhomok támogatja; hanem a mészkőhegységeinken is (a Balaton nyugati partjain, Tornamegyében, s különösen a Karsthegységben) ismeretes azon tény, hogy a laza talajt az erős viharok elhordani képesek. Ez anyagokhoz csatlakoznak a hegyek lábánál természetesen a — habár nem gyakori — esőzések által lehordottak is. Ezen talajon a klímának megfelelő növényzet telepszik meg és alkot gyeptakarót, azt megköti, s a felső réteget humusszal és az alsóbbakból felvett ásványisókkal gazdagítja. E közben mind újabb porrétegekkel gyarapszik a képződmény, mind magasabbra emelkedvén annak felülete. Ezen nézet mellett szól számtalan száraz földi, gyakran igen vékony csigahéjak jelenléte, ellenben a vízi állatok maradványainak és a rétegeességnek teljes hiánya a mondott löszben; végre azon finom hengeres cső alakú üregek, melyek elkorhadt gyökereknek felelnek meg.

Ha az így lösszel kitöltött medence azután lefolyást kap kifelé, ekkor a — habár csak időszakiasan előjövő — vizek számos mély barázda, azaz többé-kevésbé meredek falu völgy által szeldeklik át, szaggatják darabokra a lösztérseget. — Ezen leírással nagyon egyeznek, az erdélyi u. n. Mezőseget nagy területeken borító lösz viszonyai is.

#### IV. Fejezet.

### A növény- és állatország közreműködése a talajképzésben.

#### I. A szerves világ megtelepedése a kőzeteken.

Midőn földünk alakulása történelmének ős érájában a föld felületének és a légkörnek viszonyai oda fejlődtek, hogy a szervesélet megjelenhetett; legelőször kétségkívül csak oly legalsóbb rendű növények telepedhettek le a pusztá kőzetekre, melyek tisztán szervesetlen anyagokból képesek voltak táplálkozni, magukat fenntartani és szaporodni. Csak azután találták meg ott, létük feltételeit azon szervezetek, melyeknek a szervesetlen világ által



nyújtott anyagokon kívül még más lények által készített szerves anyagokra is volt szükségük. Ezek az élődi növények és az állatok. A föld kérgének rétegei elvitázhatatlanná teszik azonényt is, hogy anióta a szervesélet első hirnőkei a geologia őskorában megjelentek, mai napig folytonosan emelkedik az élő lények fajainak száma és fejlettségüknek tökélye. De a legfejlettebbek és kevésbbé fejlettek mellett ott találjuk még az egyszerű ősalakok képviselőit is. A földkereksége ezen benépesedésének hű képét nyújtja kicsiben és legfőbb vonásaiban minden, a tengerből vulkáni erők által kiemeltetett szűz sziget; éppúgy mint a vulkánok nyílásán kifolyó és sziklává keményedő láva, a kiszórt vulkáni homok és hamu; valamint a felhőszakadások által kopaszra mosott kőszikla, a földrengés által összezúzott sziklatömeg, vagy a szél által buczkává felhalmozott kopár homok, vagy végre a folyók által kiterített nyers iszap.

Mindezeknek az eső vagy harmat által nedvesített felületén megakadnak a moszatok (algae) sporái; a moszattelepeken azokkal együtt élő gombák fejlődnek ki, képezvén a rejtélyes zúzmókat, melyekről ma már be van bizonyítva, hogy nem egyebek, mint moszatokat fogvatartó gombateleppek. A moszatok és zúzmók a kőzet felületén bőségesen megkapják a táplálkozásukhoz szükséges ásványi tápanyagokat; a légből a kivánt szénsavanyt és ammoniát. Ezeknek segítségével felépítik telepüket, mely elhalása után korhadásba megy át. Az így származott, s legfőképen a légből eredő, széndús korhadékon újból hasonló növények, később mohák és a korhadékréteg további gyarapodásával edényes virágtalan és apróbb virágos növények telepednek le. Ugyanezen idő alatt természetesen az elmállásnak légköri tényezői is segítnek a növényország magasabb rendűinek előkészíteni az utat a bevonulásra, s nemsokára a fűvek mellett a cserjék, s később a fák is illő fogadtatásban részesülnek az új gyarmatban. De a növények sem nézik összedugott kézzel a légköri tényezők azon igyekezetét, hogy számukra az ásványi talajt előkészítsék; hanem maguk is lényegesen közreműködnek ebben, még pedig vegyileg és erőműveleg. Zúzmótelepek, száraz virágtalan növények gyökszállai és a virágosoknak gyökerei, mindnyájan bírnak azon képességgel, hogy felületökre kevés savanyú nedvességet választanak ki, melynek a kőzetre való maró hatása folytán azt megtámadják s a fel-



oldott ásványi anyagokból a szükségeseket felveszik.\*\*) A gyökszálak a legfinomabb repedésekbe behatolnak, s a fennebbi hatásuk által annak felbomlását legalább a felületen siettetik; az élő növények, kivált a cserjék s fák gyökerei, megvastagodásuk által a kőtuskókat egymástól széttolják, mi által más gyökerek behatolását megkönnyítik. Sőt némelyek a gyökér által kiválasztott anyagoknak még humifikáló képességet is tulajdonítanak.\*\*\*) A kőzetrepedések föld- és kőromtöltelékét behálózó gyökérzet elkorhadása által azon finom széndús anyag jut a talajba, melyet korhadéknak, humusznak vagy televénynek nevezünk, melynek majd egész tömege a lég szénsavából és víztartalmából veszi eredetét, s onnan az ásványi talajba jutott, annak tömegébe ékelődött be ezer meg ezer gyökszál és vékonyabb vastagabb gyökér alakjában. Ezen így becsempészett korhadék a talaj termékenységét oly annyira emeli s ott annyira szükséges, hogy nélküle némely tiszta ásványtalaj a nemesebb növények által éppenséggel lakhatatlan.

De a korhadás folyama alatt fejlődő savanyú anyagok, az úgynevezett humusz-savanyok, s még nagyobb mértékben a korhadás legfőbb légnemű terménye, a szénsav is, víz által elnyelve, amint már tudjuk, a kőzetek vegyi felbomlásának leghathatósabb eszközlője. Sőt az élő növénytakarónak, — mely a kőzet felületét nedvesítő légköri csapadékokat onnan gyorsan elillanni nem engedi, — pusztá jelenléte is elősegíti, folytonosabbá teszi a kőzetek elmállását. Ki kell itt még emelnünk a növényéletnek azon felette fontos eredményét, hogy a talaj mélyéből felvett hamu alkatrészeket (s ezen kívül nitrogén vegyeket is, melyekről alább fogunk szólni), hulladékaik által a talaj felső rétegében gyűjti meg, tehát épen a gyökerektől leginkább átszótt réteget javítja.

A wageningeni kísérleti állomáson egy terméketlen homok talaj (Heidesandboden) elemzésénél találtatott:\*\*\*)

\*) Dr. Ad. Mayer. Lehrb. d. Agricultur-Chemie 1886. 56. l. E tekintetben néhány kísérletről tesz említést.

\*\*, H. Holisch. Ueber Wurzel-Ausscheidungen und deren Einwirkung auf organische Substanzen. (Der Naturforscher, 1888 No. 26. S. 215.)

\*\*\*) Dr. Ad. Mayer i. m. 61. l.



|                                         | A talajnak |       |         |
|-----------------------------------------|------------|-------|---------|
|                                         | legfelső   | közép | legalsó |
|                                         | rétegében  |       |         |
| Ca CO <sub>3</sub> . . . . .            | 0          | 0     | 0       |
| P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> . . . . . | 0 023      | 0 019 | 0 009   |
| N (könnyen felbontható) .               | 0 023      | 0 007 | 0 007   |
| Ca O . . . . .                          | 0 03       | nyom  | nyom    |
| Mg O . . . . .                          | 0 01       | 0 02  | 0 004   |
| K <sub>2</sub> O . . . . .              | 0 01       | 0 01  | 0       |
| S O <sub>3</sub> . . . . .              | nyom       | 0     | 0 004   |
| Izzítási veszteség (humusz)             | 13 6       | 0     | 0       |

A tápanyag-gyűjtőképességnek nagy jelentősége van az erdőnél, melynek fái igen jelentékeny mélységből veszik fel hamualkatrészeiknek egy részét. Az őserdők televényben gazdag talajának rendkívüli termékenysége ebben leli magyarázatát.

A fennebbiekből láthatjuk, hogy a növények mind élő, mind elhalt állapotukban közvetlen és közvetve, jelentékeny szerepet játszanak a talajképződésnél.

Ahol növényzet van, ott az állatélet sem hiányzik, mely a szerves és szervetlen természet közötti körfolyamot gyorsítja, a megemésztett növényi anyagokat a talajnak vissza adja, de végre saját testével is adózik a természetnek.

## II. A szerves anyagok felbomlása általában.

Minden szerves anyag, mely az azt létrehozó élet hatásköréből kilépett, minden elhalt szerves szövet, felbomlásnak van alávetve. Megszűnván az élet befolyása a szerves testben, az egészen más körülmények közé, más erők hatáskörébe jut, mint a milyenek közt képződött és fennállt. Ezen új erők hatásának egy szerves test sem állhat ellent, hanem előbb-utóbb meg kell változnia, fel kell bomlania, mint a kőzeteknek a légbeliek befolyása alatt. De ámbár a vegyész tisztán vegyi hatások által is könnyen felbontja és megsemmisíti a szerves testeket, s nem lehet kétségbe vonni, hogy némely növényi anyag a légköri anyagoknak tisztán kémiai hatása alatt is bizonyos fokig bomlásnak van kitéve, pl. az elvágott vagy összeronsolt alma, burgonya, stb. a levegőn azonnal megbarnul; mindazonáltal a legtöbb szerves test szervetlen vegyületekbe való átvitele csak igen lassan és tökéletlenül, s tán sok testnél éppen nem is következnek be közönséges légköri



viszonyok közt, élő szervezetek közreműködése nélkül. A legújabb időben véghez vitt számos kísérlet nyilván bizonyítja, hogy — az égési tüneteményektől eltekintve, — a szerves testek felbomlásánál többnyire szerves élőlények működnek közre, főképen az egy sejtű őslények seregéből; de ezen legegyszerűbb elődi lényektől egyfelől a magasb rangu gombákig, más felől pedig a legkomplicáltabb szervezetű állatokig, folytonos láncolatot lehet kimutatni, melynek minden tagja a szervesanyagok felbontásán fáradozik. Ily bomlási termények az állati ürülékek is, melyeknek még teljesebb felbomlását megint a sehol sem hiányzó egy sejtű lények végzik be. Legnagyobb jelentőséggel bírnak a szervestestek felbontásában az úgynevezett hasadó gombák (*Schizomycetes*); de ezeken kívül különösen a növényrostok felbontására nézve legfontosabbak a tulajdonképeni gombák, melyek myceliumai a korhadásnak indult fában, a lehult levelek nedves rétegeiben, mindenütt felfedezhetők. Minden szerves anyag a felbomlásnak különböző s némelyik többféle folyamatán megy keresztül, az ezt előidéző szerves lények faja szerint. E folyamatok némelyike a bonyolódott szerves vegyeknek egyszerűebbekre való szétválásában áll; ilyen a cukoroldatok erjedése, midőn a cukor alkoholra, szénsavra és vízre válik szét; ilyen a hús, tojás, s más fehérnyefélékben gazdag anyagoknak elrothadása, amidőn ammonia, kénhydrogén s más roszszagu anyagok fejlődnek. A felbomlási folyamatoknak más csoportjánál megint az oxygen közbenjárása okvetetlen szükséges; ilyen a bornak megeczetesedése, a fának revesedése stb. A felbomlás e folyamatai által a szerves anyag nem megy által egyszerre csupa egyszerű szervetlen testekbe; hanem a bomlási termények különböző fokozatain halad végig, melyek mindig egyszerűebbekké válnak további szétválás, vagy oxydatio és egyszerű vegyeknek leválása által, míg végre az egész test, a szervetlen természetben is felfedezhető egyszerű testekre bomlik fel. E közben a szétválás és oxydatio tüneteményei egymást válthatják fel. Legközönségesebb vegyek, melyek a szerves anyagok teljes felbomlásából származnak: szénsav, víz, ammonia, salétromossav és salétromsav.

Minthogy a talajban és annak felszínén az állati és növényi anyagoknak minden neme előfordul, s a felbomlásnak más feltételei is megvannak: ennél fogva ez a legkedvezőbb mezeje a felbomlás



minden kigondolható módosulatának is. Azoknak bővebb tárgyalása által azonban jóval túl mennénk feladatunkon. Itt tehát csak a növények szövetét alkotó anyagoknak a talajban és annak felszínén végbemenő felbomlását adjuk elő, miáltal a talaj termőképességére nézve oly nagy jelentőségű korhadék vagy televény képződik.

### III. A televény képződése.

A növényeknek elhalt részei, lefonnyadt lehullott levelei, s végre az egész elhalt növénytest csakhamar felbomlásnak indul. Az erdőn minden évben nagy mennyiségű lomb, leszáradt ágak, gyümölcsök, egész elhalt és kidőlt fatörzsek, hullnak a földre; a levágott fák tuskója, gyökerei, ezen kívül fel nem használható sudara és ágai, gyakran lehántott héja stb. eff. ott maradnak; a talajt gyakran borító zúzmók, mohák, gyomok és cserjék közül évente sok elhal.

A növényzet ezen anyagokban kamatostól, gazdagon adja vissza a föld ajándékát; mert az abból felvett ásványi anyagok mellett még azok mennyiségét 20 - 50-szeresen meghaladó, szén, oxigén, hidrogén és kevés nitrogénből álló növényi szövetekkel fizet vissza. A talaj felületét e szerint a növényhulladékok, ott ahol a természet magára van hagyatva, még túlságosan is elboríthatnák, ha a szaporodással szemben nem állana az apadásnak folyamata, amely ezen anyagoknak felbomlásából áll. Ezen felbomlást, melyhez az oxigén mérsékelt hozzájárulása szükséges, korhadásnak (Vermoderung) nevezzük. A növénysszövetek felbomlásának kezdetét, azok rendes színének elvesztése, megváltozása jelzi. A belső szöveteknek rendszeren fehér vagy általában világos színe az elhalás után csakhamar, a hasadó gombák kizárásával is, fakóbarnára változik, mely mindig sötétebbé válik; a növénytest, abszolút súlyának folytonos apadása mellett, elveszti szövetét és végre morzsalékos vagy porvás, sötétbarna vagy fekete anyag lesz belőle, melynek korhadék vagy televény (humusz, Mull, Moder) a neve.

Az erdő évenként hullatott lombjának televénynyé való átváltozását, a talajtakaró megvizsgálásánál, felülről lefelé, lépésről lépésre lehet követni. Legfelül találjuk késő ősszel az épen lehullott száraz lombot, alatta a múlt tél hava és az esők által



rétegesen összelapult és gomba myceliumok által áthatott (megpenészedett) réteget, melynek alsóbb részében a levelek s más hulladékok már szét vannak foszladozva; a parenchymás szövetek elenyészve, s csak a rostosak mutatják még itt-ott többé-kevésbé a levél alakját; még alább, közvetlen az ásványi talaj felett találunk egy, rendesen csak igen vékony, barnás-feketés, purvás réteget, mely már a kész televény. Ennek a finomját az eső és hóvíz, a talaj finom likacsain átszivárogván, magával viszi s ott lerakja, miáltal az ásványi talaj maga is felső felében barnás-fekete színt ölt, mely lefelé elmosódik. Ezen kívül bizonyos humuszanyagok oldhatók is és a vízzel a talaj mélyebb rétegeibe jutva, ott megint kicsapódhatnak. Hogy a talaj belsejébe a gyökerek elkorhadása által is jelentékeny mennyiségű korhadék jut be, már fennebb mondva volt. A televényben mindig található néhány % gyanta- és viaszszerű, valamint zsíros anyag is. Ez a növényi és állati eredetből, s ezen anyagok állandóságából magyarázható.

A televényt alkotó többi anyagok, a szerint amilyen növényi testekből és aminő körülmények közt képződtek, s különösen a szerint, amint a felbomlás kevésbé vagy jobban előhaladott, különbözőek. Meg szokták különböztetni az u. n. k ö z ö m b ö s televényanyagokat (indifferente Humusstoffe) és a s a v a n y u televényanyagokat (sauere Humusstoffe). A k ö z ö m b ö s televényanyagok különféle, még kevésbé ismeretes testek, melyek közt Mulder kétfélét különböztet meg, u. n. az ulmin és a huminanyagot. Előbbi barna, utóbbi fekete, s vegyileg főként abban különböznek, hogy amabban több a hidrogén és kevesebb a széneny, mint utóbbiban. A humin tehát a korhadásnak (humificatio) már előhaladottabb fokán áll, mint az ulmin. Egyébiránt köztük átmeneti állapotok is léteznek. Mayer (Dr. Ad.) szerint mind az ulmin, mind a humin úgy tekinthetők, mint szénhidrátok, melyek növényi szénhidrátokból az által keletkeznek, hogy azok lassanként több és több  $H_2O$ -t vesztenek, egyuttal  $C$ -t is, de kisebb arányban. Ez uton viszonylagos  $C$  tartalmuk növekedik. Míg pl. a cellulose áll 44.4  $C$ , 6.2  $H$  és 49.4  $O$ -ból addig a czukorból elő állított huminban, találtatott 64.4  $C$ , 4.3  $H$ , és 32.3  $O$ .

A savanyu televényanyagok közt rendesen meg



szokták különböztetni a halványsárga ulmin-, a sötétbarna humin-, a szintelen forrás- és a világos barna forrás-üledék-savat, melyek közül tiszta vízben jó formán csak a forrassavany, kevésbbé a forrás-üledéksavany oldható.

A vízben oldott huminsavak és humuszsavas sók színe többé-kevésbbé barna. Erdőkkel fedett, mészből és mágnéziában szegény kőzetekből eredő vizek, éppúgy mocsarak s tavak vize gyakran viseli e színt; ellenben a mész- és mágnézia a humuszsavat, vele egyesülve, kicsapja oldatából, s a vizet barna színétől megtisztítja.

A növényi anyagok korhadásának legelső szilárd terményei az ulmin és az ulminsav, melyek a barnaszínű humusznak jellemző alkatrészei s oly helyeken képződnek, hova a körlég csak korlátolt mennyiségben juthat, pl. a fák odvában, a barna tőzegben, elhalt fák és tuskók gyökereiben stb. A barna humusz nedvesség és éleny közbejöttével tovább bomlik, aképen, hogy az ulmin és ulminsav oxigén felvétele és szénsav és vízgőz fejlesztése mellett huminba és huminsavba mennek át, melyek a fekete humusz fő alkatrészeit képezik. További oxydátio által a fekete humin és a huminsav forrassavvá, ez pedig forrás-üledéksavvá változik át, míg végre további oxigén felvétele mellett a legutolsó is teljesen szénsavvá és vízzé bomolhat fel. Az előbb említett humuszsavak azonban sem a vízben, sem a talajban nem szoktak szabad állapotban, hanem aljakhoz, kiválóan pedig ammoniához kötötten elő fordulni; de így is csak átmenetiesen, mivel oxigén felvétele mellett nemsokára szénsavas sókká változnak át. Megjegyzendő, hogy a közömbös televény csak részletenként és nagyon nehezen megy át az említett savakba, s mivel utóbbiak nemsokára képződésök után szénsavra és vízre bomlanak fel, rendes viszonyok közt a talajban meg nem gyűlhetnek, s így a televény zömét a közömbös humusz szokta képezni. Ennek felbomlását aljas (basicus) hatású agyagok, pl. ammonia, szénsavas káli, nátron, mész, mágnézia stb. közvetve elősegítik; mert a képződő savakat azonnal megkötik, azok antiszeptikus hatását megszüntetik és így a humusz további felbomlásának egyik akadályát elhárítják. Nagyon siettetli a szervesanyagok felbomlását éleny hatása alatt a vas, mely könnyen élenyül, élenyét azután a korhadó anyagoknak adja át, s maga újból vesz fel ilyet, tehát közvetítő szere-



pet játszik. A felbomlásnak esetleg beálló teljes bevégződése után nem marad a növényi anyagokból egyéb hátra, mint azon ásványi sók, melyeket a növények a talajból felvettek volt. Ekép vissza-kerül a légbe ami a légé, a földbe ami a földé.

A korhadás folyamatának fennebb vázolt menete korántsem vehető teljesen tisztázottnak. A humuszanyagok miléte és képződése felett még sokáig nem lesznek befejezve a vizsgálatok s kiegyeztetve a nézetek.\*)

A közömbös televényanyagok felbomlása különben sok esetben rendkívül lassu, úgy hogy századokig is daczolnak a légköri hatókkal.

A televényanyagokban nitrogén is van jelen, még pedig oly alakban, mely rendkívül erősen ellentáll a felbomlásnak és csak felette lassan megy át oly vegyületekbe, melyeket a növény gyökerei által felvehet; aminek meg van azon jó oldala, hogy ámbár a növények csak apránként használhatják fel, de annál kevésbbé van kitéve a csapadékok által való kilugozásnak.\*\*) A természetnek ezen gazdálkodása továbbá a televényanyagok kötött nitrogénjának a talajban való felszaporodását előmozdítja.

#### IV. A televény képződését módosító körülmények, s a televénynek ezektől feltételezett módosulatai.

A televénynek különböző módosulatai még elegendően megvizsgálva és leírva ugyan nincsenek; de amelyek nagyobb terjedelemben való fellépésük és felötlőbb tulajdonságaiknál fogva az erdőtenyésztők s földművelők figyelmét magukra vonták, azok a következők.

1. Szelid vagy termékeny televény (Milder oder fruchtbarer Humus), mely mind a fás, mind a gazdasági növényeknek legjobb. Ez mérsékelt nedvesség, közepszerű hőmérséklet és a légnek könnyű hozzájárulása mellett és elegendő aljas hatásu ásványi anyagoknak (mész, káli, nátron stb.) és ammoniá-

\*) Lásd e tekintetben F. Hoppe-Seiler: Ueber Humus-Substanzen. Zeitschr. für physiologische Chemie. 1888. Bd. XIII. S. 66. C. G. Eggert. Studien und Untersuchungen über Humuskörper der Acker- und Moorerde. Biedermanns Zentralblatt für Agriculturechemie, 1889. No. 2. S. 75 stb.

\*\*) Dr. Ad. Mayer, ism. munk. 69. l.



nak jelenlétében származik, mely utóbbiak a képződő humusz-savanyokat azonnal megkötik, közömbösítik.

Legnagyobb mennyiségben találjuk tehát e televényt a jó zárlatu, nagyobb terjedelmű erdőkben, melyeknek talaja a szél és napfény ellen védve van, s amellet nem mocsaras. Mennél teljesebben végbe ment a korhadás, annál kedvezőbb a televény hatása a növényzetre. Egyébiránt ily szelid televény nemcsak erdőben, hanem minden növényzettel borított, illően beárnyékolt talajban képződik, melyhez a meleg, levegő és nedvesség kellő mennyisége egyidejűleg hozzájárulhat.

Ujabb időben némelyek nagy jelentőséget tulajdonítanak az ásványi anyagokkal illően kevert és úgyszólván apró morzsalékokra osztott televény képződésénél a földi gilisztáknak, melyek növényi hulladékokból táplálkoznak. E hulladékok a giliszta tápésővében a legfinomabb részecskékre osztva, az emésztési nedvekkel s az ürülék-anyagokkal keveredve jutnak megint apró morzsalékokban a talajba. Hogy ezen uton a legfinomabban osztott és legkedvezőbb módon átalakult televény-anyagnak kell képződni, azt könnyen beláthatni. Ezen kívül némely földi gilisztának, pl. a legközönségesebb *Lumbricus terrestris*nek még azon jó tulajdonsága is van, hogy a talaj felületének kiszáradása vagy meghűlése következtében annak mélyebb rétegébe vonul vissza, s e czélra függélyes járatokat készít, még pedig aképen, hogy az útjában lévő földet mindenestől megeszi, elnyeli, s teste másik végén ganájával keverve részletekben kiadja. Így a neki megfelelő, mérsékelt nedvességű földet a számtalan földgiliszta lassanként  $\frac{1}{2}$ —1 méternyi mélységre oly teljesen átdolgozza, amint azt emberi kéz tenni nem képes. Némelyek a következőkben leírandó humuszfajok kedvezőtlen tulajdonságát jó részben éppen annak tulajdonítják, hogy azok képzésében, a talaj alkalmatlan fizikai tulajdonságai miatt a földi giliszták nem vehetnek részt.\*)

A giliszták ezen működését azonban túlbecsülni nem szabad, mert igen sok jó talaj van, ahol a giliszta nem található. Azt sem szabad tekinteten kívül hagyni, hogy e férgek legnagyobb számmal éppen a nedves, televényes, s nélkülok is termékeny talajban találják fel leginkább létezésük feltételeit.

Egyébiránt humuszképző működést ily értelemben éppúgy lehet a növényi anyagokkal élő rovaroknak, rovar lárváknak, csigáknak, némely crustaceáknak s több eféléknek is tulajdonítani.\*\*)

Hegységi erdőkben, kivált magas fennlapályokon szelid lejtővel bíró, vagy teknős fekvésű, szélőtől védett éjszakai helyeken, hol az alacsony hőmérsék miatt a korhadás csak nagyon lassan halad, gyakran igen vastag, félig korhadt, úgynevezett éretlen televény (Rohhumus) halmozódik fel, mely a magesemeték illő

\*) Bildung der Ackererde durch die Thätigkeit der Würmer, v. Ch. Darwin; aus dem Englischen übersetzt von Victor Carus. Stuttgart, 1882.

\*\*) C. Keller, Humusbildung und Bodenkultur unter Einfluss thiriescher Thätigkeit. Leipzig. 1887.



meggyökeresedését az ásványi talaj távolsága miatt meggátolja, azoknak, valamint a magvaknak megpenészedését s elrothadását okozza és így az erdőnek felújítását akadályozza.

De az erdőnek igen erős megritkítása s méginkább letarolása is megzavarja a rendes televényképződés menetét; mert azonkívül, hogy a talaj kevesebb korhadásra képes anyagot nyer, a nap hevének és szélnek lesz kitéve, minek folytán a nyers, valamint a korhadásnak indult erdei alom időnként teljesen kiszáradván felbomlása megakad; ellenben elegendő nedvesség jelenléte mellett a fokozott meleg és léghezjárulás a felbomlást annyira siettetí, hogy nemsokára minden televény eltűnik a talaj felületéről. Mindkét eset hátrányosan hat vissza a talaj tevékenységére és jóságára, s így a rajta lévő növényzetre is.

2. A poros televény (Staubhumus, Wildhumus) hasonlóan mint előbbi, a légnek korlátlan hozzájárulása mellett, de igen száraz helyeken képződik; tehát aránylag magas hőmérséknél és a nedvesség kellő mértéke nélkül. Azért e televénymódosulatot leginkább száraz és sovány homoktalajon, valamint forró, köves mészkőtalajon találjuk fel. Képződéséhez az anyagot főképen hanga és áfonyafajok szolgáltatják; de ezen kívül füvek, sőt néha a sivár területeket ellepő nagyobb zúzmok is pl. az Iramzúzmó (*Cladonia rangiferina*), stb. Poros, laza, rendesen igen száraz, fekete vagy feketés-barna színű televény ez, mely nagyon nehezen bomlik tovább, azért tétlennnek (unthätig, taub) mondják. Az erdei növényzet tenyészésére kedvezőtlen. Tevékenynyéválík, azaz felbomlásnak indul és jó humuszszá változik, ha az ásványi talajjal jól összevegyittetik, és a felette záródott erdő árnya a kellő mérsékelt nedvességi viszonyokat előidézi.

3. A savanyu televény (sauerer Humus) ott szokott képződni, ahol állóvíz gátolja a légnek kellő hozzájárulását a korhadó testekhez; midőn a korhadás igen lassan és tökéletlenül megy véghez. A savanyu televény tehát mocsaras, vízenyős, ingoványos helyeken, tőzeglápokon stb. jó elő. A levegőnek ily elzárása mellett meggyülő humuszsav közömbösítésére (neutralizálására), többnyire hiányzik a talajban az aljas hatású ásványi anyagok kellő mennyisége; minek folytán az ily talaj savanyu hatású, azaz pirosítja a kék lakmuszt. Hogy felbomlani képes és aljakat szolgáltató ásványokban szegény, pl. kvarczhomok-talajban, a légtől való elzárás kisebb foka mellett is és általában könnyebben képződhetik savanyu humusz, mint az ásványilag erőteljes talajokban, az a fennebbiekből kitűnik, valamint az is, hogy az



állati trágyából kifejlődő ammonia is mint a leghathatósabb alj, megköti a humuszsavanyokat.

A gyakorlatban általában azt tartják, hogy a szabad humuszsavak minden nemesebb műnővénynek és a fáknak is ártalmasok, s azokat utóbbiak közül csak az éger és nyirfa tűri meg; de több mint valószínű, hogy oly helyeken, hol a savanyu humusz nagyobb mértékben lép fel, a növényekre való káros befolyást főképen az állóvíz, s a gyökerek e miatti elrothadása okozza.

Hogy az ily talajt lecsapolás, kiszáritás, megforgatás és hamuval, mészszel, földpáttartalmu, s más, aljakat szolgáltató ásványi anyagokkal való keverés által javítani lehet, az a fennebbiekből következik.

4. Fanyar televény (adstringirender Humus) neve alatt a gyakorlatban oly humuszt értenek, mely csersavtartalmu növényi anyagokból (u. m. tölgy, egerfa, nyirfalomb, áfonya stb.) képződött, s állítólag csersavat tartalmaz.

Ez eset azonban nagyon ritkán fordulhat elő, mert a csersav a levegőn, s kivált aljak jelenlétében igen könnyen felbomlik, s a mellett vízben oldható lévén, a víz elviszi. Ahol azonban a korhadás a légtől, szívós talajréteg vagy víz által elzárva megy véghez, ott sokkal tovább tarthatja magát a csersav. Ezen televény módosulatot is ártalmasnak tartják az erdészek a fák tenyésztesére s a talaj kiszáritása, forgatása és aljakkal való ellátása által javítható, mint a savanyú humusz.

Már fennebb mondva volt, hogy a nedvesség, meleg és levegő azon összehangzó, tartós és lehetőleg egyenletes közreműködése, melyet a jól záródott, üde talaju erdő biztosít, legfőbb feltételei a legjobb erdei televény képződésének. Az erdő zárata azonban a televénynek nemcsak minőségére, hanem mennyiségére is befolyással van; mert mennél sűrűbb a lombzat, annál több a hullott levél s más hulladékok is, melyek a korhadás tárgyát képezik. De ez utóbbiak minősége is, mint könnyen belátható, lényegesen módosítja a televény minőségét és mennyiségét is. Mennél könnyebben felbomlik valamely növényrész, annál kevesebb a hátramaradó televény. A húsos gombák pl. nagyon könnyen felbomlanak, tulajdonképen főleg rothadnak; de észrevehető televényt nem, vagy alig hagynak maguk után; a nyár, fűz, juhar, körisz, hárs levelei oly gyorsan felbomlanak, hogy általában igen kevés televényt alkotnak; az akác levéllemezei is igen gyorsan felbomlanak, ellenben a levélkéket tartó főgerincz lassan korhadván, jelentékeny humusztakarót ad; a gyertyán és tölgy levelének korhadása már nehezebb, mint pl. a nyáré vagy juharé, de könnyebb, mint a bükké, melynek lehullott lombja a bajor kísérleti állomásokon gyűjtött adatok szerint átlag 3, néhol 4—5 év alatt korhad el teljesen érett humuszsá. Ezért és dús lombhullatása miatt ez utóbbi fánem televényképzésre nézve minden lombfát felül mul. A tűlevelűek közt legkönnyebben felbomlik a vörösfenyő levele; lassabban a sima fenyőé, még lassabban az erdei és fekete fenyőé, jegenyefenyőé (*Abies pectinata* DC) és a lúczyenyőé. Utóbb nevezett négy fenyőfaj lehullott tűleveleinek teljes elkorhadásához átlag 3—4 (néha 5—8) év szükséges. A tűlevelű erdőkben képződő humusz színe rendszeren vörös-barna; míg a lombfaerdőkben képződött, sötét egészen fekete-



barna. Hogy a különböző fák galyai is különböző mértékben állnak ellent a korhadásnak, azt az erdész elég jól tudja. A talajt fedő növényzet közt különösen a zúzmók és a mohák érdemelnek említést, melyek finom, porszerű korhadékot adnak; azután az áfonya és hanga, melyeknek egymásra hulló törzsei a talaj felületén többnyire igen lassan korhadnak és rosz, tétlen televényt adnak.

Hogy a talaj nedvességi viszonyai mily lényegesen módosítják a televényképződést, az már a fennebbiekből kiviláglik; de a talajnak más physikai tulajdonai sem közömbösek e tekintetben, mert a nagyon tömött talaj alsóbb rétegeiben a korhadás tárgyai (gyökerek, vagy a felforgatás által abba került más növényrészek) a légtől jobban el vannak zárva, mint laza talajban. Ezért a kőmorzsalékos nyiroktalajban a korhadás sokkal gyorsabb és teljesebb mint az iszapolt agyagban. De még fontosb szerepet játszanak e tekintetben a talaj ásványi anyagainak vegyi tulajdonságai. Mennél több és erélyesebb ugyanis abban az alkalis hatású anyag, annál gyorsabban megy a szerves anyagok felbomlása. Legélénkebb e folyamat a vashydroxydban és mészbzen gazdag talajokban, de jelentékeny a kovasavas alkáliban gazdag nyirok, s más agyagos talajokban is; míg a kvarcz és csillámhomok e tekintetben legtétlenebb. Ezért kíván a vasas és a mésztalaj legtöbb trágyázást; ezért kell a hegyi, sok felbomlatlan ásványtöredéket, s így alkáli és mészzilikátokat tartalmazó talajt is bőven részesíteni a trágyában. Egy okkal több, hogy az ily talajon az erdész is mentől több gondot fordítson a humuszképző anyagok kimélésére.

A korhadék elenyészése vagy felhalmozódása függ végre a hely fekvésétől is. Északibb vidékeken péld. lassabb lévén a korhadás, inkább felhalmozódik a humusz, mint déli vidékeken; alhavasi vidékeken inkább, mint alföldön; északi lejtőn inkább mint délin. Ahol a lombot szél, vagy víz elhordhatja, pl. hegytetőkön, gerinceken, meredek oldalakon, továbbá ritkás szálerdőben stb. ott természetesen kevesebb a televény, mint völgyalapályon, teknőkben, minden oldalról zárt erdőkben stb. Sőt ahol a szél és víz összehordja a korhadási tárgyakat vagy magát a humuszt is, ott az gyakran annyira felhalmozódik, hogy az erdő felújítását még akadályozhatja is.

## V. A korhadás terményei s azok jelentősége.

Ámbár a fennebbiekből a korhadás terményei már mindnyájan érintve voltak, még sem lesz felesleges itt azokat, az átnézetet könnyítők csoportokban felsorolni, s röviden szerepüket is a talajban megjelölni.

1. A közömbös televény (indifferenter Humus) vagy humusz-szén azon barna vagy fekete színű, szénben gazdag, de hydrogént és oxygént, s ezen kívül kevés nitrogént és hamualkatrészeket is még mindig tartalmazó anyag, melynek a talajképzésben, mint annak szilárd elegyrésze, minden korhadási termény közt legfőbb jelentőséget kell tulajdonítanunk. A növényzetre való hatása, eltekintve nitro-



gén tartalmától és hamualkatrészeitől, a talaj fizikai tulajdonainak módosításában van, melyről alább, e könyv más helyén leendő szó. Különben a viszonyok szerint kisebb vagy nagyobb erélyű bomlásnak van folytonosan alá vetve, s ha új korhadékanyaggal nem pótoltatik, bizonyos körülmények közt lassanként egészen elenyészhetnek a talajból. Mindazonáltal ki kell itt emelnünk, hogy mennél széndúsabb lett már az előrehaladott felbomlás folytán valamely humusz, annál inkább ellenáll további felbomlásnak.

2. Humusz-savak; melyek léte csak átmeneti, s rendes viszonyok közt magukra, vagy alkálikkal vagy mésszel egyesülve, csak hamar szénsavvá, illetve szénsavas sókká változnak át, ritkán teszik jelentékeny részét az összes televény alkatrészeknek, s ha igen, akkor leginkább mocsaras, tőzeges, s így az erdő- és mezőgazdaságra alkalmatlan területeken. De ha csak átmenetiesen is vannak jelen, nem lehet az általuk a talajban közvetített vegyi folyamatokat egészen mellőznünk. A humuszsavas alkáli vizben, a humuszsavas mész és mágnézia csak szénsavas vízben vagy olyanban oldható, mely humuszsavas kálit, nátront vagy ammoniát tartalmaz feloldva. Általában figyelmet érdemel, hogy a humuszsavas alkáli vizbeni oldata nemcsak más, tiszta vízben nem, vagy csak nehezen oldható humuszsavas sókat képes feloldani, hanem szénsavas, phosphorsavas sókat is; sőt a kőzeteket alkotó ásványokra nézve is oldó hatással bír. A humuszsavas oldatokban aztán különböző vegycserék mennek véghez, s a jelenlévő aljak e savakat oxigén felvételre indítván, végre a humuszsavas sók szénsavas sókká változnak át. Hogy e savaknak oldóképessége, a növényzetnek hamualkatrészekkel való ellátására nézve nem vehető közönyösnek, az a fennebbiekből kitűnik.

Megjegyzendő, hogy sem a humuszsavakat, sem a humuszsavas sókat, az eddigi tapasztalatok szerint fel nem veheti a növény; de igen is a végterménykép megjelenő szénsavas sókat Egyébiránt Dettmer kísérletei szerint a forrástüledéksav mind szabad állapotban, mind pedig ammoniával egyesülve, felvehető a növények által; Simon közlései után pedig a humuszsavas sók phosphorsavas sókkal egyesülve képesekké válnak a növényi sejthártyán való áthatolásra. Innen látható, hogy azon kérdés, valjon a humuszsavas sók semmiféle körülmények közt sem képezhetnek-e növényi tápanyagokat, még teljesen eldöntöttnek nem vehető.

Egyébiránt F. Hoppe-Seiler vizsgálatai szerint a humuszanyagok a legkülönböző ásványi anyagokkal léphetnek eddig még ki nem puhatolt természetű összeköttetésekbe, melyek azután a legbecesebb növényi tápanyagoknak képezik



tartós forrását. Ép ezt mondhatjuk a televényben jelenlévő nagy mennyiségű, nehezen felbontható és oldható még eléggé nem ismeretes nitrogén vegyületekről is, melyek — kivált bizonyos növények tápfeltevő szerveinek közvetlen hatása folytán — csak lassan használatnak fel.

3. Hamualkatrészek. Ha valamely, növényzettel borított terület terményeit az ember évenként, vagy nagyobb időszakokban (erdőgazdaság), el nem hordja; akkor a növények hulladécai és elhalt testük vissza adja a talajnak mindazon hamualkatrészeket, melyeket abból a növények egész életükön át felvettek. Ezek a kálium, nátrium, calcium, magnézium, vagy továbbá silícium, phosphor, kén, s más elemeknek többnyire oxysók alakjában fellépő vegyületei, melyeket a növény fysiologiából már ismernünk kell. Ezen hamualkatrészekből egy keveset évenként kilúgoz a víz; de sokkal többet elhord a művelés alá vett talajból az ember, az arról nyert terményekben. E veszteséget csak ott képes a természet pótolni, ahol a talajban, vagy annak ágyában még felbomlásra képes ásványi elegyrészek vannak. De az utóbbi esetben is lassabban megy ez anyagok ujraképződése, mint ezt a növények szükséglete és a termények elhordása által a kertészet és a mezőgazdaság megkívánná. A mezőgazda- és kertésznek tehát trágyával kell a hiányt pótolni. Ez az erdésznek nem áll hatalmában; neki a természet működésére kell e tekintetben támaszkodnia, s minden forrását e hamualkatrészeknek fenntartania és ápolnia. Leghathatósabb forrása pedig ezeknek az erdőn a fákról évenként lehulló levél, galyak, korhadt törzsek, s más hulladékok, továbbá a földben maradó gyökerek, tuskók, a fának értéktelen és az erdőn maradó részei u. m. vékonyabb (s néha általában minden) ága, sudara, a lehántott szálfá héja stb. Mindezeknek, a talaj tápanyagainak visszaadása szempontjából, felette nagy becsök van, melyet az erdész eléggé alig méltányolhat. Ha ezen hulladékok mennyiségét tekintetbe vesszük, s egyúttal azt sem feledjük el, hogy az ismeretes számos hamuelemzés tanúsága szerint a hamumennyiség a levelekben, ágakban és héjban aránylag sokkal nagyobb mint a törzs fatestében: akkor pontosabb számítás nélkül is meggyőződhetünk arról, hogy a rendes erdőgazdaság mellett eltávolított fatermással alig viszünk el annyi hamut, mint amennyit ott hagyunk, habár az elvitt sem mondható jelentéktelennek. De még élesebben meggyőznek a számadatok arról,



hogy a talajnövényzetből, falombból s más hulladékokból álló, televényképző anyagoknak az erdőből való elhordása a természet ellen való megbocsáthatatlan véték, melynek Németország számos területei elsilányodását méltán tulajdonítják. Ez sok homokos vidéken annyira ment, hogy már még a legelégülékenyebb fafaj, az erdei fenyő, a telepítési költségeknek gyakran rendkívüli nagysága daczára sem képes tenyészni. Különben erre nálunk sem hiányzanak példák.

A Bajorországban a 60-as és 70-es években tett kísérletek szerint az erdőnek évi alomtermése körülbelül egyenlő annak fatermésével, de az évenként termelt alom előállítására sokkal több ásványi tápanyag fordítatik, mint a fáéra, ami a következő összehasonlításból kitünik. Hektár és évenként kell kilogramm hamualkatrész :\*)

|                                                                  | bükkös-<br>ben | lúc-<br>fenyvesben | erdei |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------|
| az évi faterméshez a tuskó és ágfa be-<br>számításával . . . . . | 29·60          | 22·56              | 16·54 |
| az évi alomterméshez . . . . .                                   | 185·54         | 135·92             | 46·52 |
| Összesen . . . . .                                               | 215·14         | 158·48             | 63·06 |

Egy bükkös vagy lúczfenyőállab egy év alatt lehullatott lombjának elvitelével annyi ásványi tápanyagot távolítunk el az erdőből, amennyivel az állab 6 évi fatermését fedezhette volna. A legelégülékenyebb erdei fenyőnél az egy éven termelt lomb hamualkatrészei 3 évi fatermés szükségletét fedeznék. És ha csak a törzsfát vesszük számításba és a vastagabb ágakat, ellenben a tuskó- és rőzsefát kihagyjuk, az arányszám lesz a bükknél és lúczfenyőnél körülbelül 9:1, az erdei fenyőnél 6:1.

Ámbár a levelekből lehullásuk előtt, a legértékesebb tápanyagoknak, a kálinak és phosphorsavnak legnagyobb része visszahúzódik ugyan a fa életben maradó részeibe; mindazonáltal a lehulló lombban visszamaradó mennyiség még mindig sokkal nagyobb annál, ami évenként a fatermésre fordítatik.

Ugyanis közepes viszonyok közt egy hektáron felhasználtatik a fatermésre:

|                           | Káli              | Phosphorsav |
|---------------------------|-------------------|-------------|
|                           | K i l o g r a m m |             |
| Bükkösben . . . . .       | 4·65              | 2·87        |
| Lúczfenyvesben . . . . .  | 4·06              | 1·45        |
| Erdeifenyvesben . . . . . | 2·60              | 1·07        |

\*) Dr. Ebermeyer, Waldstreu. Berlin. 1876. pag. 116—117.



Ellenben szükséges az alomterméshez:

|                       | Káli              | Pposphorsav |
|-----------------------|-------------------|-------------|
|                       | K i l o g r a m m |             |
| Bükkösben . . .       | 9 87              | 10.45       |
| Lúczfenyvesben . . .  | 4 82              | 6.41        |
| Erdeifenyvesben . . . | 4 84              | 3.68        |

4. A folyékony és illó végtermények közül a víznek semmi jelentőséget sem tulajdoníthatunk; mert az, a légből származó talajvíz mennyiségéhez képest egészen eltűnő; a talajban előforduló szénsav ellenben legnagyobb részt a korhadás terménye és az előbbi pontban elősorolt aljak többnyire e sávvá egyesülve jutnak a növénybe. Különben is ismerjük nagy jelentőségét a kőzetek elmállásánál, mert azok nagyobb részének felbontását és feloldását e sav eszközli; de az erdő levegőjének szénsavtartalmát is kell némileg emelni a korhadás folyamának, s e légnem az élő növények levelei által felszívatra újból növényanyaggá dolgoztatik fel. Utóbbi tekintetben azonban a korhadás hatását túlbecsülnünk nem szabad, mert a szénsav diffúziója és a légmozgás folytán valószínűleg csak kis része használtatik fel annak a növények által éppen azon területen, ahol származott. Másfelől azonban tagadni nem lehet, mert tény, hogy az erdő évi hulladékából származó szénsav az erdő összes szénsav szükségletének körülbelül felét fedezhetné.

De ne feledkezzünk meg a korhadás mellett származó más két fontos anyagról sem, u. m. az ammoniáról és a salétromsavról. Nem tagadható, hogy a korhadás tárgyaiban mindig vannak nitrogéntartalmú anyagok is, melyek felbomlásuknál rendszeresen ammoniát adnak. Ez képződésénél, vagy azután, összeköti magát a humuszsavak valamelyikével, vagy a szénsavval, melyek képződését a közömbös humuszanyagokból épúgy elősegíti, mint bármely más alkáli. De alkális hatású anyagok (pl. mészkő, alkáli tartalmú szilikátok stb.) és elegendő oxigén jelenlétében a képződött ammonia salétromsavvá oxidálódik, mely amint tudva van a legerősebb sav, s bármely ásványból kiragadni képes az alkálikat és a meszet, azokkal salétromot alkotva, mely az ammoniával együtt a legbecsebb növényi tápanyagok közé tartozik; mert a



minden szervesanyagok közt legfontosabb fehérnyeműek csak ezek segítségével képződhetnek.

Dr. E. Ebermeyer szerint a lehullott lombban 5–10, az elszáradt ágakban és fában pedig 3–5% nitrogéntartalmu növényi anyag van. Ebből körülbelül annyi ammonia és salétromsav képződhetik, amennyi újból képes ugyanannyi fehérnyefélének képzésére szolgáltatni a szükséges anyagot, amennyit a korhadó hulladékok élőkorukban tartalmaztak.

Több rendbeli kísérlet igen valószínűvé teszi, hogy a korhadásnál a légnek szabad nitrogénja a kiszabaduló hydrogénnal egyesülve, ammoniát képezhet. A korhadék tehát közvetve is forrásává válik az ammoniának. De eltekintve e kétes esettől, teljesen bebizonyított ténynek vehetjük, hogy a sejtes növények közt olyanok is vannak, melyek a nitrogén mentes növényi anyagokból képesek táplálkozni, s fehérnyemű anyagaik felépítéséhez e közben a lég ammoniáját felhasználni; ilyen például az, mely az alkoholerjedést előidézi.

Ezen kívül új forrását találjuk a talaj ammon- és salétromsav sóinak azon mohok és zúzmók, meg más talajnövények elkorhadásában, melyek fehérnyemű anyagaikat a lég és talaj salétromsava és ammoniája segítségével képezik, s így ez értékes növényi tápanyagok gyűjtőiként szerepelnek. Általában mennél gazdagabb a talajban és talajon a növényi és az állati élet, annál nagyobb ott azon értékes töké, mely nitrogén tartalmu vegyekben a növényzetnek továbbra is rendelkezésére áll. És hogy a korhadó hulladékok a szerves élet gazdagságát a talajban és annak felületén hathatósan elősegítik, az kétséget nem szenved. Ezen tényező a talaj termőerejének fenntartásában mindeddig igen kevésbé véteztet számba; pedig igen fontos, mert belőle következik, hogy a talajban létező szerveséletet kitelhetőleg ébresztetni, fenntartani és gyarapítani, az erdőtenyésztő és földművelőnek érdekében áll; s minden, ami azt csökkenti és lejjebb szállítja, egyszersmind a terület elsivárodását is siettet. Hogy e tan egyébiránt a műnövények ellenségei ellen való harcunkkal nincs ellentétben, azt az elfogulatlan könnyen beláthatja.

Fennebb kifejtett nézetünket támogatják H. v. Post\*) vizsgálatai, melyek szerint a tulajdonképeni korhadékban (Mull, Humus) a növényhulladékok közt

\*) H. v. Post. Ueber koprogene Bodenbildung der Jetztzeit, Schlamm Moor, Torf, Mull. Bearbeitet und übersetzt von E. Ramann. Landwirthschaftliche Jahrbücher. 1888. S. 405–420.



meg lehet különböztetni gombamycéliumokat, virágport, spórákat, zöld moszat-sejteket és pálmellászerű (élő) moszatokat; az állati maradványok közt rovarrészeket, szőröket, chitindarabokat; ezen kívül tömegesen vannak benne élő és elhalt rovarok, lárvák, acaridák, férgek, csigák stb. Maga a humusz nagyjából szétrágott növényrészekből áll s ezeken kívül barna, morzsalékos alkatrészekből. Az egész humusznak gyakran  $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$  része nem egyéb állati ürüléknél.

1851

/1866/



## Második Rész.

---

### A talaj alkatrészei és tulajdonságai.

#### I. Fejezet.

#### A talaj alkatrészei.

##### A) Eredetükre nézve.

##### 1. Az ásványi alkatrészek.

##### a) Ásvány- és közettani tekintetben.

A talajban az ásványok közül leggyakoribb a kvarcz és a csillám; sokszor jelentékeny mennyiségben fordul elő a földpát is. A kőzetek közül az agyag, melyhez a limonit (vashydroxyd) gyakran van kisebb-nagyobb mennyiségben keverve; de a szén-savas mész is gyakran hatja át. Azonban bármely ásvány és minden kőzet törmeléke is részt vehet az ásványi talaj összetételében; különösen az anyakőzeté az eredeti talajnemeknél.

##### b) Vegytani tekintetben.

A víz által áthatott talajban különböző sóoldatokat találunk, melyek a víz elpárolgása után a talaj repedékeiben, finom lika-csaiban, s a szilárd alkatrészek oldalain megszilárdulnak, kijege-czednek és bevonatot alkotnak. Ezek leginkább a szénsavas és kénsavas mész és magnézia, konyhasó, néha salétromok s mások. Sok dolog arra mutat, hogy némely zeolithszerű kovasavas vegyek, valamint a phosphorsav vegyületei mészszel, stb. is előfordulnak a talajban ily képen. Megemlítendőek még a kovasavnak kocsonyás változatai is.



Az eredeti talajban mindazon anyagok megvannak ily alakban, melyek az anyagközet elmállása folytán származnak.

A telepedett talajban is lehet még elmállásra képes törmelék, mely hasonló eredményt szül; de abba a sóoldatok eső, forrás és fenékvíz által is juthatnak.

A talaj ásványi alkatrészeit legnagyobb részint a következő elemek alkotják: oxigén, magnézium, nátrium, kálium, kén, phosphor, aluminium, vas és mangán; melyek vegyületei közt a kovasav, aluminiumoxyd, káliumoxyd, magnézia, káli, a vas vegyületei és a phosphorsav legfontosabbak.

### c) Fiziologiai tekintetben.

A növények hamujában talált kovasavat valószínűleg legnagyobb részint a földpátok és az agyag illetve az ebben foglalt víztartalma kovasav szolgáltatja; ámbár bizonyítékok szólnak a mellett, hogy a növények ez anyagot gyökereik támadó működése folytán a tiszta kvarczból is felvenni képesek. Az aluminiumoxydot, a mennyiben a növények (lycopodium félék) hamujában található, a földpátból, de valószínűleg méginkább az agyagból nyerik előbbiek.

A káli ugyan eredetileg főkép a földpátokból származik, mindazonáltal az agyagpalák és az agyag maga is mindig tartalmaz abból legalább csekély mennyiségeket.

A calciumoxydot főkép a mészkő szolgáltatja ugyan; de éppúgy alkalmas erre az oligoklász, labradorit, augit és ámfibol valamint a mésztartalmu agyagok is; ezen kívül minden vízben, mely a talajt áthatja, feltalálható.

A magnézia részben az augit és ámfibolból ered; de a telepedett talajokba, s az azokat átható vizekbe főkép dolomitos mészkövekből jut. A vas kis mennyiségben minden kőzetben, s így minden talajban is előfordul, amit a számos vastartalmu ásvány és az magyaráz meg, hogy a légkörnek kitett talajban a vas oldhatatlan állapotban van jelen; ami azonban nem akadályozza annak felvételét a növények által.

Kén is találtatik kis mértékben minden kőzetben, amit a kénfémvegyek, u. m. pyrit, markasit ( $\text{Fe S}_2$ ), chalkopyrit ( $\text{Cu F S}_2$ ), galenit ( $\text{Pb S}$ ), sphalerit ( $\text{Zn S}$ ) stb. gyakori előjövetele megmagyaráz; jóllehet ez elem legfőbb forrásául a telepedett talajban a gipszet



kell tekintenünk. Különben Struve kimutatta csehországi kőzetek egész soráról, u. m. fonolitról, bazaltról, porfirról, gnájszról és gránitról, hogy azokból, nagy nyomás mellett a szénsavtartalmu víz által kénsavas káliumot vagy kénsavas nátriumot lehet kivonni.\*)

A phosphorsavnak legalább nyomaí minden kőzetben kimutathatók, éppúgy a földpátokban, ámfibolban, augitban stb. A phosphorsavas mész előfordul némely tömeges kőzetben; de láthatatlanul apró részecskékben egy mészkőzetben sem hiányzik. A kőzetekben a phosphorsav úgy látszik a calciumhoz van kötve amit a kőzetek vékony csiszolatainak szemlélete és mikrochemiai vizsgálatok bizonyítanak. Stöckhardt s mások elemzéseai szerint\*\*) tartalmaztak a megvizsgált kőzetek phosphorsavat %-okban: gránit és gránithomok 0.42—0.63, gnájsz és gnájszhomok nyomoktól egészen 0.78; bazalt 1.11, melafir 0.30, szienit 0.18, felzit 0.21, trachit 0.4—0.7. A szénsavtartalmu vízben; valamint humusz-savas ammonia jelenlétében oldható s a növénytenyésztetre nézve oly felette kívánatos phosphorsavas mész a talajban rendesen igen csekély és változó mennyiségben szokott jelen lenni. E sav gyakran van a talajban vashoz, alumíniumhoz, vagy mágnéziához kötve s mint ilyen felette nehezen oldható.

A talaj phosphorsav tartalma annak rendesen csak ezred, sőt tizedred részeit teszi.

## 2. A szervi eredetű alkatrészek.

Ezek a talajban többnyire humusz alakjában jönnek elő, mely amint az első részben láttuk, szerves, többnyire növényi anyagok elkorhadása folytán jö létre. De eltekintve a szenes kőzetektől (kőszén, barnaszén stb.), némely kőzetek bitumen tartalma is sok talajnak szolgált szervi eredetű anyagokat, melyek állati maradványok széndús származékának tekinthetők.

A televény, amint az első rész illető helyeiből is kitűnik, mindig fokozza a talaj termékenységet; de ezt nem állíthatjuk a bitumenes alkatrészekről, melyek a felbomlásnak és kilugozásnak — úgy látszik — minden fokán keresztül mentek már.

\*) Dr. Ad. Mayer, Handbuch der Agricultur Chemie, Heidelberg, 1886. II. Rész. 19. l.

\*\*) Dr. A. Mayer id. helyén.



Az 1. és 2. alatt elősorolt anyagok végtelenül különböző arányban és vegyületben képezik a talajt.

## B) A talaj alkatrészei, tekintettel a szilárdrészecskék nagyságára.

A talajban minden szabad szemmel megkülönböztethető ásványi részeket kötőrmelék vagy kőrom (Steinschutt) nevezet alatt foglalunk össze. Ez alkotja a talajnak úgy szólva a vázát. A még egészen szét nem foszlott növényrészeknek melyek még elkorhadva nincsenek, az első rész IV. fejezet szerint (82. l. alól) éretlen korhadék a neve.

Az előbbieken ellenében, a talajnak legfinomabb, szabad szemmel szilárd önálló részecskékre nem elemezhető, s víz által a durvább részeiktől elkülöníthető, azaz iszapolható részét finom földnek (Feinerde) nevezzük, mely részint szervetlen, részint szerves testekből származik.

A kőromot alkotó részek között ritkán találunk olyakat, melyek éles széllel és szegletekkel bírnak, s ha igen, csak az eredeti talajokban, melyek származási helyükön maradtak. Legtöbbször azonban kerekdedek ezen kődarabkák szélei és hosszabb mállás és zúzódás jeleit mutatják, különösen a telepedett talajban. A fejnagyságot elérő és meghaladó kemény kőzetdarabokat sziklatuskóknak nevezzük, a kisebbek mogyorótól ököl nagyságig, alkotják a kövecset vagy kavicsot, mely ha szögletes kővekből áll, rendesen kavics-törmelék, ha élei s szögletei lekerekítettek, lecsiszolódottak, akkor kavics-görgeteg vagy hömpöly nevet visel; a borsó-mogyoró nagyságú kőromnak kődara nevet adunk, míg homoknak a kölesnél apróbb törmeléket nevezik; sok helyen az igen finom homoknak mit a víz könnyen felkavar, fővény nevet adnak. Métermérték szerint kifejezve kőveknek és sziklatuskóknak nevezhejtük azon kődarabokat, melyek 5 cm. átmérőt meghaladnak; kövecznek az 1—5 cm.; kődarának a 2—10 mm., porondnak az 1—2, homoknak szorósb értelemben 0.1—1.0 mm. átmérőjű darabokból vagy szemekből álló törmeléket; fővénynek ami a felkavart vízben az első 10 másodperc alatt, mielőtt a víz nyugalomba jőne, a felékre száll, de legalább kisebb átmérője 0.1 mm-t nem halad meg; ami azután is a vízben marad s csak később száll le, az iszap.



Fennebiekben, ahol az ellenkező ki nem mondatott, mindig a szilárd részecske a legnagyobb átmérőjét értettük.

A kőrom darabjain, szemecskéin, mindig vagy többnyire meg lehet ismerni szabad szemmel vagy nagyító üvegen, vagy más eszközök segélyével a kőzetnek vagy ásványnak nemét; a földes részen ellenben sem az ásvány vagy kőzet nemét, a melyből az származott, sem pedig az egyes részecskéknek jelenlegi minőségét tisztán meghatározni nem lehet; mert itt a finomul őrlött kölisztet az elmállás által származott agyag, vasoxyd, kicsapódott finom mész, vagy kovasav részecskéktől, — vagy végre a növényrészek korhadása által létre jött finom humuszrészecskéktől megkülönböztetni, vagy iszapolás által elkülöníteni nem tudjuk; úgy hogy rendesen még azt sem tudjuk megmondani, valjon az ásványi földes részek valamely adott esetben vegyi elmállás vagy mechanikai összezúzás által jöttek-e létre, vagy hogy körülbelül hányad része származott az anyagnak emez vagy amaz úton.

A földes részt a kődarától és a homoktól — de nem egyzersmind a legfinomabb fővenytől is — iszapolás útján választjuk el. Előbbi a talajban igen nagy fontossággal bír; mert nemcsak annak mennyiségétől és minőségétől függnek a talaj fizikai tulajdonságai; hanem ezek szívják magukba és tartják vissza a talajnak azon oldható alkatrészeit, melyek a növények táplálására szolgálnak. Ezek mennyiségétől függ a talajnak vizet visszatartó képessége is. A legfinomabb gyökérrostok ezek közé tolulnak, ezekhez simulnak, ezekkel összenőnek s legnagyobb részint ezekről veszik át az ásványi táplálékot. Azért sok tekintetben indokolva van azok nézete, akik a földes anyag mennyiségétől feltételezik legalább nagy részben, a talaj termőképességét. E nézet leginkább jogosult oly talajban, melynek zömét kőrom képezi, ahova a homoktalaj is tartozik.

Azonban a földes részek minősége sem közönyös; azért ismernünk kell azon alkatrészeket is melyekből azok állanak. Ezek főkép az agyag, kicsapódott kovasav, humusz, vashydroxyd, s porszerű mész, melyek a legfinomabb fővenynyel vannak keverve. Utóbbi többnyire kova és csillámlisztból, — de kivált eredeti talajnemeknél ezeken kívül a kőzetet képző más ásványoknak (földpátok, augit, ámfibol, chlorit stb.) még teljesen el



nem mállott, s azért az eredeti szövetségben maradt ásvány finom részecskéiből áll.

A törmelékes részek azon fizikai tulajdonokon kívül, melyeket a talajnak kölcsönöznek, még az által is nyernek jelentőségben, hogy forrásául szolgálnak részint a talaj hamualkatrészeinek, tehát a talajtápanyagoknak; részint pedig a földesanyagoknak; de csak annyiban, amennyiben az elmállásnak alá vannak vetve. Míg pl. e tekintetben a földpátok nagy jelentőséggel bírnak, a csillám felette kevés, a quarcz-szemek pedig éppen semmivel. Az ép és a félig mállott törmelék közt is lényeges különbség van; mert míg előbbi fizikai tekintetben a talaj termékenységére nézve hatástalan, (lásd az absorbtíót s más folyamatokat a következő szakaszban), s a növény gyökerei terjedésének útját állja stb.; addig a félig mállott, repedezett, egyes ásványaitól megfosztott s így likacsos, részben földes anyagot tartalmazó, félig mállott homok és kődara nemcsak fizikai tulajdonaiban áll az ép kötött törmelék és a finom föld közt, hanem a talajtápanyagok visszatartása és a gyökereknek való átszolgáltatása tekintetében is.

Még nagyobb mértékben áll ez a talajban előforduló, korhadásnak indult, de még teljesen humuszsza át nem változott növényi anyagokról is, pl. gyökér-, fadarabok-, s tuskóknak még porrá nem foszlott részeiről, melyeket víz, lég és gyökerek átjárhatnak és azokból utóbbiak dúsan táplálkozhatnak.

## II. Fejezet.

### A talaj alkata és tulajdonságai.

Mindennapi a nézet, hogy a talaj a legmélyebb nyugalom színhelye. Hogy lehetne pedig a halál nyugalma ott, hol az élet csirája fakad? Ott honnan a növényi élet forrása ered? Nem nyughatik a természet élete folyton forgó kerekének azon része sem, mely a föld alá merül, hogy ott épűgy a szerves mint a szervetlen természetben is ezer meg ezer apróbb kereket, gépezetet hozzon mozgásba. A föld feletti növényzet, melynek vidor zöldje eleveiséget lehel, szemvidító virágai pedig hang helyett színeikkel beszélnek a természet kedélyességéről: e növényzetnek élete csak folytatását képezi azon fizikai és chemiai mozgalmaknak, jelenségeknek, melyek a talajban véghez mennek, hol ép-



oly kevésbé uralg a halál nyugalma, mint a légkörben vagy a tenger mozgékony hullámaiban. Minél termékenyebb valamely talaj, annál élénkebbek és sokfélebbek abban az említett mozgalmak, változások. A napsugarak naponta változó erővel korbácsolják fel a talaj tömegeit s az ez által ébresztett mozgalom beljebb-beljebb terjed, a talaj és lég hőmérséke, valamint e két közeg gázainak ingadozó nyomásai folyton változó visszahatást gyakorolnak egymásra; a talajon átszivárgó légköri csapadékok, a felületen történő párolgás, a növényzet által való vízfelvétel, a korhadás, valamint az átszivárgó vizek által a talajban előidézett közvetlen vegyi változások: mind megannyi indító, mozgató, motorai a talajban előforduló fizikai és kémiai változásoknak, mozzanatoknak, szóval a talaj életének! Hogy evvel legalább nagy vonásaiban megismerkedhessünk, szükséges előbb a talajnak azon tulajdonságait szemügyre vennünk, melyek ama mozzanatokra közvetlen vagy közvetve befolyást gyakorolnak.

Ezeknél fogva az alábbiakban tárgyalni fogjuk a talaj fizikai főbb tulajdonságait úgy mint annak alkatát, mélységét, szövetét, fajsúlyát és színét; továbbá az abban történő legfőbb fizikai és kémiai folyamatokat, u. m. annak viszonyát a hőhöz, vízhez, az ebben fenntartott (suspendált) finom szilárd anyagokhoz, valamint a sóoldatokhoz és a gázokhoz, stb.

Ha ezekről, különösen pedig a talajban minduntalan nyilvánuló kémiai hatásokról és változásokról részletesen akarnánk szólni, akkor még egy könyvet kellene írni, mely e kis munka terjedelmét jóval túlhaladná. De ez a földművelési kémia (Agricultur-Chemie) feladata, a talajtannak pedig nem lehet célja a földművelési vegytant pótolni, hanem annak segédtudománnyul szolgálni.

Azon kémiai folyamatokról, melyek a talajba elegyedett szerves testek és közettörmelékek felbomlásánál véghez mennek, már az illető fejezetben volt szó, s ennél fogva e szakaszból ki vannak zárva.

### 1. *A talaj alkata.*

Ha a talaj természetes állapotában van, s az ember vasa azt fel nem kavarta, vagy felső rétegét le nem hordotta, abban különböző minőségű, egymásba átmenő régiókat, emeleteket lehet



megkülönböztetni, melyek meredek vízpartok omlásainál, csusszánások után hátramaradt, vagy emberi kéz által végbe vitt talaj átmetszéseknél, árokásásoknál stb. tűnnek fel a szemlélőnek. Ezen emeletek minőségét és egymáshoz való viszonyát értjük mi a talaj alkata alatt.

A talaj alkatára nézve különbség van az eredeti vagy sziklai és a telepedett vagy üledék talaj között.

A sziklai talaj mindig azon anyakőzetén fekszik, melyből származott. Ezen anyakőzetet tekintettel a rajta fekvő talajra *alapkőzetnek* (Grundgestein, Bodensohle) nevezzük. Ennek felső rétege többé kevésbé repedezett szokott lenni, s többnyire majd észrevétlenül megy át a közvetlen felette nyugvó durva közettörmelékbe, melyet *törmelékágy*-nak nevezünk. Ennek közeit apróbb törmelék, félig mállott közethomok és agyag, — szóval morzsalékos, földes anyag szokta kitölteni s közébe gyökerek hatolnak be, melyek az eredetileg egymáshoz illő kődarabokat széttolják és különösen ez emeletnek felsőbb részeiben — a benyomuló földes részekkel együtt — egymástól egészen elszigetelik. Ez emelet ily formán lassanként gyakran észrevétlenül megy át a földes vagy málladékrétegbe, melynek alsó része televényben igen szegény szokott lenni, s azért *sovány földesrétegnek*, — felső rétegét pedig melyet az elkorhadt gyökerek nagy száma, valamint a felületről beleszivárgó vízzel bele szűrődött finom televény kövérebbé tett, televényes (humusz) földesrétegnek nevezhetjük; a nélkül, hogy az alatta lévőttől élesen megkülönböztetni lehetne. Ezen, főképen ásványi anyagokból álló rétegeket *ásványi talaj* neve alatt foglalhatjuk össze, melyet a szerves eredetű televényréteg borít. Ebben megint megkülönböztetjük az alsó, fekete vagy sötétbarna *éretttelevényréteget* és a felette lévő, lehullott lombból, harasztból, elhalt moha-, fű- s más növényekből álló, úgynevezett *alomtakarót*, mely amennyiben a felbomlásnak már jeleit mutatja, *éretlen televénynek* is neveztetik. Ezen alomtakarótól megkülönböztetendő az élő növénytakaró, mely már a talajhoz nem számítható.

A jól kifejlődött, növényzettel borított és rétegeiben meg nem háborított sziklai talaj egymáson fekvő emeleteit tehát következőleg tüntethetjük elő:



|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Televény réteg | Alomtakaró      |
|                | Érett televény  |
| Ásványi talaj  | Televényes föld |
|                | Sovány föld     |
| Törmelékágy    |                 |
| Alapkőzet      |                 |

Mennél keményebb az alapkőzet, annál jobban feltűnik a különbség az alapszikla, a törmelék és a földesréteg közt: ellenben mennél földesebb maga az alapkőzet, annál észrevétlenebbül megy át az a földes talajba. Minthogy pedig az üledék talaj tulajdonképpen nem egyéb, mint a legifjabb földtani korszakokban keletkezett lágy, földes kőzet, melyet felső rétegében a növények korhadéka már kővérebbé tett, azért itt az ásványi talajnak televényben sovány, de a gyökerek által még többé-kevésbé elfoglalt alsó rétege és az alapkőzet közt különbség nincs és a szikla-törmelék hiányzik. Ennélfogva ha az üledék talaj elég mély arra hogy belőle a talajágy is kiteljék, akkor az, következő, többé-kevésbé egymásba átmenő rétegekből áll:

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Televény                       | Alomtakaró      |
|                                | Érett televény  |
| Ásványi talaj                  | Televényes föld |
|                                | Sovány föld     |
| Földes alapkőzet vagy talajágy |                 |

Másképp áll a dolog akkor, ha az üledék talaj oly sekély, hogy a gyökerek teljesen átjárják és egy más, keményebb közeten fekszik; mely esetben az alapkőzetet ez utóbbi képezi.

A földes kőzetek különböző rétegei is lehetnek egymásra telepedve, melyek közül egy terméketlen, péld. görgeteg vagy szivós agyag, a gyökerektől még elérhető mélységben a talaj-ágyat vagy alapkőzetet képezheti.

Az üledék talaj tehát nem nyugszik anyakőzet alkotta törmelékágyán, hanem ugyanazon nemű, vagy más földes, vagy pedig néha kemény alapkőzeten, melyet itt bármelyik fennebbi esetben talajágnak nevezünk.



A következő fejezetben látandjuk, hogy mily fontos a talajnak leírt emeletszerű alkata az abban folyó fizikai és chemiai mozzanatokra nézve.

A mezőgazdaságban megkülönböztetik a termő vagy feltalajt, (Ackerkrume) és az altalajt (Untergrund). Első alatt értik a talajnak rendesen trágyával kövéritett azon felső rétegét melyet szántani vagy kapálni szoktak; míg utóbbi alatt az ásványtalajt esetleg a talajágyat, melyet az ekével vagy kapával nem bolygatnak, s melybe soványsága, szivóssága vagy kövessége miatt a gazdasági növények gyökérzete behatni nem szokott. Ismeretes dolog különben, hogy ez esetben az altalajt, ha arra alkalmas, mélyen járó ekével, vagy rigolozás által a feltalajjal keverni, trágyával javítani, s ez által a termő talaj vastagságát gyarapítani is lehet és szokás.

## 2. A talaj mélysége.

Talaj mélység alatt értjük az ásványi talaj- és érett televényrétegnek függélyes vonalban mért vastagságát. Az alomtakarót tehát épügy nem számítjuk itt a tulajdonképeni talajhoz, mint a máltalaj alatt törmelékből, a telepedett talaj alatt pedig földes kavicsos vagy szilárd kőzetből álló talajágyat. Az előttünk álló természetes vagy pedig ásó vagy kapával előállított függélyes talajátmetszésem tehát a teljesen érett korhadék felső vonalától a talajágyig eszközöljük a mérést; külön megjegyezvén a televényréteg, külön az ásványtalaj vastagságát. A televényréteg rendesen elég világosan válik el az ásványi talajtól, s a lombtakarónak az érett televénynyel netalán összetéveszthető, igen vékony rétege sem okoz a mérésnél nehézséget; ellenben az iránt gyakran méltán kételkedhetünk, hogy valjon meddig vehető még talajnak a már törmelékessé vált málladék és hol kezdődik a törmelékágy. Erre nézve csak azon szabályt állithatni fel, hogy utóbbi ott kezdődik, hol az egyes törmelékdarabok még meglehetősen megtartották eredeti helyzetüket, s nincsenek egymástól jelentékeny mennyiségű talajanyag által elválasztva. Telepedett talajnál, ha a talajágyat az ásványtalajtól különböző és gyökerek által áthatlan réteg képezi, a mérés alsó vonalára nézve kétség nem foroghat fenn; ha pedig a talajágyat ugyanazon telep képezi, melynek felső rétegében a gyökérzet honol, akkor a mérés felesleges, mert



a talaj mélysége a növényzet igényeihez képest tulajdonképpen korlátlan. Lehet oly eset is, hogy a gyökérzet lefelé való terjedésének fenékvíz\*) vagy rétegekő (Ortstein\*\*) vetnek gátat, mely esetekben ezek képezik a talajágyat.

A talaj mélysége a növénytenyésztésnek igen lényeges tényezője. Evvel is úgy vagyunk, hogy ahol korlátlan, ott elveszti fontosságát; ellenben mennél csekélyebb, annál inkább előtérbe nyomul utóbbi. A talaj háza és egyszersmind éléstára is a növényzetnek; mennél tágasabb, annál jobban érzi magát s annál több táplálékot talál abban.

A talajnak minden legkisebb zugát elfoglalják a gyökérszálak, ahova a víz és a lég oxigénja elhat, s a honnan előbbivel együtt ásványi tápanyagokat vehetnek fel. A talajt fedő növényzetnek, s így az erdő, rét és mező növényzetének lombozata is csak akkor éri el azon tömötséget, hogy az azon térre jutó napvilágosságot kihasználhassa; ha a gyökérzet megfelelő kifejlődésére kellő tér áll rendelkezésre. Ezért marad gyér és hiányos a lombozat a sekély talajon. Ebből könnyen megmagyarázható az is, hogy ha a talaj mélysége bizonyos minimum alá leszáll, akkor további csökkenésével a termés, erdőben a fatermés apadása is lépést tart. E szerint a termőhelyi jóság meghatározásánál a talaj mélységét is kellően tekintetbe kell venni.

A talaj mélységére vonatkozó ezen kifejezéseket: sekély, középmedély, mély, igen mély, — nem veszi ugyan mindenki ugyanazon értelemben; mindazonáltal talán nem térünk el lényegesen az erdészek által ezen kifejezésekhez kötött fogalmaktól, ha a 15 centiméter mélységet meg nem haladó talajt *sekélynek*, 15—30 cm. mélyet *közép mélységűnek*, a 30—50 cm. mélyet *mélynek*, az 50 centimétert is meghaladót pedig *igen mélynek* mondjuk. Az erdőségeink zöme által elfoglalt hegységi talajok ugyanis többnyire 30 centiméteren alól maradnak, s az 50-t ritkán érik el.

Könnyen belátható, hogy a földes anyaggal átszőtt törmelékágy a talaj mélységét pótolja; ellenben a talajrétegben nagy mennyiségben előforduló durvatörmelék (kavics, kötuskók), a mélység által nyújtott előnyöket lényegesen csökkenti.

\*) Lásd alább.

\*\*) Alább, a homokban gazdag talajnemek leírásánál.



### 3. *A talaj színe.*

A talaj színe annak minősége megítélésére bir némi jelentőséggel, mert nemcsak szoros összefüggésben van annak a nap-sugarak általi felmelegedése- és kisugárzás általi melegvesztésével; hanem egyik vagy másik talajanyag jelenlétére is vet némi világot. A talajt alkotó legközönségesebb anyagok u. m. az agyag és a kvarczhomok, ha tiszták, világos szürkés vagy kissé sárgás, szennyes fehér színűek; de a talajban kisebb vagy nagyobb mértékben előforduló televény és vasoxyd, ritkábban valamely színes, különösen sötét színű ásvány- vagy közettöredékek, majd mindig bizonyos szint kölcsönöznek annak. Így sárgás barna, néha borsósárga szint okoz a vashydroxyd, vörös barna, néha megyszínbarna szint a vasoxyd, — barna vagy fekete szint televény s néha fekete ásvány és közet- (például fekete csillám, bazalt stb.) törmelék, — faközöldes szint a chlorit lemezek vagy ámfibol töredékek stb. Némely talajnemeknél sajátosságok bizonyos színek, pl. az agyag többnyire világos sárgabarna, a csillám és kvarcz keverékéből álló homok többnyire szürkés, vashydroxyd által megfestve gyakran borsó-sárga, épúgy mint némely homokkő málladéka; a mészközeteken és dolomiton nyugvó talaj többnyire gesztenye-barna, a bazalt és televény talaj feketésbarna stb. Minden talaj sötétebb ha nedves; szintelenebb (szürkébb, fakóbb), száraz állapotban. Ugyanazon talaj is változtathatja színét idővel; pl. a bazaltból származott talaj sötét színe kiélt mezőkön a televény elfogyása és a közetszemecskék teljesebb elmállása folytán hamuszürkévé változik stb.

### 4. *A talaj szerkezete, vagy szövete.*

A talaj legkisebb szilárd részecskéinek alakját, nagyságát, helyzeti viszonyát s egymással való összefüggésüket, — szóval a talaj legkisebb részecskékből való összetételének módját a talaj szerkezetének vagy szövetének nevezzük. Hogy a talaj egyes emeleteinek (televényréteg, ásványi talaj stb.) szerkezete különböző, az már a fennebbiekől következik. Ámbár a televényrétegek is különbözhetnek egymástól e tekintetben a korhadás különböző lefo-lyása és azon szerves anyagok minémősége szerint, melyekből a korhadék képződött; mindazonáltal az ásványi talaj sokkal na-



gyobb különbségeket mutat szövetére nézve. Eltekintve a köves talajban előforduló nagyobb közettörmeléktől, kövektől, kavicstól stb. a tulajdonképeni talajanyagnak alkatrészei, a finom agyagtól fel a kődaráig, melyek egymással minden viszonyban lehetnek keveredve, igen nagy változatosságot tüntetnek fel. Ámbár a kődara közé mindig van homok, s e közé többnyire kisebb vagy nagyobb mennyiségű agyag és más finom földes rész elegyedve; mindazonáltal az összetartó talaj töréséről vagy a széthullottnak, szétmorzsoltnak fogásáról vagy külső kinézéséről könnyen összehasonlíthatunk két talajt egymással az azok főtömegét alkotó szilárd részek nagyságára nézve.

A szilárd részek nagyságára nézt a gyakorlatban csak két jelzés szokásos, u. m. durva és finom. Legdurvabb szerkezetű például a kavicstól eltekintve azon talaj, melyben sok a kődara; durva szerkezetű még a homokban gazdag talaj is, ámbár itt már durva és finom homokot szokás megkülönböztetni; legfinomabb szerkezetű a főként érett televényből, agyagból s más iszapolható részekből álló talaj.

A szilárd részek alakja is tekintetbe jő. Itt a nagyon durva törmeléktől eltekintve természetesen csak a kődaráról és homokról lehet szó, melyeknek szemcséi lehetnek szegletesek, lemezesek vagy kerekdedek. Szegletes pl. a széthulló félig mállott kemény kőzetek darája; kerekded szemekből áll a quarcz-homok, lemezes a csillámhomok. Ha a talaj nagyrészt kerekded vagy szegletes közzszemeket tüntet fel, melyek az összetartó talajnak törésén mutatkoznak, akkor azt szemcsés, ha ellenben törésén párhuzamosan fekvő csillámlemezeket látunk, akkor lemezes vagy leveles szerkezetűnek nevezzük. Utóbbi gyakori oly vízből leülepedett talajon, melyben sok a csillám.

Igen fontos azt is figyelembe venni, vajon az apró szilárdrészek csak kemény ásványok mechanikai megőrléséből származtak-e, az elmállásról visszamaradt ép ásványok-e, vagy az elmállás visszamaradt terményei, vagy pedig oldatokból csapódtak ki. Az elmállásnak ki nem tett szemcsék, ásványtöredékek egymáshoz való tapadása majd semmi, a vízre is kevés vonzó erőt gyakorol; ellenben a félig mállott, összeköttetésükben megglazult, hézagokkal bíró, agyagot tartalmazó törmelékek belsejükbe vizet felvenni képesek; még inkább áll ez a félig korhadt, a talajjal



kevert növényi hulladékokról. — A kicsapódás által származott termények, pl. igen sokszor a szénsavas mész, vashydroxid, gyakran a kicsapódott amorf kovásv, de különösen a kicsapódott humuszsav és humuszsavas sók, a talajnak legfinomabb részecskéi szoktak lenni, de kisebb-nagyobb morzsákká is egyesülhetnek; a talajt nagyobbára legfinomabb por s részben kolloid anyag alakjában hatják át. Igen nevezetes az elmállási végtermények közt az agyag, melyet most beható vizsgálatok alapján\*) kolloid (enyvszerű) anyagnak tekintenek, mely tömecsei közé vizet vehet fel és felduzzad, annak elvesztése után pedig tömecsei annál szorosabban tapadnak egymáshoz; úgy hogy egy kiszáradt agyagtömeg e szerint épúgy összefüggő egésznek tekinthető, mint egy kiszáradt enyvtömeg.

A szilárdrészek nagyságától és alakjától függ a talaj hajcsövessége (capillaritas). A fizikából ismeretes, hogy a víz hajszálvékonyságu üvegcsövekben annál magasabbra emelkedik, mennél kisebb a csövek átmérője. Az itt működő erőt hajcsövességi erőnek nevezik, mely egyébiránt a tapadási vonzásnak (adhaesio) csak egyik nyilvánulása. Ily csövek ugyan a talajban nincsenek; hanem van abban ily finom s egymással összefüggő hézagoknak egész rendszere. Nem szükséges bizonyítanunk, hogy a szilárd részecskéknél hasonló alakot föltételezve, azok átmérőjével a köztük lévő hézagok átlagos átmérője is egyenes arányban növekszik. Innen a durva szemcsés törmelék csak durva, a finom szemcsés homok sokkal finomabb hézagokkal bir; míg a szabadszemmel ki nem vehető agyag és korhanyrészecskék a legfinomabb hajszálhézag-rendszerrel birnak. Innen kitetszik, hogy „durva“ v. „finom szerkezetű“ jelzés nemcsak a talaj szilárd részecskéinek átlagos nagyságára, hanem egyszersmind a hajcsövességre is épúgy vonatkozik. A tiszta kődara-, vagy durva homokban csak az érintkezési pontoknál fejt ki elegendő erőt az adhaesio a víznek odavonzására, mely pontok egymástól nagyobb hézagok által vannak elválasztva. Azért ily közegben a hajcsövesség majd semmi, s a beszivárgó esővíz a nehézségerőnek engedve haladhat benne lefelé; ellenben a talaj alsó rétegeiből a felületre nem képes emelni a vizet. Képzeliük most a kődara

\*) Th. Schlössing, Comptes rendus 1872. 74. kötet, p. 1408. J. M. van Pemmelen, Landwirtschaft, Agriculturstationen, 35. kötet, 69—136 lap, sat.



és homok közt a likacsokat legfinomabb főveny agyag és televényrészececskékkal kitöltve, s kész a finom hajcsövek szakadatlan rendszere; mely amily lassan veszi magába a légköri csapadékokat, époly biztosan képes a vizet a talaj mélyéből felemelni és annak minden részeibe egyenletesen elosztani.

Nevezetes, hogy az ásványi talaj az alsóbb rétegekben rendszeren durvább szerkezetű, s így felsőbb rétegeiben a hajcsövesség erősebben képes működni; aminek nagy jelentősége van a víznek felemelésére nézve. Ezen szerkezeti viszony különböző okokra vihető vissza. Ugyanis a máltalaj képződéséből következik, hogy annak alsóbb rétegei törmelékesebbek, a felsők az elmállás nagyobb foka és a nagyobb televénymennyiség miatt pedig finomabbak. A telepedett talaj egy és ugyanazon rétege képződésének alkalmával, midőn t. i. a folyamat kiöntenek, először ülepedik le a nehezebb törmelék, aztán a finomabb homok, s végre legfelül az iszap. Sőt ha keverve vannak is ezek egymással, akár telepedett, akár máltalajban, minden felázás alkalmával, lejobb szállnak a durvább részek, s felül kerekedik az iszap. Egyébiránt ettől eltérő esetek is vannak midőn pl. a finom televény a homok talajnak néhány deciméter mélységű rétegében csapódik ki, telepedik le. Hogy a fenéken, vagy különböző korban telepedett rétegeknél valamely közbeeső rétegben a homok vagy törmelék nem szakítja meg teljesen az alsóbb részekkel való hajcsövességi közlekedést, azt onnan lehet kimagyarázni, mert a felülről lefelé haladó víz mindig visz magával finom homokot és iszapot, melylyel minden nagyobb hézagot kitöltvén, a hajcsőrendszert folytonossá teszi. Innen magyarázható az iszapolás jó eredménye a csemeték ültetésénél.

A tiszta homok, ha finom szemcséjű is, ha sem finom földes részeket, sem pedig a megszáradásnál megszilárduló sókat nem tartalmaz, száraz állapotban semmi összetartással nem bír. De más talaj is elveszti összetartását, ha húzamosan tartó összedörzsölés által legkisebb részececskéire osztjuk szét. Ezt porszerkezetnek mondhatjuk. Ha ily homokot vagy finomra morzsoltságú más talajanyagot megnedvesítünk, a víz kitölti a hajszálhézagokat és a víztömecseknek egymáshoz, valamint a talajrészececskékhöz való tapadó erejénél (adhaesio) fogva összekötő kapocsul szolgál utóbbiak között, s ez által összetartást kölcsönöz a korábbi ösz-



szefüggés nélküli talajanyagnak. Az így kifejlő összetartási erő természetesen arányban van a talajrészecskék összes felületével, s így mennél apróbbak ezek, annál nagyobb, a bizonyos kereszt-szelvényre eső összetartási erő. A nedvesség tehát a tiszta homoknak is kölcsönöz némi összefüggést; de még sokkal többet a finom földes anyagoknak. De míg a durva homok, megszáradása után újra elveszti azon csekély összefüggését is, melyel nedves korában bírt, a finom homok már némi ellentállást képes a részeinek elválasztására irányuló külső erők ellen gyakorolni, de ennél aránytalanul többet az agyag. Ennek okát a következőkben találjuk fel. Amint a víz, mely egyenletesen hatotta át a szilárd részecskék közeit, s azokat mozgékonyabbá tévén, egyenletes elhelyezkedésüket eszközölte, a hézagokat lassanként a párolgás folytán elhagyja, annak még hátramaradt része, tapadó erejénél fogva, közelebb vonja a finom földrészecskéket egymáshoz; ugyanez történik a finomabb fővényszemekkel is, csak hogy a nagyobb hézagok és a szilárd részecskék nagyságához képest aránylag sokkal kisebb felület miatt, sokkal csekélyebb mértékben. A víznek további fogyása következtében a nagyobb szemecskék közt, ahová finomabbak nem jutottak, hézag támad s a víz csak a szilárd részek érintkező pontjai körül és az üregecskék falain tartja fenn magát. A még mozgékony finom földrészecskék különösen a kolloid anyagok, épúgy mint a vízben oldott sók, leginkább a vonzási központok körül, azaz a szilárdrészek érintkezési pontjainál gyűlnek össze, s itt találja őket azon idő is, midőn a talaj majd minden vizét elveszti. Ez idő alatt a talaj vizében feloldott anyagok, pl. kénsavas, szénsavas vagy phosphorsavas mész, mely kovasavas alkálik, s később a könnyebben oldható sók is kijegecednek, a kolloid anyagokkal együtt megszilárdulnak, még pedig főképp a szilárd talajrészecskék érintkező pontjainál, hol az oda gyülemlett porszerű földes részekkel együtt szilárdan összekötik a nagyobb szemecskéket egymással, mint vakolat az épületköveket. Így fejlődik ki a víznek segítségével a talaj a benne előforduló hajszálhézagok rendszerével. Ezekből láthatjuk, hogy a víz segítségével megülepedett talaj korántsem rendszertelen halmaz a talajrészecskéknél, hanem úgyszólván szervezett rendszere az a szilárdrészeknek és a hajszál hézagoknak, alkotva azon erők által, melyek a közvetítő vízzel együtt ezután is ott



működni vannak hivatva. A talajnak fennebb vázolt akár por-szerű, akár természetes szövetének hézagai a talaj legkisebb részecskéinek nagyságától és alakjától függnek.)\*

A talaj megművelésénél azt ekével, ásóval, kapával rögökre és apróbb morzsákra törjük szét, mert a gyakorlat ez eljárás előnyösségének felismerésére vezette évezredek előtt az embert. A talajban végbe menő folyamatokra ezen úgy nevezett morzsa-szerkezet (Krümmelstructur, Wollny) igen fontos befolyást gyakorol, azért arra még többször visszatérünk.

A talajnak azon képességét, hogy a részecskéi szétválasztására irányuló külső erőnek ellentáll: összetartásnak (Cohärescentia) mondjuk.

A száraz állapotban majd semmi összefüggéssel nem bíró talajt, amilyen pl. a homok, lazának (locker), az ellenkezőt összetartónak nevezik. Az összetartó talajt szivós-nak vagy szíjjasnak nevezik akkor, ha nyirkos állapotban is nehezen megdolgozható,\*\*) amilyenek az agyagban gazdag talajok. Az ily talaj száraz állapotban kemény, sőt néha kőkemény és ha egyszersmind jelentékeny kovatartalommal bír, megtörténik, hogy a vas szerszám ütéseire szikrát ad.

Ha a talaj összetartása oly csekély, hogy kezünkkel könnyen szétmorzsolhatjuk, pl. a homokban gazdag, kevésbé agyagos talajt, akkor porhanyónak, s ha emellett finom könnyű morzsákra vagy száraz állapotban porrá ömlik szét, mint a televény akkor purvásnak mondjuk.

A talaj, az egyes talajanyagok, s azok keveréke összetartásának, s az erre befolyó viszonyok hatásának számbeli, összehasonlító meghatározására, Schübler, Haberlandt, s mások és legújabbán Heinrich Puchner\*\*\*) vittek véghez kísérleti sorozatokat különböző módszerek alkalmazása mellett; melyek részint abban állanak, hogy egy keskeny ék alakú vasnak a talajba nyomására, — vagy pedig bizonyos alakokra formált talaj-

\*) E két szövetet Wollny (Forschungen, V. 145—146 l. „Einzelstructur“-nak mondja. Én jobbnak láttam külön-külön elnevezni ezen. már e munka első kiadásában leírt állapotokat.

\*\*) Ezért nevezik néhol az ily talajt nehéznek (schwer).

\*\*\*, H. Puchner. Untersuchungen über Cohäreszenz der Bodenarten. Wollny Forschungen, XII. köt. 195—241 l.



daraboknak szétnyomására (abszolút szilárdság) és keresztbe fektetett rudacskáknak eltörésére (relatív szilárdság) szükséges erőnek nagyságát súlyban ki is puhatolják. Az ék benyomulásánál nem csupán a talaj szilárdsága képezi az ellentállást, hanem ezen kívül a surlódás és az oldalnyomás is. Mindazonáltal ezen kísérletek igen tanulságosok; mert általuk kitűnik, hogy mily befolyást gyakorolnak a talajanyagok, azok keverése, a nedvesség és a talajban gyakoribb sók oldatai azon ellentállás fokára, melyet a talaj az ásóval, kapával és ekével való megdolgozás ellenében kifejt. Az ide vonatkozó kísérletek végeredményeit a fennebb idézett munkálat alapján a következőkben foglalhatjuk össze:

A talaj összetartása függ annak mechanikai összetételétől, nedvességétől és az abban netalán előforduló sóktól.

A talajanyagok közt legnagyobb összetartása van az agyagnak; míg a kvarcz- (s más) homok és a televény részecskéi közt az összefüggés sokkal csekélyebb. (Egy 2 cm. széles éknek, melynek lapjai 13 foku szöget zártak be, 1 cm. mélyre való hatolására kellett alkalmazni átlag: kaolinnál 9833, kvarcznál 3870, humusznál 1097 gr. súlyt). Azért a talaj összetartását az agyagtartalom fokozza, ellenben a homok és méginkább a humusz csökkenti. Azon talaj, mely kétféle talajanyag keveréke, összetartásra nézve is e két anyag között áll.

A víz befolyása a különböző talajanyagoknál lényegesen különbözik. Az agyag ugyanis annál összetartóbb, mennél kevesebb benne a víz; tehát száraz állapotban legszilárdabb. Ellenben a homoknak és televénynek összetartása a nedvesség bizonyos fokánál legnagyobb, s innen kiindulva a nedvességnek mind emelkedésével, mind pedig csökkenésével apad. A nedvességnek ama bizonyos foka a talajrészecskék nagyságától is függ. Így pl. a kísérlet alá vett legfinomabb homok (0.010—0.071 mm. legnagyobb átmérővel) vízzel telítve (legnagyobb vízbeívásnál, lásd alább) a fennebb leírt ék behatolásának ellent állott 87 gr.-nak megfelelő erővel, azon víznek 20 %-ával nedvesítve 5037 gr., kiszáritva 2470 gr. erővel. A 0.771—0.250 mm. átmérőjű homok által tanúsított ellentállás volt: teljes telítettségnél 167, a telítettség 60 %-ánál legnagyobb: 804, szárazon 80 gr. — 1.00 — 2.00 mm. átmérőjű homok összetartását jelezte teljes telítettségnél 310, annak 80 %-ánál (legnagyobb!) 404, szárazon 84 gr. Ebből egy-



szersmind azt is látjuk, hogy a szemcsék növekedésével az összetartás apad. A finomra dörzsölt (porszövetű) s azután meg nedvesített, s ez által természetes szövetet felvett agyag az ék behatolásának következő erővel állott ellent: Egész telítettségénél tanusította a legcsekélyebb ellentállást 35 gr.-mal, a telítettség 80 %-ánál 272 gr., 60 %-ánál 775 gr., 40 %-ánál 1408 gr. 20 %-ánál 8125 és szárazon 12358 gr.-mal.

A természetes szövetű talaj összetartása sokkal nagyobb, mint a morzsás talajé; de ha a morzsák nagyobbodnak az átlagos ellentállás is nagyobbodik, melyet a talaj a megmivelésre alkalmazott eszközök (ásó stb.) ellenében tanusít. Az ék behatolásának ellentállt a természetes szövetű talaj különböző víztartalom mellett átlagban 3829 gr., a morzsás talaj pedig ha a morzsák 0.5—1.0 mm. átmérővel bírtak 690, 1.0—2.0 mm. átm. mellett 1531, 2.0—4.0 mm. átm. mellett 1730, 4.0—6.75 mm. átm. mellett 1977, 6.75—9.0 mm. átm. mellett 2227 és ha e morzsák egyenlően vegyítették, 483 gr. erővel. Az összetartás a morzsás szerkezet mellett is folyton emelkedett a víztartalom apadásával.

A nyomás által összetömöttített talaj összetartása annál nagyobb lesz, mennél nagyobb volt az alkalmazott nyomás.

A növényzettel borított talajba a megdolgozásra alkalmazott szerszám sokkal nehezebben hatol be (nyilván a gyökerek ellentállása miatt), mint a növényzet nélküli talajba. Az ásonak a fűvel benőtt talajba való nyomására pl. egy kísérlet szerint több mint háromszor akkora erő volt szükséges, mint a kopasz talajba.

Az agyag gyurhatóságát és összetartását égetett mész (Aetzkalk) hozzákeverése által igen nagy mértékben vesztí, s ez már 1 % égetett mésznél is feltűnő, 0—40 % nedvességnél pl. tett az abszolút szilárdság apadás 62—65 %-ot. Ellenben káliumhidrát és káliumkáronát a száraz agyag összetartását fokozza, míg nedves állapotban inkább valamivel apasztani látszik.

A talaj megdolgozásánál nem lehet azon állapotot választani, midőn az összetartás minimuma beáll; mert ekkor az agyag igen ragadós, s ha megdolgozása kivihető is lenne, nagy rögök szét nem esnének morzsákká és megdolgozás után megint összetapadnának; száraz állapotban pedig nagyon kemény, s ha aránytalan erővel meg is dolgoztatik, az apró rögök közt sok nagy, szét nem morzsolt marad vissza. A homokban gazdag talajokban,



nedves állapotban sok nagyobb rög marad vissza, száraz állapotban pedig porrá zúzatnak, agyon d o l g o z t a t n a k. Minden talajnál legsikeresebb a megdolgozás és leginkább eléri az célját bizonyos középnedvességi fok mellett, mely legalkalmasabb a morzsás szerkezet előidézésére. Ez úgy látszik minden talajnál a legnagyobb vízzel való telítettségének 40 % körül van.

### 5. *A talaj sulya.*

A talaj minőségének megítélésénél a fajsuly (azaz 1 dm<sup>3</sup> légmentes száraz talaj sulya kg.-ban) tudása nem bir nagy jelentőséggel, legfeljebb a televény mennyiségre vonhatunk belőle következtetést, mivel ez sokkal könnyebb az ásványi talajanyagoknál. A fajsulynak viszonya azonban az ürfogat-sulyhoz, a talajban levő üregek mennyiségének megítélése végett igen fontos. A tőzeg-talajnak, mely legkönnyebb, fajsulya\*) csak 1, a korhadéké 1.3—1.5; míg a káoliné és a tiszta agyagé 2.2—2.5; a kvarczé és mészkőé 2.6—2.8, s a legtöbb kőzeté nem haladja meg a 3.0-t, ennél fogva a talaj fajsulya, a benne foglalt apróbb törmelékkel együtt, mindig 1.1 és 3 közt lesz. Miután pedig a legtöbb talaj agyagnak, kvarcznak s más ásványi szemecskéknak, különösen félig mállott kőzetmorzsáknak és kevés korhanyának keveréke, ennél fogva ha azt hézagtalannak gondoljuk, fajsulya többnyire 2.0 és 2.8 közt fog lenni, s csak nagy televény-tartalom mellett marad 2.0-on alól, vagy nehéz kőzetek, mint bazalt vagy vaskőzetek törmelékének nagyobb mennyisége mellett haladja meg a 2.6-ot. Magától értődik, hogy 1 köbdeciméter természetes állapotban lévő, s hézagaiban léget foglaló talajnak sulya az u. n. volumsuly fennebbi tételeken jóval alól marad.

Igy pl. egy Dr. Szabó József\*\*) által megvizsgált talaj fajsulya volt 2.50, az egy köbdeciméterre redukált koczka pedig nyomott szárazon 1.42 kilogrammot. Nagyon természetes, hogy az ily talaj köbdeciméterre akkor sem éri el a tiszta talajanyag fajsulyát, ha nedves; de nedves állapotban megint többet nyom, mint ha száraz, vagyis ha hézagait kizárólag lég foglalja el. Fennebbi esetben a vízzel tökéletesen telített talaj literje pl. nyomott 2.01 kilogrammot.

Ide jegyezzük Schübler ide vonatkozó kísérletei eredményét.

\*) Girard, Bodenkunde.

\*\*) Talajnemek geol. chem. és fiz. vizsgálata Bugyiközség határában stb. Budapest 1880.



| T a l a j n e m                | Fajsúly | 1 köbdeciméternek<br>kilogrammban súlya |                          |
|--------------------------------|---------|-----------------------------------------|--------------------------|
|                                |         | 60° C.<br>mellett<br>száritva           | vízzel át-<br>nedvesítve |
| Mészkőhomok . . . . .          | 2·722   | 2·085                                   | 2·605                    |
| Kvarcshomok . . . . .          | 2·653   | 2·044                                   | 2·494                    |
| Gipsz, porrá törve . . . . .   | 3·331   | 1·676                                   | 2·350                    |
| Agyag, 45% homokkal . . . . .  | 2·601   | 1·799                                   | 2·386                    |
| Agyag, 24% homokkal . . . . .  | 2·581   | 1·621                                   | 2·194                    |
| Agyag, 10% homokkal . . . . .  | 2·560   | 1·423                                   | 2·156                    |
| Tiszta agyag . . . . .         | 2·533   | 1·376                                   | 2·126                    |
| Finom szénsavas mész . . . . . | 2·468   | 1·006                                   | 1·758                    |
| Humusz . . . . .               | 1·370   | 0·632                                   | 1·428                    |
| Kerti föld . . . . .           | 2·332   | 1·449                                   | 1·744                    |
| Szántótalaj . . . . .          | 2·401   | 1·537                                   | 2·810                    |
| Palás márga . . . . .          | 2·631   | 2·048                                   | 2·600                    |

Ujabbán Wollny\*) találta a kvarcz fajsúlyát 2·62, a humuszét 1·46, az agyagét 2·50, a kvarcshomokét 2·64, a vályogét (fővenyes agyag) 2·62, a vashydroxydét 3·73, a gipszét (kicsapódottét) 2·32, a jegeczes mészkőét 2·76, a mészhomokét, mely humuszmentes, de földes volt 2·70, kicsapódott szénsavas mészét 2·68.

A nevezett szerző ez irányban tett kísérleteiből a következő igen könnyen megmagyarázható tételek vonhatók le:

A talaj alkotásában jelentékenyen résztvevő anyagok fajsúlyra nézve így következnek egymásután: szénsavas mész, kvarcz, agyag, ezeknél jóval könnyebb a humusz. Ugyanazon talajanyag fajsúlya is változásnak van kitéve, aminek oka annak szöveti különbségeiben van. Mennél tömöttebb a szövet, annál nagyobb a fajsúly.

Igen természetes, hogy amily arányban van valamely talajanyag bizonyos talajkeverékben jelen, époly arányban befolyásolja annak fajsúlyát. Így pl. mennél több vas van valamely talajban, annál nehezebb, mennél több humusz van benne, annál könnyebb az. Ép ezen értelemben gyakorolja befolyását a talaj fajsúlyára a benne foglalt víz is.

Álljanak itt még néhány talajra nézve A. v. Liebenberg adatai.\*\*)

\*) Forschungen VIII. (1885.), 347. l.

\*\*) A. v. Liebenberg, Ueber das Verhalten des Wassers im Boden. Inaugural-Dissertation, Halle, 1873.



|                                       | Kövek  |        | Kődara | H o m o k |         |         |        | Finom föld |       | Szénsa-<br>vas<br>mész | Hy-<br>grosz-<br>kopos<br>víz | Hu-<br>muz | Fajtsly | Ürögatsly |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|--------|------------|-------|------------------------|-------------------------------|------------|---------|-----------|
|                                       | 5 mm.  | 2 mm.  | 0/10   | 1 mm      | 0-5 mm. | 0-5 mm. | 0/10   | 0/10       | %     | 0/10                   | 0/10                          |            |         |           |
|                                       |        |        |        | 0/10      | 0/10    | 0/10    |        |            |       |                        |                               |            |         |           |
| Porfírmátlaj . . . . .                | 3 076  | 0 840  |        | 4-456     | 14-562  | 55-332  | 24 810 | —          | 1-192 | 4 220                  | 2-49                          | 1-35       |         |           |
| Ugyanaz . . . . .                     | 2-167  | 1-1032 |        | 3 902     | 11-390  | 49-934  | 33-742 | —          | 1-387 | 4 046                  | 2 61                          | 1-34       |         |           |
| Gránittalaj . . . . .                 | 20 470 | 5 646  |        | 9-138     | 8-096   | 14-484  | 62-536 | —          | 1-600 | 5-720                  | 3-04                          | 1-13       |         |           |
| Bazalttalaj . . . . .                 | 25-160 | 4 114  |        | 4-934     | 3-576   | 16-554  | 65 822 | —          | 4-490 | 7-520                  | 2-76                          | 1-10       |         |           |
| Kagylónesztalaj . . . . .             | 34 911 | 9-552  |        | 2-986     | 7-784   | 17-798  | 61-880 | 29-730     | 2 080 | 8 020                  | 2 68                          | 1-27       |         |           |
| Homok-láptalaj . . . . .              | —      | —      |        | 2-268     | 8-266   | 55-404  | 34 082 | —          | 3-170 | 11-340                 | 2-46                          | 0-95       |         |           |
| Harmadkori agyag . . . . .            | —      | —      |        | —         | —       | 4 580   | 95-420 | —          | 1-938 | 4-330                  | 2-74                          | 1-20       |         |           |
| Durva harmadkori homok . . . . .      | —      | —      |        | 31-630    | 33-362  | 14-948  | 20-060 | —          | 0-040 | 0-160                  | 2-68                          | 1-80       |         |           |
| Középfinom harmadkori homok . . . . . | —      | —      |        | 0 124     | 26 810  | 69-876  | 3 190  | —          | 0-050 | 0-100                  | 2-71                          | 1-67       |         |           |
| Finom harmadkori homok . . . . .      | —      | —      |        | —         | 0-346   | 97-144  | 2-510  | —          | 0-050 | 0-110                  | 2-68                          | 1-45       |         |           |
| Diluvial vályog . . . . .             | 4 752  | 0 318  |        | 3-894     | 20 194  | 45-678  | 29-916 | 0 136      | 0-458 | 1-100                  | 2 64                          | 1-41       |         |           |
| Diluvial agyag márga . . . . .        | 3 757  | 3-390  |        | 2-586     | 16 058  | 50 136  | 30 813 | 5-954      | 1-045 | 1-210                  | 2-63                          | 1-42       |         |           |
| Lősz-vályog . . . . .                 | —      | —      |        | 0-888     | 2-3-8   | 29-046  | 67 688 | —          | 1-814 | 1-597                  | 2-34                          | 1-25       |         |           |
| Lőszmárga . . . . .                   | —      | —      |        | 0-226     | 1 770   | 31 530  | 66 408 | 11 470     | 1-225 | 1-960                  | 2-61                          | 1-34       |         |           |
| Televényes löszmárga . . . . .        | —      | 0 210  |        | 0-200     | 5-102   | 20 436  | 74-162 | 0-460      | 2 940 | 5-030                  | 2-59                          | 1-22       |         |           |
| Melm márga . . . . .                  | —      | 1-054  |        | 0-352     | 0 730   | 18-848  | 79 016 | 11 380     | 1-500 | 2-860                  | 2-66                          | 1-28       |         |           |
| Melm vályog . . . . .                 | —      | —      |        | 0-060     | 0-218   | 10 670  | 89 052 | 0 260      | 3-082 | 2 651                  | 2-65                          | 1-28       |         |           |
| Durva diluvial homok . . . . .        | 4-861  | 5-384  |        | 24 972    | 65-040  | 3 958   | 0-646  | —          | 0-160 | 0-390                  | 2-70                          | 1-72       |         |           |
| Finom diluvial homok . . . . .        | —      | —      |        | —         | 3-450   | 91-980  | 4-570  | —          | 0-160 | 0-230                  | 2-72                          | 1-62       |         |           |
| Berki vályog (Auelehm) . . . . .      | 1-126  | —      |        | 0-282     | 0-912   | 8-642   | 90-164 | 3-620      | 3-650 | 5-480                  | 2-67                          | 1-17       |         |           |

Megjegyzendő, hogy e táblázatban az első hasábjában foglalt kövek a kísérleteknél kihagyattak, az utolsó előtti 3 hasábjeliek pedig az előttük lévő 5 hasábjában már egyszer bentfoglaltatnak, kivéve tán a bazalt hygroszkopos vizét.



Wollny\*) a kísérletek számos sorát vitte véghez, hogy azon okokat kiderítse, melyek a talaj ürfogatsúlyára befolyással vannak, melyek eredményét röviden a következőkben foglalhatni össze:

Az ürfogatsúly annál nagyobb, mennél nagyobbak a talaj-részecskék. A különböző nagyságu részecskék összekeverése által az ürfogatsúly nagyobbodik. Ennek oka az, hogy a nagyobb részecskék közeit a kisebb részecskék töltik ki.

A morzsás szerkezet által az ürfogatsúly jelentékenyen csökken, még pedig annál inkább, mennél nagyobbak a morzsák. (A morzsák átmérője 0.5—9 mm. volt, melyek rosták által 5 osztályra különítették el).

Az ürfogatsúly annál nagyobb lesz, mennél jobban összetömöttedik pl. külső nyomás által, a talaj. Az ürfogatsúlyt a kötőrmelék növeli.

A kísérletek egy más soránál Wollny szerint:

|                                                                | ürfogat-<br>súly | volum-<br>súly |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| kvarczhomok . . . . .                                          | 1.45             | 2.62           |
| $\frac{2}{3}$ kvarczhomok, $\frac{1}{3}$ hu-<br>musz . . . . . | 1.11             | 2.45           |
| $\frac{1}{3}$ kvarszhomok, $\frac{2}{3}$ hu-<br>musz . . . . . | 0.71             | 2.29           |
| humusz . . . . .                                               | 0.33             | 1.46           |
| $\frac{2}{3}$ humusz, $\frac{1}{3}$ agyag .                    | 0.54             | 1.93           |
| $\frac{1}{3}$ humusz, $\frac{2}{3}$ agyag .                    | 0.84             | 2.28           |
| agyag . . . . .                                                | 1.01             | 2.50           |
| $\frac{2}{3}$ agyag $\frac{1}{3}$ kvarcz . .                   | 1.18             | 2.55           |
| $\frac{1}{3}$ agyag $\frac{2}{3}$ kvarcz . .                   | 1.35             | 2.58           |

Ezen anyagokat határozott mennyiségekben is összekeverve, azt találta, hogy a talaj ürfogatsúlya a homokkal növekedik, a humuszszal pedig apad, s általában, hogy a volumsúlyok a faj-súlylyal emelkednek vagy csökkennek.

Nedvesített talajanyagokkal tett kísérletei bizonyítják, hogy a nedvesség a talaj volumsúlyát annál inkább emeli, mennél

\*) Közölve a fenneb idézett helyen.



több vizet képes a talaj magába felvenni; továbbá, hogy a bizonyos anyagokból álló nedves talajok is oly sorban jönnek egymás után, mint ugyanazon talajok száraz állapotban; csak hogy a különbséget a víz jelenléte mérsékli.

## 6. A talaj nedvességi viszonyai.

### a) A talaj nedvességének eredete.

A talaj vizének minden csöppe a légkörből származik; de közvetlen gőzállapotban rendszeren csak kevés százalékát veheti fel a talaj azon víznek, melyet átitatott állapotban általában megbir; mert míg például egy szántótalaj Schübler szerint a rajta átszűrt vízből saját súlyának 52%-kát vehette fel likacsai közé; addig ugyanaz, a vízgőzzel telített légből csak 2·3%-kot volt képes általában felvenni; a viszony leszállhat 0-ig, s felmehet a legfinomabb televény anyagnál a sulynak 10%-ig; de oly légben, mely kevés nedvességet tartalmaz, mindenesetre csekély, s átlag  $2\frac{1}{2}$ -3%-nál többre nem tehető.

Nem is időznénk tehát e tárgynál tovább, ha nem merültek volna fel, s tán nem tartanak magukat még itt-ott oly nézetek, melyek a levegőből higroszkóposság útján felvett s megsűrített vízgőznek a növények sőt még a források (!) táplálására is, jelentőséget tulajdonítottak. Ezek megeczáfolására álljon itt a J. S. Sikorski által kísérleti sorozataiból levont következtetések.\*)

Azon víz mennyiségnek, melyet a talaj, gőzsűrítő képességénél fogva nyerhet, a növény tenyésztetre jelentősége nincs; mert az 1. a növények vízszükségletéhez, illetve a talaj csapadékok által kapott nedvességéhez képest eltűnően csekély és azon kívül is csak a talajnak legfelsőbb rétegeire, 3—5 centiméterig terjed; 2. a talaj csak ritkán és rövid időre van úgy kiszáradva, hogy a levegőből vizet vonhasson magába, s az ez uton nyert vizet oly erővel tartja vissza, hogy azt a növények gyökerei tőle el nem vonhatják; 3. mikor a lég legszárazabb és az időjárás legmelegebb, akkor épen nem képes a talaj abból vizet felvenni, sőt folyton

\*) J. S. Sikorski, Untersuchungen über die, durch die Hygroskopicität der Bodenarten bewirkte Wasserzufuhr. Wollny, Forschungen, Band IX. pag. 413. illetőleg 432—433.



veszti azt is, ami az azelőtti csapadékokból még benne fenn maradt.

Bátran állithatjuk tehát, hogy a talaj, majd egész víztartalmát légköri csapadékok, kiváltképen pedig eső és hó alakjában kapja; ámbár huzamosan tartó esőmentes nyári időben a harmatnak is nagy jelentősége van a növények tenyészésére nézve.

De az eső- és hóvíz nem jut mind a talajba; mert mentől lejtősebb a felület, s mennél gyorsabb a hóolvadás vagy nagyobb az eső, annál több folyik le oldalos helyeken; továbbá a víznek jelentékeny részét felfogja a növényzet vagy a növényi hulladékokból képződött talajtakaró, s arról vagy abból párolog el annak nagyobb része, mielőtt a talajba szivároghatott volna.

b) A növényzet és a talajtakaró befolyása a csapadékok felvételére a talaj által.

A gyepvel borított talajba kis eső egyáltalában be sem hatol; mert azt a gyepnek részint szárai és levelei fogják fel, részint pedig összeszővődött gyöktörzsei és gyökérzete, melyek fel is szívják, mielőtt leszivárogná. E hatás nyáron sokkal inkább érezhető, mint télen; ámbár a hóvíz is sokkal gyorsabban, nagyobb mennyiségben és nagyobb mélységre hatol be a csupasz mint a gyepes talajba.

Dr. Woldrich tanárnak Salzburgban tett észleletei szerint a csupasz talajba, 65 cm. mélységre több víz hatolt, mint a gyepes talajba: májusban 25, júniusban 53, júliusban 23, augusztusban 29 és szeptemberben 13 %-kal, átlag a nyári hónapokban tehát 35 %-kal. Ugyanannak Bécsben tett kísérletei szerint a csupasz talajba télen át 7, tavaszon 22 %-kal hatolt be 65 cm. mélyre több víz, mint a gyepvel fődöttbe. A gyepnek az erdei csemetékre gyakorolt ismeretes káros hatása tehát egyrészt a csapadékok felfogása és a talajnedvességnek elpárologtatásában találja magyarázatát.

Az erdőnek hatása a talaj nedvességi viszonyaira nézve már bonyolodottabb.

Ugyanis az erdők az évi csapadékoknak jelentékeny részét, a jól zárt erdők Dr. Ebermayer észleletei szerint mintegy 70—75 százalékát fogják fel, melynek egy része, azaz a lehullott csapadéknak mintegy 10 %-a, a törzsön lefoly ugyan, de nagyobb



része mégis elpárologván, nem jut a talajba. Ezenkívül az erdei alom is jelentékeny csapadékot fog fel és azt csak lassan bocsátja a talaj rendelkezésére.\*) Az erdő talaja tehát kevesebb csapadékot kap ugyanazon eső és hó mennyiség mellett, mint a szabad tér csupasz talaja. És mégis a jól zárt erdő talaja, ha alomtakaróval is el van látva, nemcsak felületén, hanem átlagosan is nedvesebb, alsó rétegeiben, 16 centiméteren alól átlagosan több vizet is kap s így több feleslegest is bocsát át magán a források és a fenék víz táplálására, mint a szabad csupasz talaj; mert utóbbinak felső rétegéből sokkal több elpárolog, mint az erdő talajából, mielőtt alsóbb rétegekbe szivárgott volna. A jó állapotban lévő erdő tehát a kevesebb eső és hóvízből jobb gazdálkodás folytán többet megtart, s többet juttathat a források ereibe, mint az erdőtlen terület a több csapadékból. De ez csak azon esetben áll, ha az erdő mennezetét a talaj víz elpárolgatásának meggátlásában az alomtakaró is segíti: mert ha utóbbi hiányzik, az erdő mennezete nem képes beárnyalása által kipótolni azon hiányt, melylyel az erdő talaja a szabad tér csapadékmennyisége mögött hátra maradt.

E viszonyok előtűntetésére alkalmas a Dr. Ebermayer vezetése alatt tett kísérletek átlagos eredménye, mely szerint 1 □ deciméter területen a következő víz mennyiségek fogtak fel egy év alatt literekben.

| Szabad téren<br>csupasz talajban                |      |      | E r d ő n            |               |             |
|-------------------------------------------------|------|------|----------------------|---------------|-------------|
|                                                 |      |      | alomtakaró<br>nélkül | alomtakaróval |             |
| 32                                              | 65   | 130  | 32                   | 32            | 65   130    |
| centiméter mélységben                           |      |      |                      |               |             |
| 5·08                                            | 4·58 | 4·93 | 4·71                 | 5·24          | 5·45   4·20 |
| Mely megfelel rétegvastagságnak milliméterekben |      |      |                      |               |             |
| 508                                             | 458  | 493  | 471                  | 524           | 545   420   |
| 487                                             |      |      |                      | 496           |             |

\*) Az erdei alomnak, lehullott lombnak és fedő mohának a talaj nedveségére való hatását tárgyaló kísérletek eredményét foglalja magában következő közlemény: E Kramer. Das Verhalten der Waldstreu und Moosdecke gegen-



Érdekes még a földre hulló csapadékoknak a talaj különböző mélységére leszivárgó vízzel való összehasonlítása is, melyre világot vetnek az E b e r m a y e r által 18<sup>68/69</sup>-ben tett észleletek. Ezek szerint ugyanis a földre hullott csapadékoknak közvetkező százaléka i szivárogtak be a talajba:

|                  | Szabad téren<br>csupasz<br>talajba | Erdőben, alommal |        |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|
|                  |                                    | nem fődött       | fődött |
|                  |                                    | talajba          |        |
| 32 cm. mélységre | 54                                 | 67               | 74     |
| 65   "       "   | 50                                 | —                | 77     |
| 130   "       "  | 53                                 | —                | 60     |

Tehát az erdőben alomtakaróval nem fődött talajba is több százaléka szivárgott be a lehullott csapadéknak, mint szabad téren; de legnagyobb volt a százalék az erdő mennyezete alatt és egyszersmind alommal takart talajban.

A fennebbieket abban foglalhatjuk össze, hogy ugyanazon eső- és hőmennyiség mellett legkevesebb nedvesség szivárog le 32 cm. mélységig a talajba ha a felületet gyepp borítja; ezután következik az alomtakaró nélküli, erdővel fedett talaj, ezt felülhaladja a csupasz, erdőtlen felület, s végre legtöbb vizet nyújt az alsó talajrétegeknek az alomtakaróval borított talaj a zárt erdő mennyezete alatt.

Sokkal kisebb mennyiségeket mutat ki L. Sturtevant\*), aki 4 évi észlelet eredményeként azt találta, hogy az egész évi 45·37 angol hüvelyknyi átlagos eső mennyiségéből évenként csak 15% jutott le a talaj 25 ang. hüvelyknyi mélységébe és pedig:

|                      | télien,<br>decz.-febr. | tavaszzsal,<br>márcz.-máj. | nyáron,<br>jun.-aug. | ősszel,<br>szept.-novemb. |
|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| átlagos esőmennyiség | 10·17                  | 12·65                      | 11·65                | 11·00                     |
| átszivárgott víz     | 0·95                   | 2·95                       | 0·17                 | 2·69                      |
| százalék             | 9·5                    | 23·4                       | 1·4                  | 24·5                      |

A nyáron átszivárgott százalék kis voltát nyilván a fokozott elpárolgás okozta, részint közvetlen a talaj felületéről, részint a növényzet által.

Hogy mily lényeges befolyással van a növényzet a talaj víztartalmára és

über dem Eindringen des meteorischen Wassers in den Boden. (Mittheilungen aus dem forstlichen Versuchswesen Österreichs. Neue Folge, I. Heft. 1883. Seite 3—6).

\*) Közölve van kivonatban Wollny, Forschungen, VIII. 104. l.



a mélyebb rétegekbe szivárgó víz mennyiségére, azt mutatják a többek közt Dr. Ebermeyer újabb észleletei, melyeket 1884-től 1887-ig tett és tétetett\*)

Ezek némely részben ellentmondanak a korábbiaknak. Ugyanis egész éven át legtöbb nedvesség volt a talaj mélyebb (40—80 cm.) rétegeiben ott, ahol a talajt növényzet nem borította, azután következett e tekintetben a vágható (tehát ritkább) fenyő erdő; azután a fiatal (25 éves) lúczfenyves, s végre legkevesebb nedvességet tartalmazott a középkoru (60 éves) lúczfenyves, mely legerőteljesebb növekedésben lévén, legtöbb vizet vont el a talajtól. A korábbi észleletekkel egyezett, hogy a talaj felső rétege annál nedvesebb volt, mennél jobban be volt árnyékolva a növényzettel és erdei alommal.

A müncheni erdő-kísérleti állomás kertjében eszközölt kísérletek a fiatal lombfák, fenyők és mohatakaró hatását tüntetik elő a talajon átszivárgó víz mennyiségére nézve, mely itt rendkívül csekélynek tűnt ki a 20 év előtti észleletekhez képest. A kísérletezésre alkalmazott kis területek egyike 6 éves bükk-, másika 6 éves lúczfenyő csemetékkel volt beültetve, harmadika moharéteggel fedetett be, a negyedik végre csupaszon hagyatott. Az 1886-ban lehullott 958 mm.-nyi csapadéknak következő százaléka szivárogtak be a televényben gazdag kerti földbe, 120 cm. mélységig:

|                  | bükk | lúczfenyő | moha | kopasz |
|------------------|------|-----------|------|--------|
| tavasz . . . . . | 8.0  | 6.7       | 10.8 | 6.9    |
| nyár . . . . .   | 2.8  | 2.1       | 5.6  | 4.6    |
| ősz . . . . .    | 0.9  | 0.6       | 6.2  | 2.8    |
| tél . . . . .    | 7.7  | 4.7       | 11.4 | 7.1    |

E számok elég világosan beszélnek. Kiemelendő különösen a mohatakaró kedvező hatása.

c) A talaj és talajágy szerkezetének befolyása a víz be- és átbocsátására; forrásosság, vadvíz, fenékvíz, földárja.

A talajnak azon képességét, hogy a felületére jutó csöpp folyóvizet magán átereszti, vízátbocsátó képességnek (Permaabilität für Wasser) mondjuk.

Ha a talaj laza, kövecses vagy homokos, akkor a vizet könnyen magába és magán át ereszti; mert a beszivárgó s a nehézségerőnek engedő víz nyomására a nagyobb hézagokon át könnyen kiszabadulhat a talaj levegője; ellenben a tömött, kiváltképp az agyagban és televényben gazdag talaj felső rétegének nagyon finom hézagai a ráhulló esőt erős hajcsövi hatásuknál fogva viszszatartják, az által bedugulnak, elzártnak, s a víz további benyo-

\*) Dr. Ebermeyer, Einfluss des Waldes und der Bestandesdichte auf die Bodenfeuchtigkeit und auf die Sickerwassermengen. Wollny, Forschungen XII. 147—174. l.



mulásának hihetőleg még a talaj finom hézagaiban foglalt levegő is sokaig ellentáll. Ezért a száraz, s így hézagaiban léget tartalmazó tömött agyagtalaj sokkal nehezebben ázik meg, mint a homok, vagy kövecses talaj. Azon többé-kevésbbé elkorhadtnövényi maradványok, melyek a kész humuszhoz keverve szoktak lenni, nem záródnak rendesen oly tömöttön egymás mellé, mint az agyag részecskéi, s ezért a televény könnyebben megázik, mint az agyag.

A. Schwarz kísérleteinél\*) 10 cm<sup>2</sup> felülettel és 10 cm vastagsággal bíró talajrétegen következő vízmennyiségek hatoltak át; agyagon 0.7 cm<sup>3</sup>, lápföldön (finom televény) 1 cm<sup>3</sup>, vályogon (főnyes agyag) 1674 cm<sup>3</sup> és homokon 5760 cm<sup>3</sup>.

Az agyagnak fennebb jelzett sajátságából magyarázható meg, hogy a gyors és rövid tartamu esők által csak felülete nedvesedik meg, míg azok a homokba sokkal gyorsabban és mélyebbre hatnak be. Egyébiránt közép minőségű talajba a legerősebb zápor-esők is csak néhány centiméter mélységre jutnak be. Általában, csak ha a felső réteg már teleitta magát vízzel és így a hajcsövességi vonzás kielégített, akkor hatol be a víz, részint a talaj hajcsövi vonzalma, részint a hydrostatikai nyomás folytán az alsóbb rétegekbe is.

Appun\*\*) kísérletileg állapította meg, hogy azon idő, mely szükséges, hogy a víz a talajba 30 cm. mélyen behatoljon, homoktalajnál 20 perc, láptalajnál (Moorboden) 7 óra, vályogtalajnál 19<sup>3</sup>/<sub>4</sub> óra volt.

E kísérletek eléggé mutatják, hogy a különböző talajanyagok vízátbocsátó képessége közt mily óriási különbség van.

Módosul a talaj megnedvesülésének lefolyása akkor, ha az a nagy szárazság által repedéseket kapott; mert ezeken a zápor-esők víz tömege is gyorsan a talaj mélyébe hatolhat, s a hajcsövesség útján való megnedvesedés nemcsak a felszínen, hanem a repedések oldalain is történhetik. A víz felvétel által a talaj felduzzadván, a repedések újból záródnak.

Fennebbiekből kiderül, hogy a talaj megporhanyítása (szántás, kapálás, felásás) folytán, abba a légköri csapadékok sokkal könnyebben behatolhatnak; ami különösen lejtős helyeken fontos,

\*) A. Schmied, Bodenlehre, Prag, 1886. 229. l.

\*\*) Annalen der Landwirthschaft in den königl. preussischen Staaten. Monatsblatt. Band 57. Seite 260.



ahol a víz az oldalon gyorsan lefoly, s a talajba való beszivárgásra így kevés ideje van.\*)

Wollny kísérletei kiderítették, hogy a víznek lefelé szivárgását az egymással váltakozó, különböző finomságu és különböző tömörségű rétegek akadályoztatják.\*\*)

Az átitatott talajon leszivárgó fölösleges víz végre eléri a talajágyat. Ha ez törmelékes és a repedezett sziklába megy át, amint ez hegyvidéken leggyakoribb, akkor mind beljebb-beljebb hatol a víz a szikla méhébe, de egyszersmind jobban-jobban össze is gyűl az, amint a talajágy számtalan repedéseinek száma mind kevesebb-kevesebb lesz. Így tehát a földalatti erek vízben mind dúsabbak lesznek. Ily erek vezetik le azt a bányákba, s ha a bányász alagokon újból ki nem vezetheti a napvilágra, költséges gépek segédelmével kénytelen kimeríteni. Ahol a vizet vezető repedések mélyebben fekvő hegyoldalokon újra napvilágot látnak, ott források fakadnak. Gyakori azon eset is, hogy egy repedésekkel teljes, vagy áteresztő homokkő réteg alatt, egy víz által áthatlan, ép szikla, vagy agyagréteg terül el. Ahol ez utóbbi felső lapja a lejtő oldala által metszetik, ott egész vonalban forrásos a hely. Gyakran maga a talaj alatti kőzet nem bocsátja át a vizet, pl. ép csillámpala vagy gnájsz, melynek rétegei a talaj felszínével párhuzamosok, vagy legalább avval egy irányban, ha kisebb fok alatt is, lejtének; vagy pedig szivós agyag terül el a termőtalaj alatt. Ez esetben, ha a lejtősség foka elég nagy, a fölösleges talajvíz a talajágyon halad lefelé. Ha a lejtősség foka csekély akkor a leszivárgás oly lassú, hogy a terület vízenyőssé válik. Teknős helyeken, ahol a teknő oldalai a talajvizet a teknő közepe felé vezetik, utóbbi meglehetősen lejtősség mellett is vízenyős lesz. Ily vízenyősséget azonban gyakran a szikla repedéseiből a talaj alsó rétegébe szivárgó forrásvíz is okoz. Mindkét esetben túlságossá s a műnövényzetre nézve károsná válik a talajvíz, miért is az ilyet a köznép sok helyen vad víznek, az ily helyet vad vízesnek nevezi.

---

\*) A talajon átszivárgó vízre, valamint az erre befolyással lévő körülményekre nézve beható kísérleteket tett Wollny. Ezek eredményei közölve voltak: *Forschungen*, XI. kötet, 1 és köv., valamint 321. és köv. lapjain.

\*\*) *Wollny Forschungen*. VII. 218. l.



Ha ily körülmények közt a hely egyszersmind lapályos, úgy hogy az összegyűlő víz lefolyást nem talál, a talaj mocsarossá válik, sőt nagyobb összefüggő vízfelületnek is helyet adhat. Ha a talaj alsóbb rétegeiben vagy a talajágban összegyűlt víz nem ér a talaj felszínéig, s azt csak hajcsövesség és elpárolgás folytán nedvesíti meg, akkor fenékvíznek neveztetik. A fenékvíz egyébiránt nemcsak közvetlen csapadékokból és forrásvízből táplálkozik, hanem lapályos helyeken a folyók vize is táplálhatja; s ez esetben felszine a folyók áradása által nagyon mélyen fekvő lapályokon és különösen áteresztő homoktalajban, néha annyira emelkedik, hogy annak felületét előnti. Az így megjelenő vizet a nagy magyar lapályon a köznép „földárja“ névvel illeti.

A talaj vízbeivó képessége vagyis vízkapacitása,\*) felázása, megkérgesedése.

Vízbeivó képesség alatt értjük a talajnak azon tehetségét, hogy a rajta fölös mennyiségben átszivárgó vízből bizonyos mennyiséget hajcsövességi erejénél fogva visszatart. A visszatartott víz mennyiségének tehát a hajcsövességi erővel arányban kell lenni. Ebből következik, hogy mennél finomabb szerkezetű a talaj, annál nagyobb annak vízbeivási képessége is; ámbár a talajanyagok vegyi alkatának is kell e tekintetben némi befolyást tulajdonítanunk. A televényt alkotó anyagokról megjegyzendő, hogy azok részecskéi ha látszólag nem is oly finomak mint az agyagéi, mégis rendkívül nagy vonzerővel bírnak a vízre; mert egy ily — a növényi szövet részleges felbomlása által származott televényrészecske nemcsak külső felületén gyakorol a folyadékra vonzást, hanem belső végtelen finom likacsai és repedései által is, minthogy az anyag is, melynek maradványaiból származott t. i. a növényrostok, finom likacsu belső szerkezettel bírnak, s a felbomlás e hézagokat még számtalan új hézaggal likacscsal és repedéssel stb. szaporította; úgy hogy minden ily parányi részecske maga is egy kis szivacs. A vegyi úton kicsapott humuszsav pedig természetesen végtelen finom szilárd részecskékből áll, melyek részben a vizet korlátlan mennyiségben felvenni képes kolloid-anyagnak tekinthetők.

\*) Wassereapacität, Wasseraufnahmefähigkeit.



Ezek előre boesátása után könnyen kimagyarázhatjuk Schübler kísérleteinek alább következő eredményeit, mely szerint a fölöslegben leszivárogtatott vízből vissza tartattak:

|                                                | A talaj<br>súlyának          | A talaj<br>térfogatának |
|------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                                                | százalékaiban kife-<br>jezve |                         |
| kvarczhomok . . . . .                          | 25                           | 49·9                    |
| mészköhomok igen finom . . . . .               | 29                           | 58·2                    |
| gipszpor . . . . .                             | 27                           | 50·1                    |
| agyag, 45% homokkal . . . . .                  | 40                           | 68·2                    |
| agyag, 24% homokkal . . . . .                  | 50                           | 73·0                    |
| agyag, 10% homokkal . . . . .                  | 61                           | 81·7                    |
| tiszta agyag . . . . .                         | 70                           | 87·5                    |
| finom szénsavas més (vegyicsapadék!) . . . . . | 85                           | 80·8                    |
| humusz savany . . . . .                        | 190                          | 93·5                    |
| kerti föld . . . . .                           | 89                           | 82·1                    |
| szántó talaj . . . . .                         | 52                           | 74·5                    |
| palás márga . . . . .                          | 34                           | 66·0                    |

Ujabb időben a talaj vízbeívó képességének viszonyait beható kísérletek és tanulmányok tárgyává tették. Mindenekelőtt elismertetett Dr. A. Mayernek azon nézete, hogy a különböző talajanyagok és ezekből összetett talajok vízkapacitásáról sokkal helyesebb ítéletet nyerünk akkor, ha a talaj térfogatára vonatkoztatjuk azt, nem pedig annak súlyára, mint az korább majd általában szokás volt. A talaj vízkapacitását ugyanis súlyszázalékokban úgy kapjuk, ha a felöntött fölös vízből visszatartott mennyiségnek súlyát százzal szorozzuk, s azután a talaj súlyával elosztjuk. Itt tehát a talaj sulya, mely a különböző talajanyagoknál igen különböző lehet, az eredmények összehasonlítására igen zavaró hatásu. A térfogat-százalékra vonatkozó vízbeívási képességet ellenben úgy találjuk meg, ha a beívott víz térfogatát a talaj térfogatával elosztjuk, s azután százzal szorozzuk, hogy százalékokban legyen kifejezve. Ha e számot ismerjük, akkor könnyű kiszámítani, hogy bizonyos térfogatu talaj hány liter vizet képes felvenni. Ha pl. a vízbeívási képesség 40 volumszázalék, akkor egy köbméter talaj képes felvenni  $1000 \times \frac{40}{100} = 400$  liter vizet, mely e talajtérfogatban, (eltekintve a talaj párolgásától) a növényeknek



rendelkezésre áll. De a kísérletek azt is kiderítették, amire legelőször Mayer figyelmeztette az érdeklődő köröket, hogy a kísérletek ugyanazon talajnál egészen más eredményre vezetnek, ha különböző vastagságu talajoszlopok, illetve különböző vastagságu talajrétegek alkalmaztatnak; mert mennél magasabb a talajoszlop, annál kevesebb vizet képes az a hajcsövességi erőnél fogva visszatartani, s a magas talajoszlop alsó része jóval több vizet tartalmaz, mint a felső. Ez igen könnyen megmagyarázható. Ugyanis a visszatartott víz mennyisége két, ellenkező irányban ható erőnek az eredménye. Az egyik a talaj hajcsövességi ereje, a másik a talajban lévő összefüggő vízfonalak súlya. Mentől magasabbak utóbbiak, annál több vizet von el a nehézségerő, kombinálva a vízrészecskék összefüggési erejével, a felső rétegekből.

Fennebbiek kitűnnek Wollny kísérleteiből,\*) melyeket 4 cm. átmérőjű, 7 darabból összetett, s összesen 1 m. magas üvegcsövekkel tett. Ezek közül itt csak egy sort emelünk ki. 0·01—0·07 mm. átmérőjű kvarczhomok nemekből álló oszlop egyes rétegei tartalmaztak vizet, a vízfeltöltés után 36 óra múlva, midőn alól már víz nem csepegett le, térfogat-százalékokban:

|                        |      |
|------------------------|------|
| 0— 10 cm. mélységben   | 35·5 |
| 11— 25       "       " | 35·2 |
| 26— 40       "       " | 39·4 |
| 41— 55       "       " | 39·7 |
| 56— 70       "       " | 40·8 |
| 71— 85       "       " | 41·7 |
| 86—100       "       " | 42·4 |

Megjegyzendő, hogy finom szerkezetű talajoknál sokkal több időt, napokat, sőt heteket kell várni, míg a nehézségerő a hajcsövességi erővel egyensúlyba jövéen, a vízszivárgás felülről lefelé megszűnik.

A fennebbiekhez hasonló kísérletek alapján Mayer megkülönbözteti a legnagyobb vízbeivó képességet, mely igen rövid, pl. 5—10 cm. és a legkisebb vízbeivóképességet, mely magas (75—100 cm.) talajoszlopokban, illetve ily vastag talajrétegekben nyilvánul.

\*) Wollny, Untersuchungen über die Wasserkapazität der Bodenarten. Forschungen, VIII. kötet, 177. és k. l. I Versuchsreihe, 188 1



Wollny a legnagyobb vízbeivóképességet 5 cm. magas oszlopokra nézve következőknek észlelte térfogat-százalékokban: kvarczhomok, 0.01–2.00 mm. vastagságu szemcsék-

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| ből egyenletesen összekeverve . . . . .                     | 37.62 |
| $\frac{2}{3}$ kvarczhomok és $\frac{1}{3}$ humusz . . . . . | 46.19 |
| $\frac{1}{3}$ kvarczhomok és $\frac{2}{3}$ humusz . . . . . | 59.61 |
| humusz . . . . .                                            | 74.59 |
| $\frac{2}{3}$ humusz és $\frac{1}{3}$ agyag . . . . .       | 64.92 |
| $\frac{1}{3}$ humusz és $\frac{2}{3}$ agyag . . . . .       | 59.45 |
| agyag . . . . .                                             | 58.13 |
| $\frac{2}{3}$ agyag és $\frac{1}{3}$ kvarczhomok . . . . .  | 47.49 |
| $\frac{1}{3}$ agyag és $\frac{2}{3}$ kvarczhomok . . . . .  | 41.51 |

Ugyanezen észlelő a legkisebb vízbeivóképességet 1 m. hosszú és 4 cm. átmérőjű csövekbe betöltött talajanyagokkal, a cső felső 10 cm. magas részében, következőleg állapította meg.

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| kvarczhomok . . . . .                                       | 33.04 |
| $\frac{2}{3}$ kvarczhomok és $\frac{1}{3}$ humusz . . . . . | 40.10 |
| $\frac{1}{3}$ kvarczhomok és $\frac{2}{3}$ humusz . . . . . | 48.85 |
| humusz . . . . .                                            | 55.35 |
| $\frac{2}{3}$ humusz és $\frac{1}{3}$ agyag . . . . .       | 54.04 |
| $\frac{1}{3}$ humusz és $\frac{2}{3}$ agyag . . . . .       | 53.15 |
| agyag . . . . .                                             | 53.19 |
| $\frac{2}{3}$ agyag és $\frac{1}{3}$ kvarczhomok . . . . .  | 42.85 |
| $\frac{1}{3}$ agyag és $\frac{2}{3}$ kvarczhomok . . . . .  | 34.53 |

Ezekből kitűnik, hogy mennél finomabb a talaj, annál nagyobb annak legkisebb vízkapacitása. Hogy ez legkisebb a homoknál, legnagyobb a humusznál, s ehez közel áll az agyagnál.

Ezen kívül kitűnt még további kísérletekből az is, hogy a vízbeivó képesség a morzsás szerkezetű agyagtalajnál jóval kisebb, mint a porszerű szerkezetűnél; hogy az a morzsás agyagtalaj összenyomása, megtömöttítése által jelentékenyen emelkedik, s hogy végre a talaj kavicsstartalma annak vízbeivó képességét csökkenti.

Röviden, minden, ami a talaj vízátbocsátó képességét emeli; annak vízbeivó képességét, vízkapacitását, csökkenti.

A vízhez való vonzalommal és a szerkezet finomságával közeli viszonyban van némely talajnak azon tulajdonsága, hogy



ha fölöslegesen vízzel jut érintkezésbe felázik, legfinomabb részecskéi a vízben úsznak, ellenben a durvábbak annak fenekére süllyednek. A víz elpárolgása alatt az abban foglalt finom részecskéik iszap alakban leülepednek, s megszáradva repedezett kérget alkotnak a felületen, mely azután szélein kissé felhomorodik a felület további összehúzódása folytán. Ez eset a legtöbb agyagos talajnál beáll. Ellenben a tömött agyagmárga meglágyul ugyan huzamos idő alatt a vízben és nagymértékben gyurható lesz, mint az agyag, de nem ázik szét sárrá és iszappá, hanem szívós csirizszerű ragadványfölddé lágyul. A szétázási hajlam fokáról úgy szerzünk valamely talajnál fogalmat, hogy egy száraz, és síma felületű talajdarabra néhány cseppvizet csepegtetünk, mire a felázás gyorsaságát megfigyeljük. Egyébiránt e hajlam többé-kevésbé minden talajnál megvan.

A talaj párolgás általi vízvesztése és ennek pótlása az alsóbb rétegekből.

A talaj felsőbb rétegei részint a növényzet vízfelvetele, részint a közvetlen elpárolgztatás által folytonosan vizet vesztenek, ha a lég vízgőzökkel nincs telítve. A fizika törvényeinél fogva, mennél nagyobb a talajnak a léggel érintkező felülete, mennél magasabb hőmérséke, mennél szárazabb a levegő és mennél gyorsabb annak mozgása: annál több vizet párolgztat el a talaj felülete. E víz veszteséget a talaj az alsóbb rétegekből oly mértékben pótolja, a mely mértékben képes hajcsövi erejénél fogva az alsóbb rétegekből vizet felszívni és a felsőbb rétegekkel, s végre a felülettel közölni. Schmied A. szerint\*) a durva homoktalaj a vizet csak 20—30, a vályogtalaj (homokos és főveges agyag) 45—60, a televényes talaj 60—80, az agyagtalaj 100—125 centiméterre, végre a láptalaj (Moorboden) több méter magasságra képes felemelni.

Wollny kísérletei\*\*) számokban bizonyítják azon, többnyire már addig is ismert tényeket, melyek szerint mennél finomabb a talaj szerkezete, annál magasabbra képes a vizet felszívni; — mennél nedvesebb a talaj alsó rétege, annál gyorsabban emelkedik fel a víz a szárazabb felső rétegbe; ha a talaj víztartalma a

\*) Bodenlehre, 1886. 232. l.

\*\*) Wollny, Untersuchungen über die capillare Leitung des Wassers im Boden. VII. köt. 269. és köv. lapokon; valamint VIII. köt. 206. és köv. lapokon.



legnagyobb vízbeívási képesség 50%-án alól van, akkor nem képes a felsőbb, szárazabbaknak észrevehető vízmennyiséget szolgáltatni; — minél magasabbra emelkedett fel a víz az alsóbb rétegekből a felsőbb, szárazabbakba, annál lassabb lesz annak mozgása felfelé. Ezen késleltetés annál hamarabb és szembeötlőbbben áll be, mennél durvább a talaj szerkezete; — leggyorsabb a hajcsövi vezetés a hajcsőnek bizonyos átlagos átmetszési síkja, illetve átmérője mellett (0·05—0·10 mm.), mert ennél tágabb hézagokban a nehézségerő kezd jobban érvényesülni, míg ennél finomabbakban a surlódás mindinkább lassítja a víz felhágását; a kavicsosság a víz felhágását akadályozza. Továbbá: mennél tömöttebb a talaj, annál erősebb a hajcsövi vezetés. A porszerű szerkezetű agyagos talajban a víz gyorsabban és magasabbra hág fel, mint a morzsás szerkezetű talajban; mert az utóbbiakban a nagyobb hézagok gyöngítik a hajcsövi működést. A morzsás szerkezetű talaj hajcsövi erejét az összetömöttítés, összenyomás, ledön-gölés emeli. A rétegek különböző finomságu szerkezete a víz felhágást jelentékenyen akadályozza. A finom szerkezetű réteg a durva szerkezetűből könnyebben vesz fel vizet, mint megfordítva.

A víz felszívása gyorsaságának megítélésére az egyes talaj-anyagoknál, álljanak itt a következő adatok.\*) 24 óra alatt felhágott a víz centiméter magasságra:

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| kvarcshomoknál . . . . .                                  | 63·5 |
| $\frac{2}{3}$ kvarcshomok, $\frac{1}{3}$ humusz . . . . . | 44·0 |
| $\frac{1}{3}$ kvarcshomok, $\frac{2}{3}$ humusz . . . . . | 36·1 |
| humusz . . . . .                                          | 27·8 |
| $\frac{2}{3}$ humusz, $\frac{1}{3}$ agyag . . . . .       | 10·7 |
| $\frac{1}{3}$ humusz, $\frac{2}{3}$ agyag . . . . .       | 11·9 |
| agyag . . . . .                                           | 15·0 |
| $\frac{2}{3}$ agyag, $\frac{1}{3}$ kvarc . . . . .        | 16·2 |
| $\frac{1}{3}$ agyag, $\frac{2}{3}$ kvarc . . . . .        | 19·5 |

Ezek előrebecsátása után könnyen megérthetők C. Eser kísérletei és az azokból levont következtetések,\*\*) melyek közül a legfőbbek a következők:

\*) Wollny, Forsch. VII. 300. l.

\*\*) C. Eser. Untersuchungen über den Einfluss der physikalischen und chemischen Eigenschaften des Bodens auf dessen Verdunstungsvermögen. Wollny, Forschungen, VII. 1—124. l.



Mennél nagyobb a talaj víztartalma, vízbeivó képessége és a csapadékokból vagy fenékvízből nyert nedvessége, annál több vizet párologtat ki. A talaj, a felületén elvesztett vizet a hajcsővesség útján felszívott vízzel pótolja, mindaddig, míg az a talaj vízkapacitásának felét túlhaladja. Ha ez beáll, akkor a víz további felemelése az alsóbb rétegekből a legfelsőbe majdnem megszűnik, s e miatt utóbbi mind jobban kiszárad. Mennél vastagabb ezen kiszáradt réteg, annál inkább védi az alsóbbakat a további vízvesztéstől. Ha a talaj felső rétege a szárazság e fokát elérte, a további párolgást az alsó rétegekben csak a felmelegedés és a behatoló légmozgás eszközölheti. Ha a felső réteg megmunkálás által meglazítottatik, részint közvetlen ez által, részint gyorsabb kiszáradása által elveszti vízfelszívó képességét, miáltal az alatta lévő rétegeket a további vízvesztéstől hatalmasan óvja. Ép ez a hatása minden, a vizet felfelé vezetni képtelen talajtakarónak is, pl. durva homoknak, alomnak sat. Oly talajok, melyek felső rétege gyorsan kiszárad és a vizet magasra emelni nem képesek, alsóbb rétegeikben a kiszáradástól aránylag jobban megvédetnek. Ez épen az ily, csekély vízkapacitású talajoknál nagy jelentőségű. Mindaz, ami a víz felhágását akadályozza, csökkenti egyúttal a kipárolgás általi vízvesztést is az alsóbb rétegekben, és egészben. E szerint a kipárolgás a finomabb szerkezetű és tömöttebb talajoknál nagyobb, mint a durvább szerkezetűeknél és lazábbaknál; a porszerkezetűnél nagyobb, mint a morzsaszerkezetűnél. A fekete, s általában sötétebb színű talaj, a felmelegedés nagyobb foka miatt, a párolgás által hamarabb kiszárad.

Legtöbb vizet vesz az élő növényzettel fedett talaj, mert a növények több vizet párologtatnak el, mint a kopasz talaj;\*) legkevesebb víz párolog el az élettelen talajtakaró által fedett talajból, még pedig annál kevesebb, mennél vastagabb a takaró réteg. Legtöbb vizet párologtat el a déli oldal, legkevesebbet az északi.

\*) Wollny egy kísérleténél (Forsch. X. 284 1) 100 cm<sup>2</sup>-en elpárologtatott. 1875-ben ápr. 15-től október 31-éig

|                        | gramm vizet |
|------------------------|-------------|
| a kopár vályogtalaj    | 33899       |
| a gyepvel fedett talaj | 51721       |
| a kopár homoktalaj     | 18312       |
| a gyepvel fedett talaj | 47355       |



Általában mennél naposabb a talaj fekvése, annál nagyobb az elpárolgás.

f) A talaj térfogatának változása a megnedvesülés és kiszáradás által.

Haberlandt tanár\*) szerint az átnedvesített talaj, elkezdve a tiszta homoktól a tiszta humuszig, kiszáradás által térfogatából 0—30 százalékot veszíthet. Éppannyit nyerhet a száraz talaj is átítatás folytán. E változásokat azonban csak megüledett, kötött szerkezetű talajnál lehet megmérni; ellenben a feltört, megporhanyított talajon észre nem vehetni.

Az összeaszásra legnagyobb befolyással vannak azon anyagok, melyek a megnedvesedésnél legerősebben feldagadnak, ilyen mindenek felett a humusz, azután az agyag; ellenben a homok megnedvesedés által térfogatát nem változtatja. E hajlam valószínűleg a talaj szerkezeti finomságával körülbelől egyenes arányban áll.

A kiszáradás folytán a talaj repedéseket kap felületén, melyeknek szélessége annál nagyobb, mennél inkább összefüggenek a talajrészecskék egymással. Mennél lassabban szárad ki a talaj, annál nagyobb közökkel lépnek fel a repedések és viszont annál sűrűbbek, mennél gyorsabb a kiszáradás. A repedések mindig függélyesek, eltekintve azon a felülettel párhuzamos repedésektől, melyek a felkonkorodó felső rétegnek az alsóbbtól való elválása folytán erednek. A függélyes repedések két okból hátrányosok; mert nemcsak a kiszáradásnak a talaj mélyébe való hatolását segítik elő, hanem egyszersmind a gyökerek erőszakos megsértésével és számos finom gyökérrost elszáradásával járnak karöltve.

A repedések képződését akadályozza a talaj megporhanyítása; de ez esetben is előfordul, hogy a porhanyított réteg alatt a talaj megrepedezik; mely esetben a felső réteg porhanyított földje bele süllyed, s ez által a repedés a felületen is elárulja magát.

Fennebbiekből egyuttal az is kiderül, hogy az erdő és alomtakaró a talajt az ily káros repedések képződése ellen hatalmasan védelmezi.

\*) Fühlings Landwirtschaftliche Zeitung, 26. Jahrg. 7. Heft.



Schübler kísérletei szerint kiszáradás által a fennebb felsorolt talajanyagok következő apadást szenvednek százalékokban, ha nedves állapotban légen, közönséges nyári hőmérsék mellett kiszáraitatnak :

|                               |    |                        |    |
|-------------------------------|----|------------------------|----|
| Mindenféle homok . . . . .    | 0  | humusz . . . . .       | 20 |
| agyag 45 % homokkal . . . . . | 6  | kerti föld . . . . .   | 15 |
| agyag 24 % „ . . . . .        | 9  | szántó talaj . . . . . | 12 |
| agyag 10 % „ . . . . .        | 11 | palás márga . . . . .  | 10 |
| tiszta agyag . . . . .        | 18 |                        |    |

Ezen eredmények tehát szűkebb határok közt mozognak, mint Haberlandtéi.

### g) A talaj nedvességi fokai.

Ámbár ugyanazon talaj egész éven át a nedvességeknek számtalan fokán megy keresztül a légszáradt állapottól fel a túltelítettig, mindazonáltal annak bizonyos időben észlelhető nedvességi állapotára nézve a gyakorlat csak kevés, s egymástól élesen el nem választható fokot állított fel.

V i z e n y ő s n e k (wassersüchtig, nassgallig) nevezzük azon talajt, mely úgy át van hatva a víztől, hogy a kapa vagy a láb nyomába víz gyűl össze; n e d v e s n e k (nass), ha vízkapacitása 70—80 % -ának megfelelő vizet tartalmaz, markunkkal jól összeszorítva csöppeket hullat; n y i r k o s n a k (feucht), mely kapacitása 30—50 % -ának megfelelő vizet tartalmaz, ha a nedvességtől színe setétebb és egyszersmind marokba szorítva azt megnedvesíti; ü d é n e k (frisch), kapacitása 20—30 százalékának megfelelő víztartalommal, mely csak annyira nedvesíti meg kezünket, hogy azt hivesnek érezzük; s z á r a z n a k (trocken), 10—15 % víztartalommal, midőn a nedvesség által előidézett setétebb szint már elvesztette, és a tényéren a nedvességnek semmi nyomát nem hagyja hátra ugyan, de összemorzsolva még nem porzik; a s z o t t (dürr), mely csak 1—5 % vizet tartalmaz összedörzsölve, porát a szél könnyen elviszi.

Ép ezen kifejezésekkel szokás jelölni azon területeket is általában, melyek a tenyészet évadján nagyobbára ama kifejezéseknek megfelelő állapotban vannak. Így mondhatjuk pl., hogy ez vagy azon terület vízenyős, nedves vagy nyirkos, száraz vagy aszott.



Aszott szokott lenni a homokból, kavicsból, kötörmelékből álló, vizetátersztő-ágyu talaj, vagy a sekély mélységű málladék-talaj meredek, déli hegyoldalokon; száraz szokott lenni a televényes homok, mész- és márgatalaj, a málladéktalajok verőfényes oldalokon; üde a televényes, kissé agyagos, de átersztő-ágyu talaj, valamint sok málladéktalaj keleti és nyugati fekvés mellett, lejtős területeken; valamint a külömben szárazságra hajlandó talajok a folyók közelében, az erdők árnyékában; nyirkos talajok leginkább előfordulnak a lapályokon, északi, északnyugati és északkeleti fekvésű, csekélyebb lejtésű területeken, kivált nagyobb agyag és televénytartalom mellett; a nedvességre leghajlandóbbak az agyag, vályog- és televénytalamok, kivált ha völgyekben, lapályokon és vízhatlan talajágyon fekszenek; a vizenyösséget végre az idézi elő, hogy az átnembocsátó talajágy felett csapadékokból, forrásos rétegekből összegyűlt víz, vagy a felemelkedő fenékvíz, a talajt teljesen áthatja, teltelíti.

A nedvességnek fennebb körülírt fokai természetesen észrevehetetlenül mennek át egymásba. Mind a mezei, mind az erdei műnövényeknek legkedvezőbb általánosságban azon állapot, melyet nyirkosnak és üdének mondtunk. A még mivelhető, legszárazabb talajon lehet még szőlőt tenyészteni; az erdei fák legjobban tenyésznek az üde és nyirkos talajon, mely a fák közül az égernek, fűzeknek és nyárnak legkedvesebb tartózkodási helye; de ahol a víztartalom a kapacitás 80 százalékát a tenyészeti évad nagyobb részén át meghaladja, ott sem a réti füveket, sem az említett erdei fákat tenyészteni nem lehet.

### 7. A talaj viszonya a léghez.

A talaj likacsai, hézagai részint vízzel, részint léggel vannak telve. Mennél több helyet foglal el a víz, annál kevesebb jut a lég számára. A talajban foglalt levegő mennyiségét térfogatban kifejezve, a talaj légkapacitásának nevezik. Ezt számítás által megkaphatjuk, ha a talaj ürfogatából, melyet egynek veszünk, levonjuk a szilárd talajrészek által és a víz által elfoglalt területet. A szilárd talajrészek által elfoglalt ürfogatot megkapjuk, ha a kiszáritott talaj súlyát ( $volumsúly = v$ ), annak fajsúlyával (specifikus súly  $= s$ ) elosztjuk. A talajban foglalt víz ürfogatát pedig miután fajsúlya 1, ugyanazon szám fejezi ki, mint az azon ürfogat-



nak megfelelő súly. Ezt pedig úgy kapjuk, ha a nedves talaj összes súlyából ( $v_1$ ), a száraz talajtét ( $v$ ) levonjuk. E szerint a talaj légkapacitásának ( $L$ ) képlete a következő:

$$L = 1 - \left[ \frac{v}{s} + (v_1 - v) \right]$$

Ha az így nyert számot százzal szorozzuk, megkapjuk a légkapacitást százalékokban. A valóságban azonban teljesen átnedvesített talajoknál, amennyiben azok térfogatukat változtatják, a kiszámítottól a valódi eredmények kissé eltérnek.

Wollny\*) a légkapacitást a főbb talajanyagoknál s azok keverékénél a következőnek találta:

| Talaj anyag                                           | Szárazon                      |      | Legkisebb            |      | Legnagyobb |       |      |     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------|----------------------|------|------------|-------|------|-----|
|                                                       |                               |      | vízkapacitás mellett |      |            |       |      |     |
|                                                       | ü r f o g a t s z á z a l é k |      |                      |      |            |       |      |     |
|                                                       | talaj                         | lég  | talaj                | víz  | lég        | talaj | víz  | lég |
| kvarezhomok . . . . .                                 | 58.5                          | 41.5 | 58.5                 | 29.8 | 11.7       | 58.5  | 41.1 | 0.4 |
| $\frac{2}{3}$ kvarezhomok, $\frac{1}{3}$ humusz . . . | 49.7                          | 50.3 | 49.7                 | 36.1 | 14.2       | 49.7  | 47.2 | 3.1 |
| $\frac{1}{3}$ kvarezhomok, $\frac{2}{3}$ humusz . . . | 36.1                          | 63.9 | 36.1                 | 39.4 | 24.5       | 35.2  | 64.8 | 0.0 |
| humusz . . . . .                                      | 27.6                          | 72.4 | 27.6                 | 43.0 | 29.4       | 24.6  | 75.4 | 0.0 |
| $\frac{2}{3}$ humusz, $\frac{1}{3}$ agyag . . . . .   | 32.9                          | 67.1 | 32.9                 | 59.1 | 9.0        | 31.3  | 68.7 | 0.0 |
| $\frac{1}{3}$ humusz, $\frac{2}{3}$ agyag . . . . .   | 39.4                          | 60.6 | 39.3                 | 56.0 | 4.7        | 38.7  | 61.3 | 0.0 |
| agyag . . . . .                                       | 42.7                          | 57.3 | 42.7                 | 49.1 | 8.2        | 41.7  | 53.2 | 0.0 |
| $\frac{2}{3}$ agyag, $\frac{1}{3}$ kvarezhomok . . .  | 49.8                          | 50.2 | 49.8                 | 38.3 | 11.9       | 49.8  | 50.2 | 0.0 |
| $\frac{1}{3}$ agyag, $\frac{2}{3}$ kvarezhomok . . .  | 56.5                          | 43.5 | 56.5                 | 30.8 | 12.7       | 56.4  | 43.6 | 0.0 |

A legnagyobb vízkapacitás első hasábjában kitüntetett talaj térfogatok az agyagos és televényes talajoknál, kisebbek mint a száraz talajnál. Ez onnan van, mert az átitatott talaj többé kevésbé felduzzadt, s így az egésznek térfogatát redukálni kellett az egységre, (illetve a táblázatban 100-ra).

Természetes, hogy mindaz, ami a talaj likacsosságát emeli, gyarapítja annak légfoghatóságát is száraz állapotban; továbbá mennél nedvesebb a talaj, annál kisebb a légfoghatósága, s a nedves talajok annál kevesebb léget tartalmaznak, mennél finomabbak hézagaik; végre, hogy mennél durvábbak a talaj likacsai és hézagai, annál több tért foglalhat abban a lég, a víznek rovására. Az agyagos talaj légtartalmát a megmunkálás által létrehozott morzsás szerkezet jelentékenyen emeli.

\*) Forschungen VIII. 370 1.



A levegőből a talajba jutó légnemek (épúgy mint az ott képződők is) sűrűbbek, mint a velük érintkező légrétegben; mert a talajnak, mint minden likacsos testnek, azon képessége van, hogy a gáz állapotú testeket megsűríti.

A likacsos szilárd testek e képességét már a mult század elején felismerték. Boussingolt azt találta, hogy a puszpángfa szene 11 és 13° C temperatura mellett likacsában képes megsűríteni 90 ürfogat ammoniát, 35 ürfogat szénsavat 9·2 ürf. oxygént és 7·5 ürf. nitrogént.

A közelebbi évtizedekben többen eszközöltek beható kísérleteket a talaj gázsűrítő képessége kiderítésére.

Többek közt pl. Döbrich néhány talaj gázsűrítő képességét a következőknek találta, ha a gázok tömörségét 0° hőmérséknek és 760 mm. nyomásnak megfelelően vesszük számításba:

|                                  | 100 volum<br>anyagban<br>volt volum<br>gáz | 100 volum gáz ösz-<br>sze volt téve |        |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------|---------------|
|                                  |                                            | szén-<br>sav                        | oxygén | nitro-<br>gén |
| Homoktalaj (Drackendorfi völgy)  | 31·0                                       | 18·4                                | 11·0   | 70·6          |
| Mésztalaj . . . . .              | 55·3                                       | 48·5                                | 9·8    | 41·7          |
| Agyagtalaj (Lebedárol) . . . . . | 43·1                                       | 19·4                                | 12·9   | 67·7          |

Az egyes talaj anyagok gázsűrítő képességének számokban való kiderítésére többek közt G. Ammon vitt véghez beható kísérleteket,\*) melyekből itt csak néhány adatot emelhetünk ki.

17° C hőmérsék mellett elnyelt

| 100 ürfogat talajanyag                       | ü r f o g a t |          |
|----------------------------------------------|---------------|----------|
|                                              | vízgőzt       | ammoniát |
| kvarczpor, 0·2 mm. átmérőn alól . . . . .    | 453           | 668      |
| ugyanaz 0·2—0·7 mm. közt . . . . .           | 278           | 333      |
| agyagpor . . . . .                           | 15386         | 5544     |
| agyagmorzsa 0·3—0·74 mm. átmérővel . . . . . | 14323         | 4411     |
| ugyanaz 0·75—1·8 mm. átmérővel . . . . .     | 14098         | 4341     |

Ebből kiderült, hogy a talaj gázsűrítő képessége a szerkezet finomságával emelkedik, s hogy az agyag a homokét sokszorosán felülhaladja.

\*) G. Ammon. Untersuchungen über das Condensationsvermögen der Bodenconstituenten für Gase. Wollny, Forschungen. II. köt. 1—46. l.



Az egyes talaj anyagok vízgőz sűrítő képességét különböző hőmérsék mellett előtűnteti e kimutatás:

| 100 volum talaj<br>anyag      | megsűrít cm <sup>3</sup> vízgőzt (0.0008064<br>tömöttséggel) |       |       |       |       |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                               | – 10°                                                        | 0°    | + 10° | + 20° | + 30° |
|                               | C                                                            | C     | C     | C     | C     |
| h ő m é r s é k m e l l e t t |                                                              |       |       |       |       |
| humusz . . . . .              | 12718                                                        | 14206 | 36504 | 26788 | 16497 |
| vashydroxyd . . . . .         | 12973                                                        | 47332 | 99712 | 98990 | 54753 |
| kvarezhomok . . . . .         | 2026                                                         | 2198  | 1185  | 277   | 99    |
| mészhomok . . . . .           | 208                                                          | 4258  | 4775  | 962   | 233   |
| kaolin . . . . .              | 5378                                                         | 5736  | 6448  | 1542  | 1336  |

Az ammoniára nézve:

| 100 cm <sup>3</sup> talaj anyag | megsűrít cm <sup>3</sup> ammoniát, 0.0007616<br>sűrűség mellet |       |       |       |       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | – 10                                                           | 0     | + 10  | + 20  | + 30  |
|                                 | f o k C h ő m é r s é k n é l                                  |       |       |       |       |
| humusz . . . . .                | 28892                                                          | 29517 | 22930 | 20018 | 17324 |
| vashydroxyd . . . . .           | 34500                                                          | 38992 | 35096 | 25513 | 22029 |
| kvarezhomok . . . . .           | 775                                                            | 938   | 1072  | 1117  | 657   |
| mészkőhomok . . . . .           | 1250                                                           | 1552  | 1135  | 782   | 720   |
| kaolin . . . . .                | 11848                                                          | 2447  | 2165  | 1473  | 1379  |
| gipsz porrá törve . . .         | 12917                                                          | 15134 | 10360 | —     | 2852  |

Ebből következik, hogy: a gázsűrítő képesség a hőmérsék emelkedésével általában apad. A vízgőznél a sűrítés maximuma úgy látszik 10° C, az ammoniánál körülbelül 0° C mellett áll be.

A megvizsgált talajanyagok közül mind ammoniára, mind vízgőzre nézt legnagyobb sűrítőképeséget mutatott a vaséleg, legközelebb áll ehhez a humusz, azután a gipsz, kaolin, ennél jóval hátrább a mészkőhomok, s végre legcsekélyebb volt e tehetség a kvarcnál.

Az egyes talajanyagok 17° C mellett a nitrogénből, oxigénből és szén-savból a következő mennyiségeket nyeltek el:



| 100 cm <sup>3</sup> talajanyag | elnyelt ürfogat gázt<br>cm <sup>3</sup> |        |         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------|---------|
|                                | CO <sub>2</sub>                         | O      | N       |
| humusz . . . . .               | 930.1                                   | —      | 126.2   |
| vashydroxyd . . . . .          | 5725.8                                  | 665.8  | 23986.2 |
| kvarczpor . . . . .            | 3.5                                     | —      | 24.9    |
| szénsavas mész . . . . .       | 8.6                                     | —      | 3803.3  |
| kaolin . . . . .               | 8.8                                     | —      | 813.4   |
| gypsz . . . . .                | 210.6                                   | 1189.6 | 10253.8 |

E szerint a szénsavat a talajanyagok közt csak a vashydroxyd nyeli el jelentékeny mennyiségben. A kvarcz szénsavas mész és kaolin száraz állapotban e lég nemet elenyészőleg csekély mennyiségben nyelik el. A gypsz többet, a humusz még többet képes felvenni, de sokkal a vashydroxyd mögött marad.

A talajnak oxigén elnyelő képessége, a többi gázokkal összehasonlítva nem jelentékeny, s csak a vashydroxydnál és gipsznél számbavehető.

A nitrogént minden talajanyag képes megsűríteni. Legtöbbet nyel el belőle a vashydroxyd, azután a gypsz, s legkevesebbet a kvarczhomok.

Kísérletei végeredményét a következő tételekbe foglalja a szerző:

a) A légneműek megsűrítése a talajban fizikai és vegyi folyamatokhoz van kötve.

b) A vegyi folyamatok által előidézett gázelnyelés jelentékenyebb, mint a csupán felületvonzásból eredő, elsőt főképen a vashydroxyd eszközli, melyek után a humuszanyagok következnek.)\*

c) A légneműek az elnyelésnél vagy ily állapotban maradnak, vagy változást szenvednek halmazállapotukban, vagy pedig végre vegyi változáson is mennek át.

d) A légneműek általában annál nagyobb mértékben vétetnek fel mennél könnyebben változtatják halmazállapotukat, vagy vegyi szerkezetüket.

e) A sűrítés a többi feltételeket egyenlőknek véve fel, annál nagyobb, mennél finomabbak a talaj részecskéi.

\*) Megjegyzendő, hogy élenyülésre alkalmas ásványianyagokkal, pl. pirít stb. nem tett szerző kísérleteket.



f) A talaj gáz-sűrítőképessége 0 és 10° C hőmérsékek közt legnagyobb, s mind alább szálló, mind feljebb emelkedő hőmérsék mellett apad.

Nemcsak a finomul osztott szilárd talajanyagok, hanem nagy mértékben képes a légnevet elnyelni a víz is. A légkör alkotásai közül legkevésbé nyilvánítja ezen képességét a nitrogénnel szemben, jobban az oxigén ellenében, sokkal nagyobb mértékben képes azonban elnyelni a szénsavat, az ammoniát pedig épen roppant mennyiségben.

Közönséges hőmérsék mellett elnyel 1 térfogat víz: a nitrogénből 0.015, az oxigénből 0.035, szénsavból körülbelül 1 térfogatot és ammoniából 600-nál többet.

Mennél több olyan anyag van a talajban, mely az oxigénnel egyesülni törekszik, pl. korhadó anyagok, humusz, ferrisók pirit, stb. annál több oxigént vesz az fel folytonosan a légből, mert a gáznak az ezen vegy működések által elfogyasztott részét a légből új adag pótolja. S minthogy a növény fiziológia szerint a gyökerek is fogyasztják e légnevet, ez is indokul szolgál új abszorbezióra. A szénsav a talajban többnyire nagyobb mennyiségben van jelen, mint az a légkör szénsavtartalmának megfelelné, s így inkább utóbbiba való átömlés történik, úgyhogy a talajban képződő szénsav egy része azt elhagyja, s helyette oxigén lép be. E szerint a talajban a légzésnek egy neme megy véghez, mely a növénygyökereknek életben tartására, a humuszképződésre a kőzetek felbomlására és az ásványtápanyagok feloldására okvetlenül szükséges. A talajnak e légzése annál zavartalanabbul történik, mennél lazább az; de a mérsékelt nedvesség is elősegíti azt, a víznek abszorbeáló képessége folytán; ellenben a tulságos vízmennyiség, mely a talaj hézagait eldugja, gátolja azt; s a rothadást okozó, oxigént nem, vagy csak igen kevés mértékben igénylő mikrozonok tenyésztését, s így a gyökerek rothadását elősegíti. Innen a föld porhanyításának egyik főhaszna! A tulságos nedvességnek káros hatása! A talaj légzését elősegítik a hőmérséknek és a légnyomásnak változásai. Emelkedő hőmérsék mellett ugyanis a talaj az abszorbeált gázok egy részét elbocsátja, épúgy akkor is, ha a légnyomás apad; ellenben a hőmérsék csökkenése, valamint a légnyomás emelkedése folytán újra többet abszorbeál



a talaj a légnemekből, de ha megfagy, akkor a víz által abszorbeált szénssav nagy része kiszabadul.

A talajok, teljesen kiszáritva, elvesztik fogyasztó képességüket az oxgyénre nézve; mert ez esetben azokban vegyi és fiziologiai folyamatok véghez nem mehetnek.

A talajban végbemenő szénssavképződés, s az evvel egybekötött tünetények felderítése végett érdekes kísérleteket tett Dr. J. Moeller\*). Ezek minden kétségét kizárnak a következő tényekre nézve:

Minden talajban, melyben szerves anyagok vannak, ha csak csekély nedvességgel is bír, felbomlási folyamatok mennek végbe, melyek oxgyén hozzájárulása mellett szénssav fejlesztésben nyilvánulnak. Csak a teljesen kiszáradt talaj veszt el e tulajdonságát. Ha a nedvesség és éleny nem hiányzik, akkor a hőmérsék emelkedése a szénssavképződést elősegíti. Az így kifejlett szénssav mennyisége minden közönséges viszonyok közt lévő talajban sokkal nagyobb, mint az, a melyet a légből felvenni volna képes. A légkör szénssavának főforrása épen a talaj, melynek lége mindig több szénssavat tartalmaz mint a levegő. Míg utóbbinak szénssav-tartalma rendes viszonyok közt  $\frac{3-4}{10 \cdot 000}$ , addig Moeller egy sovány rét talajában  $\frac{90-150}{10000}$ , az alomtakarótól megfosztott erdőtalajban pedig  $\frac{20-240}{10 \cdot 000}$  részt talált.\*\*)

Tekintve egy felől a talajban véghez menő ezen oxgyén fogyasztó folyamatokat, másfelől pedig a gyökerek oxgyénszükségletét: világos, hogy a talaj termőképeségéhez és gyökeres növények által való lakhatóságához a talajnak a lég által átjárhatónak kell lenni.

A talajnak lég által való átjárhatóságára nézve kimerítő kísérleteket vitt véghez G. Ammon\*\*\*) melyeknek eredménye kivonatban a következő: Mennél nagyobb a nyomás, mely a lég át-

\*) Mittheilungen des forstl. Versuchswesens Österreichs, Wien, 1878. Heft. II. 121—148. l.

\*\*) A talaj lég szénssavtartalmának és az erre befolyással lévő körülményeknek kiderítése végett tett kísérleti sorozatokat tartalmazza Wollny, Forschungen III. köt. 1., IV. k. 1, V. köt. 229. IX. k. 165. és köv. lapok.

\*\*\*) G. Ammon. Untersuchungen üb. die Permeabilität des Bodens für Luft. Wollny, Forschungen, III, köt. 208—241. l.



hajtására fordítatik, annál több lég megy át a talajon. Ugyanazon nyomás mellett annál több lég hajtatik át, mennél csekélyebb a talajréteg vastagsága. Mennél durvább a talaj, annál könnyebben járja át a lég.

5° C temperatura és 40 mm. víz oszlopnak megfelelő nyomás mellett 50 cm. vastag rétegen pl. átment 1 óra alatt

|                                |               |                   |
|--------------------------------|---------------|-------------------|
| ha a homokszemek átmérője volt | 0.00—0.25 mm. | 16.4 liter levegő |
| " " " "                        | 0.25—0.50 "   | 44.7 " "          |
| " " " "                        | 0.50—1.00 "   | 96.4 " "          |
| " " " "                        | 1.00—2.00 "   | 277.5 " "         |

A talaj fellazítása, a morzsás szerkezet előidézése rendkívül fokozza a lég által való átjárhatóságot és hogy e fokozódás nagyobb, mint amennyi a morzsák átmérőjének megfelelne.

5° C temperatura és 40 mm. víz oszlopnak megfelelő nyomás mellett 50 cm. vastag rétegen átment 1 óra alatt porszerű szerkezet mellett 1.6 liter levegő 1—2 mm. átmérővel bíró morzsákból álló talajon 420.2 liter levegő.

A talaj megtömöttítése az átjárhatóságot rendkívül csökkenti.

Az egyes talajnemekre vonatkozólag:

Az agyagos talajok átjárhatósága a legcsekélyebb, a homoké a legnagyobb. A homok átjárhatóságát már az agyagnak csekély (?) hozzá vegyítése is lényegesen csökkenti. A kísérleteknél a legcsekélyebb vegyítés 25 % volt, ami a homok átjárhatóságát annak 3.8 százaléka szállításra le. Az agyagnak további hozzá elegyítése már csekély befolyású volt.

A talaj víztartalma a lég által való átjárhatóságot leszállítja még pedig annál nagyobb eréllyel mennél nagyobb az illető talajnak vízkapacitása.

A talajtakaró a talaj átjárhatóságát csökkenti, még pedig leginkább a gyepek, kevésbé a szalma, trágya stb.

Míg a csupasz talaj 50 cm. magas oszlopán 1 óra alatt 7.32 liter levegő ment át, addig a szalmával fedetten 6.3, a gyeppel fedetten pedig csak 1.6.

## 8. A talaj hőviszonyai.

### a) A talaj hőmérsékének jelentősége.

A növény fiziologiai észleletek kétségen kívül helyezik a talaj melegének jelentőségét, aminek kellő méltánylása végett álljanak itt röviden a következő tények:

A talaj hőmérsékének emelkedése bizonyos legkedvezőbb fokig, fokozza a növények növekedését, különösen azok fejlődésének első szakában.



A gyökérfejlődést, s ennek következtében közvetve a többi növényrész fejlődését is jelentékenyen előmozdítja.

A gyökér életműködése, s így vízfelvétele is nagy mértékben függ a talaj hőmérsékétől; ha ez apad, apad a gyökér működése is. A tök és dohány pl. ha a talaj csak  $5^{\circ}\text{C}$  meleg, nem képesek annyi vizet felszini, hogy mérsékelt nyári meleg mellett a levelek által elpárologtatott vizet pótolják, minek folytán elfonnyadnak. A legtöbb, nálunk honos növény képes ugyan már csekély hőmérsék mellett is felvenni a csöppfolyó vizet, de e tehetségét a talaj hőmérsékének emelkedése feltűnően emeli. Ha több vizet vesznek fel a gyökerek, többet párologtathatnak el a levelek is, s így a talaji tápanyagok áramlása a levelek felé valamilyen az áthasonítás utóbbiakban gyorsittatik.

A talajhő igen fontos szerepet játszik a mag csírázásánál és a tenyészetnek felébredésénél tavasszal. Árnyékban az erdei magvak hetekkel később csíráznak mint a nap melegének kitett helyeken sőt ily körülmények közt gyakran fel sem ébred bennük a csírázási hajlam. A kis csemeték tavasszal korább zöldülnek ki szabad helyen, mint fenyvek által beárnyalt területen. A nap sugarait élvező kis csemeték részint azért zöldülnek korábban mint az ugyanazon helyen álló nagy fák, mert szívó gyökereik a talaj felső és hamarabb átmelegedő rétegében vannak főképen elterjedve stb.

Végre a talajhő emelkedése gyorsítja a talajban véghez menő elmállási és korhadási folyamatokat, a nitrogéntartalmu anyagokat gyűjtő szervezetek fejlődését, s így általában mindazon fiziológiai és vegyi folyamatokat, melyek által a nemesebb növények számára a talajban tápanyagok készülnek.

#### b) A talaj hőforrásai.

A föld kérgének állandó hőmérséke tudomás szerint a mélységgel növekedik; úgyhogy átlagosan körülbelül a mélység 30 méternyi növekedésére  $1^{\circ}\text{C}$  hőemelkedés esik. Ez kétségtelenné teszi, hogy földünk saját hővel is bír, s képes volna a talajnak és a légkör alsó rétegeinek is bizonyos hőmérsékletet kölcsönözni; de másfelől az is bizonyos, hogy ez oly csekély volna, mely a sarkok legalacsonyabb hőminimumán is sokkal, de sokkal alább maradna, úgyhogy amellettt élő szerves lények létezése lehetetlen



volna. Azon hőmérséket, melylyel a föld felső rétege birna, ha a naptól meleget nem kölcsönözne, csak  $0.03^{\circ}\text{C}$  fokkal teszik magasabbra, mint a világűr hőmérsékét, melyet, Pouillet 0 alatt  $-142^{\circ}\text{C}$ -ra tesz. Naplemente után vagy napfogyatkozásakor a hőmérsék gyors csökkenéséből is következtethetjük, hogy ha a nap sugarait a föld csak rövid ideig nem élvezné, minden állati és növényi életnek el kellene tűnni a föld kerekiségéről.

Földünk felső rétege tehát egy eltűnő csekélység híján a naptól kapja mindazon melegét, mely annak, a világűrben uralkodó rettenetesen alacsony hőfok fölött oly hőmérséket kölcsönöz, hogy azon a szerves élet lehetővé váljék.

De a nap sugarai által a talaj felületén ébresztett hőmennyiség a világűr felé való kisugárzás által folytonos apadást szenved, s a pillanatnyi hőmérsék csak e két, egymással ellentett hatásnak eredménye. Midőn a hőbevétel (a napsugarak hatása alatt) nagyobb a kiadásnál (a kisugárzás folytán) akkor a hő a talajban emelkedőben, ellenkező esetben apadóban van.

Minthogy nappal és éjjel, épúgy mint az év különböző szakiban, a föld felületének bizonyos része változtatja a naphoz való helyzetét, ennélfogva változik a hőfelvétel és kiadás közti viszony, változik a talaj hőmérséke is.

A fennebb röviden jelzett viszonyoknak bővebb tárgyalása a meteorológiába tartozván, itt csak rá akartunk mutatni a talaj legfőbb hőforrásaira, s különösen a benne előforduló és a növénytenyésztésre nézve legfontosabb hőváltozásoknak főokaira: a nap sugárzó melegének felvételére (insolatio) és a kisugárzásra. Azonban a talaj nemcsak közvetlen a napsugarakból veheti és veszi fel a meleget, hanem a légből is, mely neki azt árnyékban is átadni képes; hasonlóan a légköri csapadékok által is melyek abba beszívárogván, vele a lég felsőbb rétegeinek hőmérsékét is képesek közölni.

De létezik még más hőforrás is, melyről megemlékezni szükséges. Ez a talajban végbe menő vegyműködés, különösen pedig a növényi anyagok oxydálódása. Ez azonban a naphoz kapott meleghez képest felette csekély, s többnyire egészen eltűnő.

Hogy mégis mekkoraságáról némi fogalmat szerezzünk, egy kis számítás nem lesz fölösleges. Ebermeyer szerint\*) a bükkösök által átlagosan termelt

\*) Ebermeyer. Dr. Ernes. Die Lehre der Waldstreu, Berlin, 1876. 78. l.



erdei alomban van egy hektáron 1416 kilogr. szén. Vegyünk ehhez a fának évenként elhaló gyökereiért, a kivágott vagy elhaló fák tuskói és földben maradó gyökereiért még  $20\frac{0}{100}$ -ot, akkor kapunk kereken 1700 kilogr. szenet egy hektáron, mely évenként szénsavvá változik. A növényrostokban az oxigén és hidrogén oly arányban lévén, amily arányban a vizet képezik az elégségnél, ezek hőt nem fejtenek ki, s így a számításnál tekinteten kívül hagyjuk. 1700 kilogr. tiszta szén oxydálása megfelel 8000 hőegységgel számítva 13,600.000 hőegységnek. Feltéve, hogy ezen meleg csak az év melegebb felében fejlődik ki, mivel a hidegben a korhadás folyamata igen csekély, jut egy napra kereken 75000 hőegység hektáronként és 0.075 hőegység négyzetdeciméterenként.

Már most, ha valamely talaj tartalmaz köbdeciméterenként 0.700 kgr. kvarcshomokot, 0.500 kgr. agyagot (kaolin), 0.070 kgr. mészhomokot, illetve szénsavas meszt, 0.030 kgr. televényt és végre 0.200 kgr. vizet, akkor annak fajhője a térfogatra vonatkoztatva kereken 0.3-re számítható ki; azaz egy  $\text{dm}^3$  ily talaj felmelegítésére  $1^\circ \text{C}$ -ra 0.3 hőegység szükséges.

Az erdőben a fennebbi feltételek mellett elkorhadó anyagok  $1 \text{ dm}^2$ -re naponta csak 0.075 hőegységet adnak, amely képes volna a fennebb körül irt talajból  $1 \text{ köbdecimétert}$   $(0.075 : 0.3) = 0.25^\circ \text{C}$ -ra felmelegíteni. Más szavakkal az erdei alom és a földben elhaló gyökerek korhadása alig volna elegendő, a talajt az év melegebb hónapjaiban 10 cm. mélységig naponta egyszer  $\frac{1}{4}^\circ \text{C}$ -ra felmelegíteni.

Hogy ez épúgy a besugárzás által kapott, mint a kisugárzás által vesztett meleghez képest eltűnő és mellőzhető, az világos.

Dr. Friedr. Wagner\*) tudományos kísérletei kimutatták hogy a szervesanyagokkal, u. m. ganájjal, szalmával stb. való trágyázásnak sincs lényeges befolyása a talaj hőmérsékének emelésére, habár egyes esetekben, midőn a felbomlás erőteljes volt, a trágyázott és nem trágyázott talaj hőmérséke közötti különbség 1—2 fokot kitett, sőt utóbbit néha meg is haladta; a legtöbb esetben azonban csak tized, sőt század fokokat tett.  $+10$  fokon alóli hőmérséknél a trágyázás hőemelkedést nem okozott.

Legérezhetőbb volt a hőemelkedés a trágya alkalmazására következő napokon; azután folyton csökkent. A hatás erős trágyázásnál 4—12 hétig tartott, a hőemelkedés  $0.00$  és  $0.58^\circ$  közt változott, s átlaga  $0.1$  és  $0.4$  közé esett.

Ezek után a trágyázásnak sem lehet lényeges befolyást tulajdonítani a talaj hőmérsékének emelésére, annyival is kevésbbé, mert az emelkedés főként a legmelegebb napokban mutatkozik, mikor arra szükség épen nincs.

\*) Ueber den Einfluss der Düngung mit organischen Substanzen auf die Bodentemperatur. Wollny, Forschungen, V kötet, 373. és köv. lapokon.



Vége tudományos szempontból szóba jöhet még azon hő is, mely a talajban kifejlődik akkor, midőn az vizet, vízgőzt és légnemeket kondenzál. Nitrogén- és oxigénnel folyton telítve lévén a talaj az ezek elnyelése által a talajhőmérsékében csak a légnyomás emelkedésével jöhetne létre némi mindenesetre eltűnően csekély emelkedés és a légnyomás apadása folytán épakkora csökkenés. Ezen hőmérsék változások tudunkal megvizsgálva nincsenek; de bizonyára oly csekélyek, hogy itt teljesen elmellőzhetők. Tehát a légneműek közt még a vízgőz, szénsav és ammoniák elnyelése által okozott hőemelkedés jöhetne szóba. Minthogy szérsavat, amint e könyv más helyén láttuk, a talaj inkább kibocsát magából, mint elnyel a légkörből, az utóbbi által való hőemelkedésnek gyakorlati jelentősége nincs. Ép ezt állíthatjuk az ammoniáról is, melyet a talaj a légből, igen csekély mennyiségénél fogva csak kis mértékben nyelhet el, habár erre nézve elnyelő képessége igen nagy. A vízgőzt jelentékenyebb mennyiségben csak az oly teljesen kiszáradt talaj nyeli el amilyen a természetben nem is fordul elő; a légszáradt talaj ellenben csak igen keveset képes elnyelni a légkör vízgőztartalmának emelkedése folytán. Mindazonáltal, mivel erre is a vízre nézve adatokkal birunk, melyek egyszersmind az elnyelés erélyét (energiáját) is előtűntetik, közöljük azokat.

Legtöbb jelentősége van még az elnyelt víz, által okozott hőemelkedésnek, amennyiben ez a talajban gyakran ismétlődik.

Aug. Stellwaag kísérleteiből\*) kiemeljük a következőket. 10 fokú hőmérsék mellett emelkedett az előbb 105° C mellett kiszáritott talajanyagok hőmérséke esőppfolyó víz felvétele és kondenzálása által kvarcshomok 0 00—0 25 mm. 0 10° C-al, kvarcpor 0 23° C-al, kicsapott szénsavas mész 0 28° C-al, kaolin 0 83° C-al, vashydroxyd 6 60° C-al.

| Televényes mészhomok<br>talaj      | 10            | 20   | 30   |
|------------------------------------|---------------|------|------|
|                                    | fok C mellett |      |      |
| ha az vízmentes . . . . .          | 8 33          | 6 20 | 5 8  |
| légszáraz . . . . .                | 1 03          | 0 80 | 0 73 |
| nedves . . . . .                   | 0 68          | 0 45 | 0 55 |
| porrá dörzsölt agyag, ha vízmentes | 5 50          | 4 20 | 5 57 |
| légszáraz . . . . .                | 1 02          | 0 43 | 0 27 |
| nedves . . . . .                   | 0 65          | 0 32 | 0 13 |

Ezekből s más ide vágó kísérletekből vont következtések:

A hőemelkedés a víz kondenzációja folytán annál nagyobb, mennél inkább ki volt a talaj az előtt száritva, mennél finomabb az és mennél csekélyebb a külső hőmérsék. A hőemelkedés televénynél, vasnál és agyagnál, ha ezek tel-

\*) Aug. Stellwaag, Untersuchungen üb. die Temperaturerhöhung der verschied. Bodenconstituenten u. Bodenarten bei Condensation von flüssigen u. dampfförm. Wasser sowie von Gasen. Wollny, Forschungen V. köt. 210—227. l.



jesen kivannak száradva, a víz elnyelés által igen tetemes; a légszáradt talajnál azonban már meglehetősen csekély.

30 fokos hőmérsék mellett az ugyanily fokú vízgőz elnyelése fokozta a hőmérsékét:

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| kvarezhomoknál               | 0·88° C  |
| kvarezpornál                 | 1 08° „  |
| kicsapott szén-savas mésznél | 1·47° „  |
| kaolinnál                    | 2·63° „  |
| vashydroxydnál               | 9·30° „  |
| tőzegnél                     | 12·25° „ |

Mennél nagyobb volt a hőfok, melynél a kísérletek történtek, annál nagyobb volt a hőemelkedés;

|                          |               | 10            | 20   | 30    |
|--------------------------|---------------|---------------|------|-------|
|                          |               | fok C mellett |      |       |
| Telvevényes mészkőhomok: | vízmentes . . | 3·15          | 5 05 | 7 17  |
|                          | légszáraz . . | 1·00          | 1·71 | 2 10  |
| Tőzeg:                   | vízmentes . . | 5 25          | 8 25 | 12 25 |
|                          | légszáraz . . | 0 68          | 1·95 | 3 50  |
| Agyag, porrá dörzsölve:  | vízmentes . . | 2·45          | 4 90 | 7 90  |
|                          | légszáraz . . | 0 82          | 1·22 | 2 37  |

A hőmérsék emelkedése tehát a humusznál és a vashydroxydnál sokkal nagyobb, mint a többi talajanyagoknál, s ezen kívül a szerkezet is befolyással van, mert mennél finomabb a talaj, annál nagyobb a vízgőz kondenzációja és az ez által kifejlődő hőemelkedés.

Hasonló eredményekre jutott a kísérlettevő a szén-sav és az ammonia kondenzációját illetőleg is, de a száraz szén-sav elnyelése által kifejlődött meleg egészben véve sokkal kisebb, ellenben az ammoniával tett kísérleteknél sokkal nagyobb volt, mint a vízgőznél.

A többi vegyműködések a humuszképződés mögött többnyire messze hátra maradnak a melegképzésre nézt, s így még kevésbé érdekesek a tekintetbe való vételre.

### c) A hőmérséki változások lefolyása a talaj különböző mélységében.

Árnyékban a talaj felülete ugyanazon hőváltozásoknak van kitéve, mint a légnak vele érintkező, legalsó rétege; tehát a hőmérsék változásainak napi és évi lefolyása is megegyezik e két közegnek egymással érintkező rétegében. A hőszélsőségek közel egyenlők és majdnem ugyanazon időben állnak be.



A napnak kitett szabad téren ellenben a talaj felülete nappal annál erősebben felmelegszik, mennél merőlegesebben esnek rá a nap sugarai; s minthogy a talajnak hőelnyelőképessége hasonlíthatatlanul nagyobb, mint a levegőé, ennél fogva a talaj felülete utóbbinál sokkal inkább felmelegszik. Schübler\*) például a fekete kerti föld felületét legélénkebb napsütés alkalmával átlag  $26.7^{\circ}$  C-al találta melegebbnek, mint a levegőét árnyékban; sőt nyáron e különbség  $35$  fokra is felemelkedett; míg télen  $19$ , januárban  $16$  fokot tett. Tehát midőn a lég hőmérséke nyáron árnyékban nem haladja meg a  $20^{\circ}$  C-t, a talaj felszíné a  $40^{\circ}$  C-t is elérheti, sőt túl haladhatja. Mennyire képes a hőmérsék ily magas foka a talaj felső rétegét kiszáritani! Mily öldöklő ezen forróság és szárazság a kis, még alig megfásult első éves csemetékre nézt! Éjen át ellenben a talaj kisugárzás folytán több fokkal lejebb lehülhet, mint a csak  $1$  méterrel magasabbra fekvő légréteg, amely körülmény megint a tavaszi elkésett fagyok alkalmával, válhatik a növénykére nézt életveszélyessé. Ehez járul még az is, hogy a hó elmenetele után, de néha még a hó leesése előtt, a talaj felső rétegének nappalonként kiengedése és éjjelenként újra megfagyása folytán a kis növénykék a földből kiemeltetnek (kifagyás). A kis növényke tövét ugyanis, hol az a föld színével érintkezik, a fagyos földréteg megragadja. Ha most a talaj vizéből a jégkéreg alsó lapjára újabb jégoszlopok fagynak, ezek amaszt feltolják a kis növénykével együtt, melynek gyökere a feltolásnak megfelelően a földből kivonatik. Nappal a kiengedett talaj, elvesztvén jégoszlopocskákból álló támaszát, vissza ülepedik előbbi helyzetébe, de a gyökeret nem viszi magával, s a növényke kiemelve marad. Ha e kiemelés naponta  $1-2$  millimétert is tesz, végre annyira kihúzódik a földből a kis csemete, hogy eldől és kiszárad. Ugyanez történik az őszi gabonavetésnél is.

Fennebbiekből kitűnik az u. n. anyaálab és a védő növényzet fontossága az apró és gyöngéd facsemetékre nézve.

Azon hő, melyet a talaj felülete a naptól és a légkörtől kapott, a talaj részecskék között végbemenő hőközlés folytán jut mélyebb rétegekbe; de míg egy felől e folyamatnak időre van

\*) Heyer, Bodenkunde, 220.



szüksége, más felől gyengülve, elmosódva érkeznek a hőmaximumok az alsóbb rétegekbe.

A talaj kihülése, a felület kisugárzása és a léggel való hőközlés folytán, a felületen kezdődik meg. A kihült felülettel az alatta lévő melegebb réteg közli hőjét, utóbbi ez által hőt veszítvén, a még alább fekvőtől vesz fel e helyett újat, hogy a felsőrétegnek megint átadván, ez azt is kisugározza, — s így tovább terjed a kihülés felülről lefelé. Ennél fogva a lehült felület csekélyebb hőmérséke is, (vagyis a hideg), éppannyi idő alatt jut bizonyos mélységig, mint a magasabb hőmérsék, (vagyis meleg), s emellett a felületen beállt kihülés is gyengülve érkezik oda. Ennek folytán a napi hullámzások mértéke (maximum és minimum közti különbség) annál kisebb, mennél mélyebben fekszik azon talajréteg, melynek hőmérsékéről van szó. Lamont észleletei szerint a hőmérséki maximumok és minimumok a felülettől 1 párizsiláb = 32 cm. mélységre átlag  $7\frac{1}{2}$ — $9\frac{1}{2}$  óra, Quetelet szerint 9—10 óra alatt érkeznek meg. A mi tájainkon a hőmérsék napi hullámzásának mérve fokokban kifejezve a lég alsó rétegében árnyékban 10-szer, napon 13-szorta nagyobb, mint 32 cm. mélységben; 65 cm. mélységben már nagyon csekély és 1 méternél már elenyésző.

A felületi hőmérséknek ezen lassu terjedése kívülről befelé, valamint annak e közben való gyengülése és módosulása a talajnak az előtt nyert hőmérséke által, eredményezi azt, hogy a hőmérsék változásainak lefolyása a légben és a talaj különböző mélységében egymástól jelentékenyen eltér. Ennek következtében a hőmérsék évi maximuma és minimuma is valamivel későbbre áll be a talaj alsóbb rétegeiben és az előbbiek közt való különbség sokkal kisebb, mint a felsőbb rétegekben, illetve a felületen.

Az itt mondottakra szolgáljon például a Dr. Ebermayer „Die physikalischen Einwirkungen des Waldes, Aschaffenburg, 1873.“ cz. munkájából vett és 5 évi észlelésre alapított következő táblázat:



Hőmérsék ( $^{\circ}\text{C}$ ) a talaj különböző mélységeiben az egyes hónapokban\*).

| Mélység<br>cm.          | Márczius | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szeptem. | Október | Novemb. | Deczemb. | Január | Február |
|-------------------------|----------|---------|-------|--------|--------|----------|----------|---------|---------|----------|--------|---------|
| A s z a b a d m e z ő n |          |         |       |        |        |          |          |         |         |          |        |         |
| 1                       | 3.2      | 6.4     | 17.8  | 18.8   | 19.0   | 18.4     | 14.8     | 9.0     | 1.2     | 2.9      | —1.3   | 3.7     |
| 16                      | 2.4      | 5.9     | 15.5  | 17.2   | 17.9   | 17.6     | 15.1     | 9.4     | 1.8     | 2.4      | —0.4   | 2.0     |
| 32                      | 2.7      | 5.6     | 14.6  | 17.2   | 17.6   | 17.7     | 15.4     | 10.1    | 3.7     | 2.9      | —0.6   | 1.8     |
| 65                      | 3.1      | 5.5     | 12.6  | 16.0   | 16.6   | 17.4     | 15.3     | 10.1    | 5.0     | 3.8      | —2.3   | 2.2     |
| 97                      | 3.6      | 4.9     | 10.8  | 14.6   | 15.5   | 16.5     | 13.6     | 12.0    | 6.4     | 4.6      | —3.3   | 2.6     |
| 139                     | 3.5      | 4.8     | 9.5   | 13.5   | 14.6   | 15.8     | 14.5     | 12.4    | 7.0     | 5.4      | —4.1   | 3.2     |
| A z e r d ő b e n       |          |         |       |        |        |          |          |         |         |          |        |         |
| 1                       | 1.8      | 4.7     | 13.1  | 14.1   | 15.0   | 15.0     | 13.1     | 8.0     | 1.5     | 2.7      | —1.1   | 2.7     |
| 16                      | 1.7      | 4.1     | 11.5  | 13.3   | 14.1   | 14.4     | 12.5     | 8.4     | 2.1     | 2.5      | —0.0   | 1.6     |
| 32                      | 2.0      | 4.0     | 10.4  | 12.6   | 13.4   | 14.1     | 12.4     | 9.1     | 3.3     | 3.1      | —1.2   | 1.6     |
| 65                      | 2.5      | 3.9     | 8.6   | 11.4   | 12.3   | 13.4     | 12.1     | 9.8     | 5.1     | 3.8      | —2.6   | 2.1     |
| 97                      | 2.7      | 3.7     | 7.3   | 10.4   | 11.3   | 12.6     | 12.7     | 10.1    | 6.1     | 4.4      | —3.4   | 2.5     |
| 130                     | 3.0      | 3.8     | 6.6   | 9.5    | 10.6   | 11.9     | 11.5     | 10.1    | 6.9     | 4.9      | —4.1   | 3.0     |

Sokkal világosabb fogalmat nyerünk e hőmérséki változások lefolyásáról, ha egy vízszintes vonalra 12 függélyest állítunk egymástól egyenlő távolságban; azokat rendre az egymásután következő hónapok neveivel megjelöljük, s rájuk tetszés szerinti mérővesszővel felrakjuk az egyes hónapoknak megfelelő közép hőmérségeket, először a felületre vonatkozólag, azután pedig az egyes mélységekre nézve. Az egyenlő magasságokra vonatkozó pontokat egyenes vonalakkal összekötve, törtvonalakat kapunk,

\*) Az Ebermayer-féle táblázatokban a talajmélység párizsi lábokban van adva, s így jelölve: felület,  $\frac{1}{2}'$ ,  $1'$ ,  $2'$ ,  $3'$ ,  $4'$ . Mi a felületet 1 cm-rel jelöltük, mert a thermometer golyója tényleg be volt sülyeszítve, hogy minden oldalról a talajjal érintkezze. 1 párizsi lábat 0.3248 méternek vettünk. Az eredetileg R fokban kifejezett hőmérségeket is C fokra számítottuk át.



melyek a hőmérsék évi menetét rajzban állítják szemünk elé. Ezen képből meggyőződhetünk, hogy a felületnek megfelelő vonal kihajlásai mind felfelé (nyáron), mind lefelé (téli) a legnagyobbak, ellenben a 130 cm. mélységnek megfelelő a legcsekélyebb hullámhegyet és hullámvölgyet alkot; továbbá, hogy mindannyi vonal évenként kétszer, s majdnem egy pontban kereszteződik, azaz a talaj hőmérséke egyfelől márczius vége és ápril eleje táján, másfelől szeptember végén és október elején minden mélységben közel egyenlő; s végre, hogy ezen két csomópont közé eső nyári (és szomszédos) hónapokban a talaj felsőbb rétegei melegebbek az alsóbbaknál; ellenben a két csomópont közé eső téli (és szomszédos) hónapokban megint az alsóbb rétegek melegebbek mint a felsőbbek.

Még ki kell emelnünk azt is, hogy az évi átlagos hőmérsék 65 cm. mélységben közel egyenlő a talaj azon átlagos hőmérsékével, melyet minden rétegnek össze vetése által számítunk ki, a felülettől 130 cm. mélységig. A földművelésre és az erdőtenyésztésre nézve jelentőséggel bír még az is, hogy tavasszal a felsőbb rétegek hamarabb megmelegszenek mint az alsóbbak, ellenben ősszel az utóbbiak melegebbek; a miből kimagyarázható, hogy a tenyészet a talaj felső rétegében gyökerező növényeknél, apró csemetéknél, hamarabb felébred, mint a nagy fáknál; ellenben ősszel ez utóbbiaknak gyökerei tovább tartják meg tevékenységüket.

#### d) A talaj felmelegedését és kihűlését módosító körülmények.

##### a) A hely klimai sajátosságai és kitettsége.

A meteorologia tanítja, hogy a lég és talaj átlagos hőmérsékére, valamint a hőváltozások lefolyására továbbá a hőingadozásokra és szélsőségekre stb. a geográfiai fekvés, különösen az egyenlítőtől és a tengerektől való távolság, ezen kívül a tengeráramok, belföldi vízterületek, a hely tenger feletti magassága, kitettsége (expositio) s még más helyi körülmények nagy befolyással vannak. Ezen befolyások tárgyalása az említett tudomány keretébe esvén, itt azok fejtegetését mellőzve, csak némely fontosabb adat megemlítésére szorítkozunk.



A geográfiai fekvésre nézve csak azt jegyezzük meg, hogy az északi szélesség 40 és 50-ik fokai közt, az egyenlítő felé 1 szélességi fokkal való közeledés megfelel D o w e szerint  $0.96^{\circ}$  C emelkedésnek az évi középhőmérsékben. Hazánkban egészben véve ez a hőemelkedés 1 szélességi fokra kissé soknak látszik.

A tenger feletti magasságnak azon emelkedése, mely bizonyos hőmérséki csökkenésnek megfelel, már a hegységek tömegességével és az illető helyek fekvésével is nagyon változik; mindazonáltal jó lesz némely erre vonatkozó adattal megismerkedni.

Műhry a közép Európában a lég évi középhőmérséke  $1^{\circ}$  C apadásának megfelelő tenger feletti emelkedést 164 méterre teszi; míg ujabban Dr. J. van Bebb er ezt átlag 200 méternek veszi.

Egyenesen a talaj hőmérsékének a magasság emelkedésével való csökkenésére nézt is tétettek észleletek, ámbár csekély számban. Így pl. Reich az Erzgebirgeben 179 m. B i s c h o f B a i n-nél 181 m. S c h l a g i n t w e i t az Alpokban 171 m. emelkedésre kapott  $1^{\circ}$  C csökkenést.\*) Ezen kívül érdekes, hogy völgyekben és tömeges hegységekben a hőmérsék apadása az emelkedéssel csekélyebb volt, mint szabadon álló csúcsoknál.

A Dr. Ebermayer észleleteiből kitűnik, hogy a talaj közép hőmérséke 162—197 m. emelkedéssel csökkent  $1^{\circ}$  C-al.

Hogy fogalmunk legyen arról, miszerint egy és ugyanazon hegységben is mennyire ingadozik e szám, lássuk Wessely Józsefnek a Stajer Alpokban a lég hőmérsékére nézve gyűjtött adatait.\*\*)

Szerinte ott a következő magasságokra kell hágni (méterekben), hogy az évi közép hőmérsékben  $1^{\circ}$  C csökkenést tapasztaljunk:

|                    |                   |      |
|--------------------|-------------------|------|
| Keleti lejtőn . .  | 113—252 átlagosan | 126  |
| Északi lejtőn . .  | 101—303           | 156  |
| Nyugati lejtőn . . | 126—329           | 159  |
| Déli lejtőn . .    | 106—367           | 177. |

Már innen is látjuk a kitettségnek (expositio) befolyását, mert a déli oldalon jóval magasabbra kell emelkedni, hogy

\*) Lehrbuch der Klimatologie v. Dr. Lorenz und Dr. Rothe Wien 1874. Az illető adatok R fokról C fokra és lábról méterre vannak átszámítva.

\*\*) Die steierischen Alpenländer und ihre Forste, Wien 1853.



1<sup>o</sup> hóapadást elérjünk, mint az északon; a nyugatin magasabbra, mint a keletin.

Lamont\*) a Bajor Alpokban észleleteket gyűjtött az iránt, hogy mily befolyással van az egyes égtájak felé való fekvés és azon hegységre nézve következő középszámokat talált.

A különböző égtájaknak való kitettség emeli (+) vagy csökkenti (—) a különben azon helynek megfelelő évi közép hőmérsékét;

|     |        |           |      |        |           |
|-----|--------|-----------|------|--------|-----------|
| É   | — 0.60 | C fokkal. | D    | + 0.55 | C fokkal. |
| É K | — 0.64 | " "       | D Ny | + 0.63 | " "       |
| K   | — 0.30 | " "       | Ny   | + 0.38 | " "       |
| D K | + 0.08 | " "       | É Ny | — 0.15 | " "       |

Érdekes eredményekre vezettek Kerner észleletei,\*\*) melyeket 1867., 1868. és 1869-ben Innsbruck közelében egy homokdombnak minden égtáj felé hajló oldalain tett. Ő itt ugyanis a megfagyás meggátlása végett borszesszel kevert vízzel töltött üvegeket sülyesztett 80 cm. mélyre a talajba és a víz hőmérsékét minden hónap 15-ikén megmérte. Az eredmény következő volt:

|                             | É.    | É K.  | K.    | D K.  | D.    | D Ny. | Ny.   | É Ny. |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Évi közép hőmérs.           | 9.42  | 10.55 | 11.25 | 12.65 | 12.66 | 12.71 | 12.17 | 10.17 |
| Átlag . . . . .             | 11.45 |       |       |       |       |       |       |       |
|                             | É.    | É K.  | K.    | D K.  | D.    | D Ny. | Ny.   | É Ny. |
| Eltérés átlagtól            | —2.0  | —0.9  | —0.2  | +1.2  | +1.2  | +1.3  | +0.7  | —1.3  |
| Átlagos évi kitérés . . . . | 13.5  | 14.5  | 17.1  | 17.2  | 16.5  | 13.9  | 15.5  | 13.5  |

Ezen kísérletek kiderítették, hogy a talaj hőmérséke májustól augusztusig a délkeleti oldalon, szeptemberben és októberben a déli oldalon, novembertől áprilisig pedig a délnyugati oldalon legnagyobb, s így a talaj hőmérsékének a kitettségekre vonatkozó maximuma májustól áprilisig délkelettől délnyugatra költözik és májusban megint délkeleten jelenik meg.

A kitérések, vagyis a szélsőségek legnagyobbak a keleti, délkeleti és déli oldalon, legkisebbek az északi és szomszédos oldalakon.

\* Annalen der k. Sternwarte in München. III. P. CLXXIV.

\*\*\*) Kerner, Ueber Wanderungen des Maximums der Bodentemperatur. Zeitschr der Österr. Gesellschaft für Meteorologie. Bd. VI. No. 5. 1871. pag. 65.



Azonban a lejtő hajlásának foka is jelentékeny befolyással van; mert ugyanazon kitettség mellett azon talaj vesz fel legtöbb meleget a naptól, melynek sikkja leginkább megközelíti a merőleges állást a beeső napsugarak átlagos irányára.

Dr. C. Eser azon melegösszeget véve egységül, melyet a merőlegesen ráeső napsugarak egy sikkal egy órai napsütés alatt közölnek, kiszámította, hogy a különböző égtájaknak és különböző hajlásu szög alatt kitett területek, az év egyes hónapjaiban mennyi meleget kapnak.\*)

Nem szenved kétséget, hogy a talaj felmelegedése első sorban e besugárzás nagyságától függ. De ezen kívül más tényezők is vannak befolyással. Így különösen az athmosphära állapota s a légrétegek tömörsége és víztartalma, melyeken a sugaraknak keresztül kell hatolniuk. Így a reggeli és esteli napfény hatása sokkal csekélyebb, mint a délié, ha ugyanazon szög alatt találja is a területet. Egy nagyon meredek keleti oldal tehát nem melegedhetik fel reggel annyira, mint egy déli lejtő délben, ha a napsugarak mindkettőt ugyanazon fok alatt találják is. A hajlás foka továbbá befolyással van a talaj nedvességére, s ez által közvetve annak felmelegedésére is; mert a talaj felületén. annál több vizet párologtat el, mennél nedvesebb. Továbbá az uralkodó légáramok is módosíthatják a napsugarak befolyását. A légáramoknak inkább kitett oldalak felmelegedése csekélyebb.

Wollny földdel töltött deszka ládákából pyramisokat állított össze, melyeknek az ég négy főtája felé eső és a vízszintes sikkra 15 és 30 foku lejtéssel hajló oldalai bőven 1 m<sup>2</sup> területtel bírtak.

A kísérleteiből levont következtetésekből kiemeljük a következőket.\*\*)

Legmelegebbnek találtatott a déli, leghidegebbnek az északi oldal; míg a keleti és nyugati e tekintetben az előbbiek közé esik. A déli oldal annál melegebb, az északi annál hidegebb, mennél nagyobb annak lejtése.

Az inzulációból megmagyarázható, hogy a keleti oldal hőmérséke is emelkedett a lejtés fokával; de anomáliának látszik,

\*) Wollny, Forschungen, VII. kötet, 100. és köv. lapok.

\*\*) Wollny, Forschungen, X. kötet. 8. és köv., különösen 49. és 50. l



hogy a nyugati annál hidegebb volt, mennél nagyobb volt annak hajlási szöge. Ezt Wollny hajlandó az ott (Münchenben) uralkodó nyugati szelek hatásának tulajdonítani.

A különbség a déli és északi lejtő hőmérséke közt annál nagyobb, mennél meredekebbek azok. A különbség természetesen legnagyobb akkor, mikor a napi maximum beáll; legkisebb a napi minimum alkalmával. A keleti és nyugati oldalak közt legnagyobb a különbség délelőtt és délután; még pedig előbbi esetben a keleti, utóbbiban a nyugati kitettség javára. A hőmérsék szélsőségei legnagyobbak a déli kitettség mellett, s innen mind két irányban csökkennek, míg az északi oldalon a legkisebb tételt érik el. A hajlásszög fokának nagyobbodása a déli oldalon a szélsőségeket emeli, az északon ellenben csökkenti. A keleti és nyugati oldalakon a hajlásszög kisebb befolyással van a szélsőségek alakulására.

### β) A talaj takarója.

A talaj takaróját képezhetik főképen elhalt növényi anyagok, élő növényzet és hó.

Az elhalt növényi anyagokból, milyen az elszáradott fű, száraz haraszt, lehullott lomb, s mind az, amit az erdész erdei alomnak nevez, — az ezekből álló talajtakaró igen rossz hővezető lévén, a talajnak mind felmelegedését, mind kihűlését akadályozza, s így annak hőmérséki ingadozásait csökkenti, a szélsőségek élet elveszi. Ezért szokták ily anyagokkal fedni télre a gyöngéd növényeket; de ez esetben a kipállás, megpenészedés elhárításáról is gondoskodni szükséges.

Hasonló hatása van minden tömött, élő növényzetnek; de e mellé csatlakozik még azon hűtő hatás is, amelyet az élő növények által a tenyészeti évad alatt annál nagyobb mértékben eszközölt elpárologtatás okoz, mennél nagyobb a hőmérsék. Mert míg a talajnak kiszáradt lombtakarója, vagy száraz felső rétege az abban foglalt víznek elpárologtatását akadályozza; addig a növény leveleinek párologtató felületét a szár és gyökerek a talaj belsejével hozzák összeköttetésbe, honnan az folyton vizet szív fel. Igaz, hogy a levelek a víz elpárologtatása által veszített hőt a levegő hőmérsékéből pótolják, nem a talajéból; de ennek, s még inkább a növények általi beárnyalásnak a talaj felületére jelentékeny hűtő hatást kell tavasszal és nyáron tulajdonitnunk. Tudva



van, hogy a gabona, s még inkább a gyeppel, a talaj nyáron hűvösebb marad; télen ellenben utóbbi alatt melegét sokkal jobban megőrzi, mint akkor, ha a takarót nélkülözi.

Becquerel\*) 1876/77-ben végzett észleletei szerint a reggel 6 órakor a talaj 5 cm. mélységében tett hőmérsék-észlelések átlaga minden hónapban magasabb volt a gyeptakaró alatt, mint a kopasz talajban. A különbség kitett szeptemberben  $3.80^{\circ}$  s ettől februárig lesülyedt 1 fokra, évi átlagban volt  $2.14^{\circ}$ . Ellenben a délután 3-kor tett észleleteknél, 5 cm. mélységben februártól októberig, s kiváltképen nyáron a gyeppel fedett talaj hűvösebb volt, mint a kopasz, s a különbség  $0.2$  és  $3.42^{\circ}$  közt változott; novembertől februárig pedig, azaz télen, a kopasz talaj  $0.28$ – $0.47$  fokkal jobban kihűlt, mint a gyeppel fedett.

Ugyancsak E. és H. Becquerel\*\*) az 1879/80. év telén, midőn a fagy Párizsban november 26-án állott be és a hideg december 3-án  $-11$  fokra, december 10-én  $-20$  fokra szállott, azt találták, hogy a gyepes talaj temperaturája 5 cm. mélységen alól egész télen át 0 fokon valamivel felül maradt, ellenben a kopasz talajé 5 cm. mélységben már november 27-én fagypontra alá szállott, november 29-én  $-2.65$  fokot ért el, s amint a hó leesett megint emelkedett a hőmérséke s így t.

Leghatalmasabb befolyást gyakorol azonban a talaj felülete hőviszonyaira az erdő, melynek mennyezete a nap hevét felfogja és a talaj éjjeli és téli kisugárzását akadályozza; e mellett dús lombhullatásával magának alomtakarót teremt, sőt gyéresebb vagy tömöttebb cserje, fű, zöle és mohatakaró keletkezését is megengedi.

Kevés észlelet meggyőzhet nyáron át arról, hogy a napsütötte talaj felületének hőmérséke 20 s több fokkal magasabb lehet, mint az erdőtől beárnyalt talajé. Hasonlóan éjjel át, a szabad kisugárzás folytán is mélyebbre száll a kopár talaj felszínének temperaturája.

Fennebb már hangsúlyoztuk a védetlen talaj nagy hőszelőségeinek káros voltát a gyöngye magcsemetékre, s minden más

\*) Comptes rendus, LXXXVI. kötet, No. 20. pag. 1222—1227. kivonatban Wollny, Forschungen, II. pag. 163—164.

\*\*) Comptes rendus, LXXXIX. kötet, pag. 1101.



gyöngéd növénykére; valamint az erdőmennyezet által előbbieknél nyújtott védelem fontosságát is.

De nemcsak a napsugaraknak és kisugárzásnak közvetlen kitett felületen, hanem alább is, ahova a hőmérséki ingadozások csak a talajrészecskék közötti kölcsönös hőközlés által juthatnak, érezhető befolyást gyakorol az erdő; amit Dr. Ebermayer észleletei\*) számokban is kimutatnak. Az általa vezetett, 5 éven át 6 páros állomáson tett pontos észleletek eredményeiből nem mulaszthatjuk el kiemelni a következőket.

Az erdő befolyását a talaj évi közép hőmérsékére C fokokban mutatja a következő táblázat:

|                    | Talaj mélység, centiméter |     |     |     |     |     | Átlag |
|--------------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
|                    | 1                         | 16  | 32  | 65  | 97  | 130 |       |
| Szabadban . . . .  | 9·2                       | 9·0 | 9·2 | 9·4 | 9·2 | 9·1 | 9·2   |
| Erdőben . . . . .  | 7·6                       | 7·2 | 7·3 | 7·3 | 7·2 | 7·2 | 7·3   |
| Különbözet . . . . | 1·6                       | 1·8 | 1·9 | 2·1 | 2·0 | 1·9 | 1·9   |

A talaj középhőmérséke tehát az erdőben minden mélységben kisebb mint a szabad területen és a különbséget nagy átlagban, minden réteget egybevetve, 1·90° C-ra tehetjük. Ennek oka főképp a napsütés hiányában keresendő, ami a talaj felmelegedésének legfőbb forrása. Igaz, hogy a szabad térnek kisugárzás általi hővesztesége is nagyobb, mint az erdő talajáé; de hogy a kisugárzás által nem vesz a talaj annyi hőt, amennyit a naptól nyer, azt mutatja a talajnak aránylag oly magas középhőmérséke a világűr felett.

Az erdő befolyását a talajnak átlagos hőmérsékére az egyes évszakokban, mutatja a következő lap elején lévő tábla, hol sz = szabad, e = erdő, k = különbség; a számok C fokot jelentenek.

E táblázatból kitűnik, hogy tavasszal az erdőtalaj, különösen felsőbb rétegeiben, jóval hidegebb, mint az erdőtlen; ami az erdő mennyezete alatt megtelepedett apró csemetéknek előnyére van; mert a korai kihajtást megakadályozván, megmenti azokat az elkésett fagyoktól. A talaj tavasszal átlag 2·0° C-al hidegebb, mint a szabad téren.

\*) Dr. E. Ebermayer. Die physikal. Einwirkungen des Waldes auf Luft u. Boden. Berlin. 1873. Hempel és Parey.



|         | 1 cm. |      |     | 16 cm. |      |     | 32 cm. |      |        |
|---------|-------|------|-----|--------|------|-----|--------|------|--------|
|         | sz.   | e.   | k.  | sz.    | e.   | k.  | sz.    | e.   | k.     |
| Tavaszi | 9.1   | 6.6  | 2.5 | 7.9    | 5.8  | 2.1 | 7.5    | 5.5  | 2.0    |
| Nyári   | 16.3  | 14.9 | 1.4 | 17.5   | 13.9 | 3.6 | 17.5   | 13.4 | 4.1    |
| Őszi    | 8.9   | 7.6  | 1.3 | 8.8    | 7.7  | 1.1 | 9.5    | 8.3  | 1.2    |
| Téli    | 1.8   | 1.7  | 0.1 | 1.5    | 1.5  | 0.0 | 2.0    | 2.1  | (−0.1) |

|         | 65 cm. |      |        | 97 cm. |      |     | 130 cm. |      |     |
|---------|--------|------|--------|--------|------|-----|---------|------|-----|
|         | sz.    | e.   | k.     | sz.    | e.   | k.  | sz.     | e.   | k.  |
| Tavaszi | 7.0    | 5.0  | 2.0    | 6.3    | 4.6  | 1.7 | 6.0     | 4.5  | 1.5 |
| Nyári   | 16.7   | 12.4 | 4.3    | 15.6   | 11.5 | 4.1 | 14.6    | 10.7 | 3.9 |
| Őszi    | 10.6   | 9.0  | 1.6    | 11.2   | 9.3  | 1.9 | 11.5    | 9.5  | 2.0 |
| Téli    | 2.9    | 3.0  | (−0.1) | 3.6    | 3.5  | 0.1 | 4.3     | 4.1  | 0.2 |

Nyáron legnagyobb a különbség az erdő és a szabad tér talajának hőmérséke közt, mert ez átlagosan, minden réteget egybevetve 4.0<sup>o</sup> C-t teszen.

Ősszel is csekélyebb a talaj hőmérséke erdőben mint szabadban; de a különbség kisebb, mint a két előbbi évszakban és átlagosan 1.5<sup>o</sup> C-t teszen. E mellett a különbség épen a felső talajrétegekben kisebb, legkisebb 16 cm. mélységben (1.16<sup>o</sup> C), legnagyobb 130 cm. mélységben (2<sup>o</sup> C.)

A talaj melegebb volt ősszel mint tavasszal:

16 32 65 97 130 centiméter mélységben  
szabadban 0.9 2.0 3.6 4.8 5.6  
erdőben 1.9 2.8 4.0 4.8 5.1 C fokkal.

Télen erdőben és szabadban majd ugyanazon hőmérséke volt a talajnak, s így az erdő befolyása télen sokkal csekélyebb mint nyáron.

Az összes rétegeket, a felülettől 130 cm. mélységig egybevetve, hidegebb volt az erdőtalaj a szabadter talajánál:

tavaszon, nyáron, őszén, télen  
C 1.99 4.01 1.52 0.02

A erdő a napi hőingadozásokat és azok behatolását a talaj mélyébe, jelentékenyen csökkenti; s e hatása a meleg hónapok-



ban sokkal nagyobb, mint a télieken. Az erdőn a napi ingadozások már 65 cm. mélységben megszűntek, sőt a napi szélsőségek közti különbség, vagyis a kitérés 32 cm. mélységben is csak  $\frac{1}{10}$  fokot ért el. Legnagyobb volt a kitérésbeli különbség az erdővel fedett és a szabad talaj között májusban, midőn az a felületen 2·6, ... 16 cm. mélységben 3·1 fokkal volt kisebb az erdőben, mint a szabad téren; legcsekélyebb volt ez a különbség decemberben, a felületen 1·1, ... 16 cm. mélységben 0·2° C. Nem kell feledni, hogy az észleletek a felületen is földbe takart termométerrel történtek.

Az évi hőmaximumot is jelentékenyen csökkenti az erdő: mert az erdőn kisebb volt, mint a szabad tér talajában:

a felületen 16 32 65 97 130 cm. mélys.

7·19 5·90 4·48 4·74 4·06 3·84° C-al

ami a nedvesség fenntartására és általában az erdei növényzetre nyáron kedvezőnek mondható.

A téli fagy mind az erdős, mind az erdőtlen területen 32 cm. mélyre hatolt be az állomásokon, kivéve az 594 méter magasan fekvő Seeshauptot, hol az 65 cm. mélyre terjedett; ellenben a hideg csekélyebb volt az erdős talajon.

Az évi hőminimumok csekélyebbek voltak az erdőn mint a szabad tér talajában:

a felületen 16 32 65 97 130 cm. mélys.

2·60 1·40 1·06 0·31 0·23 (—0·04) fokkal.

Minthogy az erdő az évi hőszélsőségeket csökkenti, ennél fogva kisebbíti az ezen szélsőségek közti különbséget, t. i. az évi kitéréseket is.

Ezek tettek átlagosan

felületen 16 32 65 97 130 cm. mélys.

szabadban 39·6 30·0 23·6 19·0 16·0 13·9° C

erdőben 29·8 22·7 18·1 14·2 11·7 10·1° C.

Dr. Ebermayer észleleteinek fennebbi eredményeit egészben véve megerősítik a Württembergben később tett észleletek, melyeket Nördlinger állított össze.\*)

A hótakaró, mint általában ismeretes, annál inkább megakadályoztatja a nagy hidegek behatolását a talajba, mennél vas-

\*) Th. Nördlinger, Der Einfluss des Waldes auf die Luft- u. Bodentemperatur. Berlin, 1885. Paul Parey.



tagabb az; és a gyöngéd növényzetnek védelmére télen nincs nagyobb jótétemény a rossz hővezető hótakarónál; de a meleget sem engedi a talaj felületén 0 foknál lényegesen fennebb emelkedni, ha még oly csekély rétegben is fedi a talajt; mert a nap-sugarak által keltett összes meleg annak felolvasztására fordíttatik. Ha meggondoljuk, hogy 1 kilogramm jég elolvasztására annyi meleg szükséges, mint 79 kilogramm víznek vagy 200–400 kilogramm közönséges de nedvességgel nem bíró földnek 0 fokról  $1^{\circ}$  C-ra való emelésére: beláthatjuk, mennyire késlelteti a hó a talaj felmelegedését tavasszal.

Ez az oka annak, hogy oly későn ébred a tenyészet ott, ahol a hosszú tél alatt sok hó rakódik le, s későn olvad el; — hogy a sok hó a növényzet felébredését késleltetvén, igen gyakran elhárítja erről az elkéssett fagyok káros hatását.

Hogy mennyire védelmezi a hó a talajt télen a hideg szélsőségeitől, mutatják a Dr. Ebermayer által Aschaffenburgban 1871. december 12. tett észleletek, midőn a hőmérsék éjjel leszált,  $26.4^{\circ}$  C-ra; a lég hőmérséke volt reggel 9 órakor  $-11.2$ ; a talajé pedig annak felületén (a hó alatt)  $-1.3$ , 32 cm. mélyen  $-0.8$  és 130 cm. mélyen  $+5.9^{\circ}$  C.

E. és H. Becquerelnek fennebb már idézett észleletei alkalmával a november 26-án beállott hidegre, egy nappal később a kopasz talaj hőmérséke 5 cm. mélységben  $-2.65$  fokra szált le, s amint kevés hó esett, a talaj mélyéből hőközlés után nyert meleg által 0 fokig emelkedett; azután a léghőmérséknek folytonos süllyedése miatt megint leszállott  $-3.17$  fokra; december 3-án 25 cm. vastag hó esett, melynek eredménye volt, hogy a nevezett talaj hőmérséke újból emelkedett, s habár azután a lég hőmérséke  $-11$  fokról  $-28$  fokra süllyedt alá, a hótakaró védelme alatt a talaj temperaturája mégis csak  $-0.8$  és  $-1.4^{\circ}$  között maradt.

#### γ) A talaj fajhője, vagyis hőkapácsolása.

Hőegység alatt értjük azon hőmennyiséget, mely 1 liter 0 fokú vizet  $1^{\circ}$  C-ra felmelegíteni képes. Fajhő vagy hőkapácsolás alatt értjük azon, hőegységben kifejezett hőmennyiséget, amely valamely test 1 kilogrammját 0 fokról  $1^{\circ}$  C-ra melegíteni képes. Így tehát a víz hőkapácsolása = 1.



A talaj és azt alkotó anyagok fajhőjének meghatározásán sokan fáradoztak.\*) Ezek közül C. Lang találta a kvarczhomok fajhőjét 0·19, a márványporét 0·21, a kaolinét 0·23, a humuszét 0·48, Pfandler szerint a tőzegé, melyben a növényrostok még jól felismerhetők 0·53. Ezen adatokból már ki lehet számítani, az ily anyagokból összetett talaj fajhőjét is, a súlyegységre vonatkoztatva; ha a súly szerinti összetétel arányát ismerjük. Pl. ha tudjuk, hogy valamely talajban van 60 % kvarczhomok, 25 % agyag, 5 % mész, 6 % humusz és 4 % higroszkópos víz, akkor annak fajhője lesz:  $[60 \times 0\cdot19 + 25 \times 0\cdot23 + 5 \times 0\cdot21 + 4 \times 0\cdot48] : 100 = 0\cdot25$ .

Minthogy a talajt alkotó, itt fel nem sorolt ásványi anyagok fajhője is közel áll a kvarczéhoz és kaolinéhoz, általában fajhője közel 0·2-re, azaz a vízének  $\frac{1}{5}$  részére tehető és ennek  $\frac{1}{4}$  részét igen ritkán éri el. A humusz fajhője ellenben közel 0·5, tehát 2—2 $\frac{1}{2}$ -szer annyi, mint az ásványi talajé, azért a talaj fajhőjét mennyiségéhez képest fokozza. Még inkább teszi ezt a víz. Ha pl. felvesszük, hogy azon talaj, melynek fajhőjét légszáraz állapotban fennebbi példa szerint 0·25-re számítottuk, kilogrammonként még 200 gramm vizet foglal likacsai között, akkor fajhője lesz:  $[60 \times 0\cdot19 + 25 \times 0\cdot23 + 5 \times 0\cdot21 + 6 \times 0\cdot48 + 24 \times 1] : 120 = 0\cdot38$ .

A fizikából tudjuk, hogy ugyanazon hőmennyiség annál inkább képes a testeket felmelegíteni, mennél kisebb azoknak fajhőjük és viszont. Azaz a fajhők a felmelegedési képességekkel megfordított arányban vannak. Ellenben ugyanazon fokra felmelegített testek annál későbbre vesztik el melegüket a kisugárzás vagy közlés által, — illetve annál több meleget képesek szolgáltatni a velük érintkező más testeknek, mennél nagyobb a fajhőjük. De mivel a gyakorlatban nem a súlyegységre vonatkoztatott fajhő, hanem inkább az érdekel, hogy bizonyos hőfok mellett mennyi a talaj volumegységében foglalt fajhő: annál fogva Mayer, Liebenberg, Wollny, Lang s mások azon nézetben vannak, hogy helyesebb volna a talaj fajhőjét a volumegységre vonatkoztatva fejezni ki.

\*) Az erre vonatkozó adatok nagy része össze van állítva és ujjakkal szaporítva Dr C. Lang ily cz. munkájában: Ueber Wärmecapacität der Bodenconstituanten. Wollny, Forschungen, I. kötet. 109—147. l.



E tekintetben szükséges volt először a talajt alkotó anyagok tömör volumegysége hőkapacitását meghatározni. Ezt úgy nyerjük, ha az illető test fajsúlyát annak súlyegységre vonatkozó fajhőjével szorozzuk.

Lang a talajt alkotó főbb anyagoknak tömör volumra vonatkozó hőkapacitását következőknek találta:

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| kvarczhomok            | $2.64 \times 0.196 = 0.517$ |
| márványpor             | $2.72 \times 0.214 = 0.582$ |
| kaolin                 | $2.47 \times 0.233 = 0.576$ |
| érett tőzeg (televény) | $1.26 \times 0.477 = 0.601$ |

Látjuk, hogy a talajanyagok tömör volumra vonatkozó hőkapacitásai közt a különbség sokkal kisebb, mint a súlyegységre vonatkozók közt; mert amely anyagoknak közönséges értelemben vett fajhője csekély, azoknak fajsúlyok nagyobb, s így a különbségek majdnem kiegyenlítetnek. Mindazonáltal a humusz hőkapacitása ez esetben is nagyobb marad, tehát a humusz a volumra vonatkoztatott hőkapacitást is emeli, de sokkal kisebb mértékben, mint a súlyegységre vonatkozót. A száraz talajnak tömör volumegységre vonatkoztatott fajhője tehát rendesen 0.5 és 0.6 közt áll, s e tekintetben a természetben előforduló talajok közt jelentékeny különbség nem lehet. A víz hatása különben itt is ugyanaz; mert annak volumegységre vonatkozó fajhője is  $= 1$ , tehát kétszer, vagy majdnem kétszer akkora, mint a többi talajanyagoké.

Végre vonatkoztathatjuk gyakorlati szempontból a hőkapacitást a talajanyagok azon tömegére is, mely úgy amint van, lazán vagy tömötten, a volumegységben foglaltatik.

A hőkapacitás e nemét rövidség okáért szerkezeti hőkapacitásnak nevezhetnők. Minthogy a talaj tömörségének változása a talajanyagoknak sem fajsúlyát, sem fajhőjét nem változtatja, innen következik, hogy a szerkezeti hőkapacitást megkapjuk, ha a tömör volum hőkapacitását a volumegységben foglalt talajanyag térfogatával szorozzuk. Ha pl. a tömör volum hőkapacitása 0.55, a volumegységben foglalt talajanyag pedig annak csak 0.6-ét tölti ki, a többi levegő foglalja el, akkor a talaj szerkezeti hőkapacitása 0.33. Ha e mellett még térfogatra 25% víz is van jelen, akkor lesz a nedves talaj szerkezeti hőkapacitása  $[60 \times 0.55 + 25 \times 1.00] : 100 = (33 + 25) : 100 = 0.58$ .



Mindebből láthatjuk, hogy a talaj volumra vonatkoztatott hőkapacitását a talaj humusztartalma csak kis mértékben, ellenben víztartalma igen jelentékeny mértékben emeli. Ennél fogva a humusz-, s még sokkal nagyobb mértékben a víztartalom, a talajnak mind felmelegedését, mind kihülését, s így a különbségeket is, képes bizonyos mértékben csökkenteni. De mivel a humusz és víztartalom a talajnak színét is változtatja, ezen kívül utóbbi más halmazállapotba is átmeleg a hőváltozásokkal: ez anyagok a talaj hőmérséki viszonyaira nemcsak hőkapacitásuk, hanem az említett más tulajdonságaik által is igen lényeges befolyást gyakorolnak. Ezért mindeddig nem sikerült a talajanyagok hőkapacitásának befolyását a talaj hőmérséki viszonyaira, számokban kimutatni.

#### d) A talaj színének befolyása annak hőviszonyaira.

Ismeretes, hogy sötét felületű testek ugyanazon hősugaraknak kitéve, ugyanazon idő alatt erősebben felmelegeszknek, mint világos felületűek; de másfelől a felvett hőt gyorsabban is sugározzák ki.

A talaj színe által okozott különbség a felmelegedésben annál feltűnőbb, mennél erősebb a nap melegítő ereje, s így mennél nagyobb a felmelegedés foka.

Annak kipuhatólására, hogy a különböző talajanyagok felmelegedésére a színnek mekkora befolyása van, Schübler egy kísérletének eredményét közöljük.

A talajanyagokat augusztusban, 11 és 3 óra közt, midőn a lég hőmérséke árnyékban 22—25 C fokot mutatott, a napnak tette ki. A számok a felmelegedést C fokokban adják. (Lásd a köv. lapon!)

E táblázatból kitűnik, hogy nyári erőteljes napsütés mellett a fehér és fekete felület a felmelegedésben 7—8 C foknyi különbséget mutathat fel; és hogy a természetes színű talajok felmelegedés tekintetében a szerint közelednek inkább a fehérre vagy feketére festetthez, amint színek az utóbbiak egyikéhez közelebb áll.

Amily mértékben a szín sötétebb volta a hőelnyelést elősegíti, époly mértékben siettet a kisugárzást is. Sötétebb színű talaj felülete tehát gyorsabban kihül és ugyanazon idő alatt alacsonyabb fokra száll hőmérséke a kisugárzás által, mint a vilá-



| T a l a j a n y a g o k                              | A felületen elért legmagasabb hőmérsék |         |          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------|
|                                                      | természetes szín mellett               | festve  |          |
|                                                      |                                        | fehérré | feketére |
|                                                      | légen száradt állapotban               |         |          |
| Kovahomok, világos, sárgás szürke . . . . .          | 44·7                                   | 43·2    | 50·9     |
| Mészköhomok, fehéres szürke . . . . .                | 44·5                                   | 43·2    | 51·1     |
| Gipsz, fehér szürke . . . . .                        | 43·6                                   | 43·5    | 51·2     |
| Agyag, 45 % homokkal, sárgás . . . . .               | 44·1                                   | 42·4    | 49·7     |
| Agyag, 24 % homokkal, sárgás . . . . .               | 44·5                                   | 42·1    | 49·5     |
| Világos agyag, homok nélkül, sárgás szürke . . . . . | 44·6                                   | 41·9    | 49·1     |
| Kékes szürke agyag (10 % homokkal)                   | 44·6                                   | 41·2    | 48·9     |
| Mész, fehér, igen finom . . . . .                    | 43·6                                   | 43·1    | 50·7     |
| Humuszsavany, barnás fekete . . . . .                | 47·4                                   | 42·5    | 49·4     |
| Kertiföld, feketés szürke . . . . .                  | 45·2                                   | 42·4    | 50·2     |
| Szántóföld, szürke . . . . .                         | 44·2                                   | 42·0    | 50·0     |
| Palás márga, barnás vörös . . . . .                  | 46·2                                   | 42·4    | 50·7     |

gosabb színű testé. Legnagyobb a különbség e tekintetben a fehér és a fekete testek közt.

Mig Schübler kísérleteit a legnagyobb melegben és a talaj felületén tette, addig Wollny\*) 1876. június 3—13-áig éjjel és nappal 2—2 óránként észleltette a talaj hőmérsékét 10 cm. mélységben és találta:

|                                 | a feketére       | a fehérre |
|---------------------------------|------------------|-----------|
|                                 | festett agyagnál |           |
|                                 | C fokokban       |           |
| az átlagos hőmérsékét . . . . . | 21·71            | 20·03     |
| a kitérések nagyságát . . . . . | 12·65            | 9·75      |

A mesterségesen festett főbb talajanyagokat aug. 5—13-ig vetette hasonló vizsgálat alá és találta fok C:

\*) Wollny, Forschungen, I. kötet. 43—69. l.



|             | átlagos hőmérsék |       |               | k i t é r é s |       |               |
|-------------|------------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
|             | fekete           | fehér | külön-<br>ség | fekete        | fehér | külön-<br>ség |
| Homok . . . | 24·04            | 22·25 | 1·79          | 16·22         | 13·41 | 2·81          |
| Agyag . . . | 23·85            | 22·70 | 1·15          | 15·31         | 13·70 | 1·61          |
| Tőzeg . . . | 22·18            | 21·13 | 1·05          | 12·18         | 11·42 | 0·76          |

Továbbá találta augusztus 6—13-ig a szántóföld talajának hőmérsékét 22 cm. mélységben:

|                            | fekete | fehér | külön-<br>ség |
|----------------------------|--------|-------|---------------|
| átlagos hőmérsék . . . . . | 23·09  | 22·12 | 0·97          |
| kitérések . . . . .        | 2·88   | 2·50  | 0·38          |

október 27—30-ig

|                          |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|
| átlag hőmérsék . . . . . | 8·01 | 7·71 | 0·30 |
| kitérések . . . . .      | 0·90 | 0·88 | 0·02 |

Wollny észleleteiből következik, hogy a meleg évszak alatt a setét színű talaj átlag melegebb mint a világos színű. A napi kitérések a setétebb színű talajnál nagyobbak. A szín által okozott hőmérsék közti különbség a napi maximum beállása táján legnagyobb, a napi minimum alkalmával ellenben igen csekély. Ez onnan van, hogy a setétebb talaj gyorsabban kisugározza ugyan nappal kapott hőjét mint a világos, de még sem száll hőmérséke ez utóbbié alá. A szín által okozott hőmérséki különbségek a talaj mélységével apadnak, és a besugárzás megszűntével, valamint a hidegebb évszakban majd teljesen megszűnnek.

Később a talaj különböző színárnyalatai, különösen a víztartalom, valamint a vaséleg által okozott színváltozatok befolyására is kiterjesztette W. kísérleteit,\*) melyekből kiderül, hogy a vörös, barna, szürke színárnyalatok hatása a fekete és fehér színé közé esik, de a már ismertetett hatásokhoz teljesen hasonló.

ε) A talaj szerkezetének és nedvességének befolyása annak hőmérsékére.

Már a talaj felületének minősége, úgymint simasága, vagy göröngyössége is bir befolyással annak felmelegedése- és kihű-

\*) Wollny, Forschungen, IV. kötet. 327—365. l.



lésére; habár ez jóval csekélyebb a szín által okozottnál. Ámbár a göröngyösségnek foka igen különböző lehet és nehezen meghatározható, annyit mégis állithatunk, hogy a göröngyös fölületű talaj naphosszat több meleget nyel el, mint a sima felületű; a különben egyenes, homokos felületű többet, mint az agyagos.

A szerkezet befolyását Wollny után\*) következőkben lehet összefoglalni:

A meleg évszakban a talaj — bizonyos határig — annál melegebb, mennél durvább szemcséjű. De ha a szemcsék bizonyos nagyságot túlhaladnak, a hőmérsék mind kisebb lesz. A légszáraz sárga homok temperaturája pl. volt a szemcsék következő átmérői mellett aug. 30-tól szept. 6-ig átlag:

0.0—0.5 1—2 2—4.5 4.5—6.75 mm.

19.71 20.30 20.38 20.05° C;

ugyanazon homok nedves állapotban a következő átlag hőmérsékeket mutatta júl. 26-tól aug. 4-ig:

23.18 23.68 23.61 23.49° C.

Ennek okát részint abban találjuk meg, hogy a talaj szemcséinek finomságával a nedvességtartalom is növekedik, s ezzel nő a hőkapacitás és a víz elpárologtatása folytán nagyobb a hőveszteség; részint pedig abból magyarázhatjuk, hogy a talaj kihűlése éjen át a lehűlt levegőnek abba való benyomulása által annál nagyobb, a talaj hővezetőképessége pedig alólról annál kisebb lesz, mennél nagyobbak a talaj szemcséi.

Ez a különbség legnagyobb a napi hőmaximum alkalmával, legkisebb a hőmaximumnál. A szerkezetbeli finomság befolyása a hőmérsékre továbbá annál kisebb, mennél kevesebb vizet tartalmaz az, mennél csekélyebb az elpárolgás és mennél inkább érvényre jut a nedves talaj hővezetőképessége alólról felfelé; legkisebb tehát a hűvösebb évszakban, éjjel vagy felhős időben, a lég nagyobb nedvessége mellett; az ellenkező esetekben pedig nagyobb.

Ha a hőmérsék a fagypontra alá száll, akkor a talaj annál hidegebb, mennél durvább szemcséjű. Legnagyobb a különbség

\*) Wollny, Untersuchungen ü. den Einfluss der Struktur des Bodens auf dessen Feuchtigkeits- und Temperatur-Verhältnisse. Forschungen, V. kötet. 144—209. l.



a fagy beállásakor, legkisebb akkor, ha a talajban minden víz jéggé fagyott. Tavasszal a talaj kiengedése és átmelegedése annál gyorsabban megy, mennél durvább szerkezetű az.

A talaj tömörségének hatását a hővezető képességre alább fogjuk tárgyalni.

A talaj hőmérsékének szabályozásában nevezetes szerepet kell tulajdonitnunk a víznek, mely közönséges hőmérsék mellett ott részint csepfolyó, részint gőz alakban van jelen; de ha a temperatura 0 alá száll, jég alakot vesz fel. Épen a halmazállapot ezen változtatása teszi azt alkalmassá a hőmérséki ingadozások csökkentésére, a minimumok és maximumok leszállítására és a gyors átmenetek akadályozására. Valóban úgy védelmezi a víz a növényzetet a hőmérsék rögtöni változásainak káros hatásától, mint a ruganyos ütköző párnák a vasuti kocsikat a heves rázkodtatásoktól. Ugyanis amily arányban emelkedik a talaj hőmérséke, oly arányban változik gőzzé az abban foglalt csepfolyó víz, ami a hőemelkedést tetemesen csökkenti, miután minden kilogramm víznek gőzzé változásánál a tenyészévad alatti közönséges hőmérsék mellett 590 – 600 hőegység köttetik meg. Ellenkező áll be a lehülés alatt, midőn a talajban foglalt vízgőzök lassanként csepfolyóvá sűrűdnek, ekkor ugyanis a kötött hő újból szabaddá tétetvén, a lehülést lassubbá teszi. Ha a felület hőmérséke 0 alá száll, akkor a csepfolyó víz jéggé válik, miáltal minden kilogramm jég után 79 hőegység lesz szabad és fordítottatik a lehülés akadályozására; úgyhogy a talaj azon rétege, amelyben még csöppfolyó víz van, nem hülhet le jobban, mint 0 fokra. De megfordítva, mindaddig, míg a talajban az utolsó jégtömeccs el nem olvad, nem hághat ennek közelében a temperatura 0-on felül. A víz tehát nemcsak a légkör, hanem a talaj hőmérsékének is legfőbb szabályozója, s e tekintetben is oly fontos, hogy e tulajdonságai nélkül növénytenyészet a földön nem képzelhető.

Már Schübler kimutatta volt, hogy a talaj nedvessége annak a napsugarak által való felmelegedését nagyon hátráltatja. Meleg nyári napon, midőn a hőmérséklet árnyékban 22 – 25° C volt, 11 és 3 óra közt tett kísérleteinek eredményei a következő táblácskába vannak foglalva:



|                                              | nedve-<br>sen | szára-<br>zon |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|
| Kovahomok, világos, sárgás szürke . . . . .  | 37·2          | 44·7          |
| Mészhomok, fehéres szürke . . . . .          | 37·4          | 44·5          |
| Gypsz, fehér szürke . . . . .                | 36·2          | 43·6          |
| Agyag, 45 % homokkal, sárgás . . . . .       | 36·7          | 44·1          |
| Agyag, 24 % homokkal, sárgás . . . . .       | 37·2          | 44·5          |
| Világos agyag, homok nélkül, sárgás szürke . | 37·4          | 44·6          |
| Kékes szürke agyag (10 % homokkal) . . .     | 37·4          | 44·6          |
| Mész, fehér, igen finom . . . . .            | 35·6          | 43·6          |
| Humuszsav, barnás fekete . . . . .           | 39·7          | 47·4          |
| Kertiföld, feketés szürke . . . . .          | 37·5          | 45·2          |
| Szántóföld, szürke . . . . .                 | 36·9          | 44·2          |
| Palás márga, barnás vörös . . . . .          | 38·7          | 46·2          |

A nedvességnek a talaj hőmérsékére való befolyását ujabban Wollny\*) tanulmányozta és kísérleteinek eredményét következő tételekbe foglalja:

A melegebb évszak alatt a talaj annál melegebb, mennél szárazabb az. Ennek oka a párolgásnak és a hőkapacitásnak a nedvesség által való fokozása. A nedvesség lehűtő hatása legnagyobb a hőmaximum, legkisebb a hőminimum alkalmával, s általában fokozza e hatást minden körülmény, ami a talaj felszínén a párolgást elősegíti. A hőmérséki kitérések nagyságát a nedvesség egészben véve csökkenti, minek oka a hőkapacitás emelkedése.

Fagy beállásakor a talaj annál inkább kihül, mennél szárazabb. Ha azonban a víz mind jéggé fagyott, rendesen az ellenkező áll be, vagy pedig a száraz és nedves talaj közt a különbség kiegyenlítődik. A kiengedésénél a talaj felmelegedését a víz (illetve jég) jelenléte késlelteti, s ekkor a különbség a száraz és a nedves talaj közt igen jelentékeny, ellenben teljes kiengedés után megint csekélyebb lesz.

A nedvesség által való lehűtés egészben véve nem oly nagy, hogy az igen nedves talajnak a mezei terményekre gyakorolt

\*) Untersuchungen über den Einfluss des Wassers auf die Bodentemperatur. Forschungen, IV köt. 147—190. l.



káros befolyását ebből lehessen kimagyarázni. A nyári hónapokban 17 nap folytán a 10 cm. mélységben tett észleletek átlagában a száraz talaj melegebb volt mint a nedves:

vályog 1·26 tőzeg 0·33 homok 1·47° C-sal.

Hogy e különbségek sokkal kisebbek azoknál, melyek Schübler kísérleteinél mutatkoztak, annak egyszerűen az az oka, mert utóbbi az észleléseket a napsütésnek kitett talaj felületén, a nyári nap legmelegebb óráiban tette. Schübler kísérleteinek tehát csak a felületen beállható hőmaximumok összehasonlítása volt a célja.

#### e) A talaj hővezetőképessége.

Erre nézve érdekes adatokkal gazdagította a tudományt Fr. Haberlandt tanár.\*) Kísérleteinek eredményét adjuk röviden a következőkben:

a) Mennél tömöttebb a közet annál jobb melegvezető.

Vannak azonban kivételek is; pl. a gránit jobb melegvezetőnek bizonyult, mint a tömöttebb márvány.

b) A talaj hézagaiban lévő levegő annak melegvezető képességét nagyon csökkenti.

Ezért mennél lazább, mennél felporhanyitottabb a talaj, annál csekélyebb a melegvezető képessége; ellenben az összetömötlítés, letaposás, ledöngölés a melegvezetést elősegíti.

c) Minthogy a víz jobb melegvezető, mint a talajlég; amennyiben ez utóbbit a talaj hézagaiban víz helyettesíti, emelkedik a hővezetőképesség. Ezért nagyobb ez a nedves, mint a száraz talajnál.

Azon talaj, amely hézagaiban a csepfolyó vizen kívül még levegőt is tartalmaz, hővezetőképesség tekintetében nem versenyezhet a vízzel. Csak ásványi anyagokban gazdag, vízzel telített és összetömöttített talaj vezeti a meleget jobban mint a víz. A nedvességgel telített, összetömöttített homoktalaj gyorsabban felmelegedett mint a víz; ellenben az összetömöttített szántótalajnál nem lehetett ezen eredményt elérni; nyilván azért, mert az még sok levegőt tartalma-

\*) Wissensch. prakt. Untersuchungen auf d. Geb. des Pflanzenbaues, Bd. I. S. 33—63.



zott, minthogy vízfelvételi képessége csak félig (41·1 % helyett csak 20·5) volt kielégítve.

d) A H. által kísérlet alá vetett talajnemek mind megtömöttülve, mind lazán a következő sorban jönnek egymásután hővezetési képesség tekintetében száraz állapotban: szántótalaj, homok, láptalaj (Moorboden), komposztalaj; még pedig akár felmelegedés, akár kihülés alá vettettek. Ezen sor változik, ha ezen talajnemek meg nedvesítettnek, mert akkor azok mind megtömöttülve mind laza állapotban így következnek: homok, agyagos (szántó) talaj, komposzt, láptalaj.

e) A felmelegedés legnagyobb foka mindenik talaj-nemnél ugyanazon időben következett be.

f) A tenyészet évadja alatt a jobb melegvezető talajoknak melegebbeknek kellene lenniök, amennyiben nedvesség jelenlétében az elpárolgás a hőemelkedést meg nem gátolja.

g) A humusz nagy mennyisége csökkenti a hővezetőképességet. Annak fekete színe csak a felületen gyakorolhat hatást.

h) Mennél nagyobbak a talaj szemcséi, s mennél közelebb vannak azok egymáshoz, annál inkább közeledik a talaj hővezetési képessége a szikláéhoz és viszont.

Végre a hővezetési képességgel való szoros összefüggésnél fogva nem mulaszthatjuk el röviden közölni a talaj laza vagy tömött állapotának befolyását annak hőmérsékére, az E. Wollny által tett kísérletek nyomán, melyek eredményeit szerző következőkben foglalta össze:

a) A melegebb évszak alatt és meleg időjárás mellett a tömött talaj átlagosan melegebb; a hidegebb évszak alatt és akkor is, midőn a melegebb évszakban a hőmérsék egyszerre nagyon leszáll, hidegebb mint a laza talaj.

b) A melegebb évszak alatt és meleg időjárás mellett a tömött talaj nappal átlagosan melegebb; éjjel rendszeren hidegebb, mint a laza.

c) A különbség legnagyobb azon időben midőn a talajban a napi maximum beáll; a napi minimum idejében ellenben igen csekély, vagy kiegyenlítődik, sőt az ellenkező viszony is beállhat.

d) A tömött talajban a hőmérséki ingadozás jóval nagyobb, mint a lazában.



e) Ezen tünetmények oka az, hogy a tömött talaj jobb hővezető, mint a laza.

9. *A talaj képessége a vízben lévő zavarék, festő- és szaganyagokat, valamint oldott anyagokat elnyelni.*

Már Aristoteles állította, hogy a tengervízét földön való átszűrés által ihatóvá lehet tenni. Gazzeri, aki Florenczben vegytant tanított, már e század elején észlelte, hogy a barna ganajlé agyagon átszivárogha színét elvesztette és ezen kívül 1819-ben kimondotta, hogy a föld, kiváltképen pedig az agyag, a vízben oldott anyagokat magához ragadja és visszatartja, hogy azután a növényeknek csak lassanként, azok szükségletéhez képest szolgáltatssa át. Ettől függetlenül tették Thomson és Huxtable Angolországban azon felfedezést, hogy a talaj a rajta átszűrődő vízből festő és szaganyagokat, valamint vegyi oldatokból egyes alkatrészeket vesz fel és tart vissza magában és a talaj ezen fontos tulajdonságára, melyet *absorption*-nak neveztek, a mezőgazdasággal tudományosan foglalkozó szakembereket 1850-ben figyelmeztették. Németországban különösen Liebig, s azután a vegyészeknek hosszú sora foglalkozott a talaj e tulajdonságának beható kutatásával, s foglalkoznak még jelenleg is; mindazonáltal a kérdés minden pontja mindeddig felderítve nincs.

A zavarék, festő és szaganyagok elnyelése tisztán felületi tömecs vonzásra (*adhaesio*) vezethető vissza, azért ezt fizikai *absorption*-nak szokás mondani. Természetes, hogy az ily hatás annál nagyobb, mennél finomabbak a talaj alkatrészei. Most e tünetmény általában ismeretes. A faszenet már rég használják a borszesz tisztítására a kozma-olajtól. E törvényen alapszik a víz tisztítása homokon való átszűrés által; ennek köszönhetjük forrásvizeink tisztaságát; szóval ebben áll főképen a talajnak tisztító, desinficiáló hatása a rajta átszűrődő vízre. Ezen tulajdonság segélyével tartja vissza a talaj felső rétege a legfinomabb humusz alkatrészeket, melyek a leszivárgó vízzel abba bevitetnek.

De a talaj e tehetségénél még messzehatóbb az, hogy a vízben feloldott sók bizonyos alkatrészeit visszatartani képes.

Thomson szénsavas és kénsavas ammonia oldatot szűrte át szántótalajon és azt találta, hogy a leszűrődött víz mindkét eset-



ben kevesebb ammoniát tartalmazott, mint a feltöltött; s azonkívül midőn kénsavas ammoniát jártatott le, egyszersmind aljcsere is történt a folyadék és talaj közt, mert az ammonia egy részét mészéleg pótolta a lecesepegő vízben. E nevezetes felfedezés nagy jelentőségét belátván, a földművelési vegytannal foglalkozók számos ide vonatkozó kísérletet hajtottak azután végre, melyekből kiderült, hogy minden talajnem bir ily abszorbeáló képességgel, a homoktól fogva a legkötöttebb agyagig, de nagyon különböző mértékben; olyképen, hogy mennél durvábbak a talaj részesekéi, annál csekélyebb annak abszorbeáló képessége vegyi oldatokkal szemben, s így legkisebb az a homoktalajnál. Az ammoniát mind az agyag-, mind a humusz-, mind pedig a mésztalaj képes visszatartani. A sók oldataira nézve Moser\*) szerint két tüneményt kell megkülönböztetnünk; t. i. a) némely sóknak (és a chloridoknak) csak alját (chloridoknál a fémet) tartja vissza a talaj, ellenben a sav (illetve chlor), mely a talajban előtalált valamely más aljjal (a chlor, fémmel) egyesül, a leszűrődő vízben marad; míg b) más sóknak mind sava, mind alja, bár néha különböző arányban abszorbeáltatik. Első esetben (a) az oldott só legalább részben felbontatik és alját kieseréli, ami kiváltkép a kén- és salétromsavas sóknál, valamint a chloridoknál történik meg; így pl. ha salétromsavas kálium oldatát szűrjük át mésztartalmu talajon, a leszűrt oldatba salétromsavas mész megy át, míg a káli (egészen vagy részben) a talajban marad. A második eset (b) főképen az ammonia és káli szénsavas sóira, továbbá a phosphorsavas káli, ammonia és natronra, valamint a szénsavas vízben oldott phosphorsavas mész és mágnesiumra, s végre kovasavas káliumra vonatkozik.

Az aljak közül úgy látszik legjobban visszatartja a talaj a kálit és az ammoniát, kevésbbé a magnéziát, még kevésbbé a meszet, s legkevésbbé a nátront. A savak közül leginkább a phosphorsavat és szénsavat, néha a kovasavat is, sokkal kevésbbé a kénsavat, míg a salétromsavat, sósavat és a chlort épen nem abszorbeálja.

Kivételt képeznek a mészben gazdag talajok a phosphorsav abszorbeálása tekintetében, mely csak lassan megy véghez; így

\*) Dr. J. Moser, Lehrb. d. Chemie f. Land- u. Forstwirthe. Wien, 1870.



pl. Albert és Wagner azt találták, hogy mészből gazdag agyagtalaj ugyanolyan oldatból 10 napon át nyelt el annyi phosphorsavat, mint mészből szegény agyagtalaj 3 nap alatt.

Az abszorbeálás lefolyása rendszeresen igen kevés időt vesz igénybe, mert már az első negyed óra alatt majd mindent megköt a talaj, amit az oldatból általában felvenni képes. Az aljakra nézve úgy látszik az is befolyással van, hogy mely savakhoz vannak kötve; mert azok nyeletnek el leginkább, melyek phosphorsavval vagy szénsavval vannak egyesülve.

A talaj a leghigitottabb oldatból is képes valamit felvenni; de annál többet abszorbeál az oldatból, mennél töményítettebb az; anélkül, hogy az oldatot valaha teljesen kimerítné.

Ezekből következik, hogy a talajon felülről lefelé átszűrődő vízből a talaj legfelső rétege von el legtöbb abszorbeálható alkatrészt, míg az alsóbb rétegekbe azokból csekély, — ellenben a visszatartásra kevésbé vagy éppen nem alkalmas anyagokból több megy át. Minthogy azonban a felső talajrétegek az oldatot az abszorbeálható anyagokra nézve sem meritik ki tökéletesen, ezekből is jut valami az alsóbb rétegekbe, azoknak az abszorbeálásra alkalmat adva.

Ezen abszorbeált anyagokat a talaj nagy erővel tartja vissza, úgy hogy azok feloldására annyi víz a mennyivel felhigitva voltak az átszűrődés és visszatartás alkalmával, már nem elegendő, hanem annál sokkal nagyobb kíváncsít. Az esővíz nagyobb mennyisége tehát képes az abszorbeált anyagok egy részét újra feloldani és alsóbb rétegekbe juttatni; de figyelemre méltó, hogy e folyamatnál újból inkább azok az anyagok oldatnak fel és mosatnak mélyebb rétegekbe, a melyek megkötésére a talaj kevésbé alkalmas. Ha az idevonatkozó kísérleteknél lepárolt víz helyett olyat veszünk, amely szénsavat vagy alkális sókat tartalmaz, akkor a megkötött anyagokból több oldat fel. A talajban lévő ammonia, valamint az ebből lassanként származó salétromsav az abszorbeált anyagok újboli feloldását elősegítik.

A mészkövek közvetve hat az által, hogy némely ásványi vegyületből alkáliákat, mindenekelőtt kálium szabadít fel. A chlornátrium és salétromsavas nátrium oldja a phosphorsavas ammonia-magnesiumot. A gipsz a talaj zeolithos alkatrészeiben lévő káliumot



könnyen oldható kénsavas sóvá változtatja át, s ezenkívül az abszorptio folytán megkötött ammoniát is könnyen oldható állapotba viszi át. A talajon átszűrődő nagyobb mennyiségű vízben leginkább megtaláljuk a nem abszorbeálható anyagokat, s az abszorbeálhatók közt azokat, melyek abban felesleges, t. i. az abszorbeáló tehetséget túlhaladó mennyiségben vannak jelen; ezenkívül a nem fölös mennyiségben lévő, abszorbeált anyagokból is fog az egy keveset tartalmazni. Fennebbiekből megmagyarázható, hogy miért tartalmaz a kútvíz főképen mész-, magnézia- és nátron sókat, s miért van abban oly kevés káli, phosphorsav és ammonia, — miért hiányzik ez utóbbi gyakran teljesen. Már az alagsövek vizében (Drainwasser), melyek átlagosan alig 1 m. mélységre tehetők, valamivel több van a talaj által abszorbeálható anyagokból.

A vegyi oldatok abszorbeálásának okaira nézve a nézetek eltérők. Némelyek ezt tisztán vegyi, mások tisztán fizikai hatásokból akarják magyarázni. Úgy látszik azonban, hogy mindkét nézetnek van a maga helyén jogosultsága, s azok egymást épen nem zárják ki.

Ha humuszra phosphorsavas mész oldatát töltjük fel, e sóból jelentékeny mennyiséget fog előbbi tisztán fizikai úton elnyelni, azaz a humuszcseccék körül a nevezett oldat jelentékenyen töményülni fog a humusz tömecseinek a phosphorsavas mész tömecseire gyakorolt vonzása folytán; az oldat többi része ennél fogva hígítottabbá válik. A tömecsvonzás egyik oka annak, hogy az oldatok sóiból a talaj annál többet nyel el, mennél finomabbak részecskéi, s különösen mennél több benne az u. n. kolloidanyag, amely vizet határozatlan mennyiségben képes magába felvenni, a víznek csekélyebb mennyisége mellett kocsonyaszerűvé válik de kristályosodásra nem hajlandó. Ilyen a humuszanyagoknak, agyagnak, szilikátok felbomlása útján származott kavashydratnak, s hasonló úton létrejött aluminium-alkáli szilikátoknak, továbbá az egy és két értékű vas hydroxydjainak és különböző humuszsavas sóknak számos módosulata. J. M. van Bemmelen különösen ezen kolloidanyagoknak tulajdonítja az abszorptio tünetényeit s nemcsak a fizikai abszorptiót igyekszik azok jelenlétéből kimagyarázni, hanem jelentékeny szerepet juttat



nekik a vegyi abszorptio közvetítésében is.\*) Ezért bir nagy elnyelőképeséggel azon talaj, melyben sok az agyag, vasoxyd, televény, finomul elosztott amorf kovasav stb.

De a vízben oldott sók elnyelésének számos esetében, kivált midőn a só felbontatik és annak vagy bázisa, vagy sava tartatik inkább vissza: okvetetlen vegyi folyamatokat, vegyi úton való elnyelést (chemiai abszorptiot) kell feltennünk. Az alkáliák, különösen a káli visszatartását az agyagos talajban láthatatlan állapotban mindig előforduló finom kristályos vagy kolloidszerű zeolithnemű testek jelenléte által lehet megmagyarázni, az aljak részbeni kicserélése folytán. A zeolithok savak által könnyen oldható és felbontható, változékonny összetételű kettős szilikátok, melyekben a kovasavas aluminium mellé leggyakrabban kovasavas kálium és nátrium szegődik, de ezen utóbbi aljakat mások is, főkép a káli, helyettesítheti. Ha pl. a talajon kénsavas kálit szűrünk át, a lefolyt oldatban kénsavas nátront fogunk találni, melyet úgy magyarázhatunk meg, hogy a zeolithnemű test kálit vett fel az átszivárgó oldatból, s a helyett nátront engedett át a kénsavnak.

A talajban előforduló víztartalmu kovasav is köt meg vegyileg alkálikat és meszet; viszont a kovasavas oldatokból szegődhet a kovasav a talaj mész- vagy agyagtartalmához; de ebben a humuszsavak mint erősebbek megakadályozhatják. Ezért a humuszban szegény agyagos talaj sokkal inkább képes kovasavat az oldatból megkötni, mint a televényben dús talaj.

A humusztól sem lehet megtagadni azon képességet, hogy a sók bázisaira, ammoniára, kálira, mészre, vegyileg hatást gyakorol, s azokat többé-kevésbbé a talajban megkötve visszatartja.

A phosphorsav abszorbeálását nyilván a vasvegyek, (vasoxydul, vasoxyd és hydrátjaik), továbbá az agyag aluminium tartalma okozza, melyek nevezett savval igen nehezen oldható sókat képeznek. Ezenkívül e sav a magnéziával és ammoniával is egyesül a nehezen oldható ammon-magnézia-phospháttá; végre elvonja esetleg a phosphorsavat valamely könnyen oldható vegyületből a mész is, mely kisebb-nagyobb mennyiségben minden talajban jelen van, és azon savval nem éppen könnyen oldható sók képez.

\*) Die Absorptions-Verbindungen u. das Absorptions-Vermögen der Ackerkrume. Landwirtsch.-Versuch Stationen. Bd. XXXV. 1888. Heft. 2. S. 69—136.



Bármi is legyen oka az abszorpciónak, áll az, hogy létezik, és a növények tenyészésére két okból nagy fontossága. Először a tápanyagokkal való gazdálkodás miatt. Ugyanis a növények által a talaj minden elérhető rétegéből összegyűjtött, s a hulladékok útján a termő talajnak visszaadott kálit, phosphorsavat, s azon kívül az ammoniát stb. melyek azok táplálkozására oly fontosak, a talaj, ezen képessége folytán az eső és hóvíz által kilugozni és a növényekre nézve elveszni nem engedi, hanem inkább a termő talajnak megtartja és azt évek hosszú sora alatt abban felhalmozza. Másodszor hasznos a talaj abszorbeáló képessége az által, hogy a sókat a növényzetre nézve káros mennyiségben oldatba menni nem engedi. Vannak ugyanis oly sók, melyek a növénybe felvétetve, annak életműködésére károsan hatnak. De ezektől eltekintve, Sachs kísérletei kiderítették, hogy a növények akkor érzik legjobban magukat, ha a táplálásukra szolgáló talaj-sók nagyon hígított állapotban vannak a vízben feloldva; ellenben ártalmasok, ha ezen határt mennyiségük túllépi. A talaj pedig e sók nagyobb mennyiségben való oldatbamenetelét akadályozza, s így e tekintetben is fontos szabályozó szerepe van.

#### 10. *A talajban véghez menő fizikai és vegyi folyamatok áttekintése.*

a) E folyamatoknak hasonlósága a szerves testek élettüneményeivel általában.

A természetben a halál csendje és nyugalma nem létezik. Mindenütt mozgás, mindenütt hullámozás, mindenütt élet; még ott is ahol a tétlenségnek, a halálnak honát képzei az egyszerű ember: a talajban! S mily bámulatos, mily meglepő, hogy a föld kérgének legfelső rétegében mindazon folyamatokat feltaláljuk, melyek az állati és növényi élet mozzanatainak főbb csoportjait jellemzik; úgy hogy beszélhetünk a talaj táplálkozásáról, nedvforgalmáról, légzéséről és melegéről. S valóban csak akkor birunk helyes fogalommal és átnézettel a talaj mibenlétéről, belső természetéről, ha az abban folyton működő folyamatokat a szerves lények életével összehasonlítottuk.

A talaj életének fensőbb célja van! Amint a növényország azon lépcsője az életnek, melyre az állatország léte van alapítva; úgy a talajnak a természet által kitűzött feladata, a növényország létét biztosítani. A talaj fogalmát ezen szempont általáno-



sítása végett természetesen ki kellene terjeszteni a vízfelületekre is, melyek a vízi növényeknek szolgálnak talajul; de ez feladattól távol esvén, csak a szoros értelemben vett talajt fogjuk szem előtt tartani.

### b) A talaj táplálkozása.

Hogy a talaj fennebbi célnak megfelelően, szükséges, hogy nyers tápszereket vegyen fel magába s ezeket részint áthasonlítva saját teste fenntartására fordítsa, részint más irányban feldolgozva, a növények által való felvételre alkalmassá tegye. Ily nyers tápszerek a talajjágyban s magában a talajban előforduló közettöredékek, ilyen a víz, és a légkörből felvett gázok. A víz oly szerepet játszik, mint a növényi és állati testben; közvetíti az anyagcserét, felveszi és a talaj szilárd részecskéihez juttatja azon gázokat, savakat és sóoldatokat, melyek az ásványok és humuszképző anyagok felbontására, feloldására és átalakítására alkalmasok; az ő közbenjárásával történik a kőzetek elmállása és a humuszképződés.

Nem hasonlít-e ez a szerves testekben történő assimilációhoz? Nem saját testéhez hasonló anyagokat termel-e a talaj.

Az eközben kifejlődő sóoldatokkal, — a talaj tápnedveivel — táplálkoznak azután a növények; épúgy mint a növények nedveivel az állatok. De a növények bizonyos cselekvő hatás folytán (savkiválasztás a gyökök által) a talaj által erősebben visszatartott, vegyileg abszorbeált, megkötött, tápanyagokat is képesek felvenni; úgy amint a legtöbb állat (és élődi növény is) szerzi tápanyagait más szerves lények rovására.

Hogy a talaj a természettől kitűzött céljának továbbra is megfelelhessen, a belőle felvett anyagokat ujakkal kell pótolnia, ami új nyers anyagok felvételét teszi szükségessé. Ezeket meg is találja a természetes viszonyok közt lévő talaj a talajjágyban (közettöredékek), a beszivárgó vizekben (folyók, források, fenékvíz) és a szerves hulladékokban (humuszképző anyagok).

### c) A nedvára mlás.

A fennebb vázolt folyamathoz szükséges vizet a csapadékok szolgáltatják, melyeknek vezetésére, és a talaj teste minden részecskéjéhez való eljuttatására a talaj hajcsőrendszere szolgál. A fölösleges víz mind tágasabb erekbe egyesül, a forrásoknak, pata-



koknak s ezek a folyóknak adva lételt. Ime a talaj é d é n y r e n d - s z e r e !

#### d) A légzés.

A talajban véghez menő táplálkozási működéseknél sok oxygen használtatik fel, és rendesen a humuszképződés mellett sok szénsav képződik, mely a talaj felsőbb rendeltetésével ellenkezve, a növényzetre ártalmassá válhatnék! A talaj a fölösleges szénsavat kileheli, s helyette a további vegyműködéshez (és a növény gyökereinek légzéséhez) szükséges oxygent felveszi.

Ime a talaj légzése!

A talaj felületén vizet párologtat el, mely helyett új vízrészecskék emelkednek fel. Nem hasonlít-e ez a növények és az állatok transpiratiojához?

#### e) Gazdálkodás a meleggel.

De nincs-e jogunk a talajnak saját melegéről is beszélni? Nem láttuk, hogy a talaj annál teljesebben felel meg feladatának, mennél jobban gazdálkodik a naptól kapott melegével? Mennél egyenletesebben képes azt fenntartani és mennél inkább védelmezi magát saját takarója által. Hisz a talajban végbemenő folyamatok akkor elégitik ki legelőkéteesebben a növények szükségletét, ha az, illő takaró által tartja vissza melegét és nedvességét!

#### f) A növekedés.

A talaj a föld szilárd kérgének a légkörrel nemzett gyermeke, mely ott ahol született növekedik, eléri vastagsága tetőpontját, megkövéredik a növényi hulladékokból képződött humusz által — és rendes körülmények közt aztán sokáig megtartja e vastagságát, mely amint a talajképzésnél láttuk, különböző viszonyoktól, u. m. főképen az anyakőzet elmállási hajlamától, földirati és magassági fekvésétől, klímájától és a helynek a vízszintes síkra való hajlásától függ. A talaj most oly állapotban van, mint valamely, teljes nagyságát elért szerves lény, melynél a test anyagbevétele annak anyagkiadásával egyensúlyba jött.

Hogy a vastagodás nem léphet túl bizonyos határt az eredeti, s rendesen oldalos helyen fekvő talajoknál, az abban leli magyarázatát, hogy bizonyos vastagság mellett az elmállás ható szereinek



a közethez való jutása annyira megnehezítették, hogy most már az elmállás a talajrészecskéknél és az oldott anyagoknak csak a vizek általi elhordását fedezi. A humusz rendes körülmények között már azért sem emelkedhetik a fennálló viszonyok által meghatározott vastagságon túl, mert a növényhulladékok az évek bizonyos száma alatt végre teljesen felbomolván, a légbe mennek át.

### g) Betegség

A talaj még beteg is lehet, s ennek folytán a fenneb vázolt fizikai és vegyi folyamatok benne hanyatlásnak indulnak. Ennek további következése megint az lesz, hogy nemcsak a természet által ráruházott azon feladatnak, hogy megfelelő növényzetet tápláljon, eleget nem tehet; hanem ezenkívül elsoványodik, megvékonyodik! Ez történik, ha az erdőtalaj fölött az erdő tulságosan megritkul, az alomtakaró megapad, vagy éppen elpusztíttatik; vagy ha a talaj növénytakarójától teljesen megfosztatik. Ekkor nemcsak egyik legfőbb bevételi forrása apad ki, hanem a csapadékok korlátlan hatásának kitéve, teste jelentékeny sorvadást szenved, — a víz vágja, mossa; a nap heve és a szél kiszáritja; szóval gyámmortalanná, nyomorúlttá válik, mint egy szőrétől megfosztott állat, — egy megrongált héju fa. Sőt teljesen le is hordhatja azt a víz; amidőn méltán beszélhetünk talajgyilkolásról.

S ki hinné, hogy ezt oly gyakran éppen a zsarnok ember idézi elő.

h) A talaj is egy hiányozhatatlan tagját képezi a természet összehangzó egészének.

Majdnem unja már az ember ezen részletekbe menő analógiát a szerves és szervetlen természet közt! Pedig nem is üres hasonlat ez; mert ez a természet törvényeinek azonosságán alapszik.

Azon összhangzást, mely a teremtmények, s azok egyes kategóriái közt fennáll, — azon czélszerűséget, mely azokat egymással összefűzi, — megtaláljuk a talaj és növényzet összefüggésében és egymásra való hatásában is.

A növényzet sokat vesz át a talajtól, de még többet ad vissza annak. A neki adott táplálékért és lakásért humuszzal és takaróval fizet, s ez által a talajt képesebbé teszi arra, hogy őt



táplálja és fenntartsa. Talaj és növényzet egymást egészítik ki, s az embernek, ki utóbbitól hasznot húz, kötelessége e természetes viszonyt épségben tartani, s a mennyiben az megzavarlatnék, helyreállítani. Ezért kell trágyázni a mezőgazdának, ki a növények által a talajból felvett hamualkatrészeket és a humuszképző anyagok jelentékeny részét a terményekkel eltávolítja; ezért kell az erdő illő zárlatáról s az alomtakaró megóvásáról lelkiismeretesen gondoskodni az erdésznek, s meggátolni minden oly műveletet, mely a talaj elsorványodását, sorvadását és lemosását vonhatná maga után.

Az embernek, ki Istentől oly hatalommal bír, hogy a természeti erőket és folyamatokat saját céljai szerint új mederbe terelhesse: fel kell ismernie a talaj és a növényzet között fennálló ezen kölcsönös viszony végtelen fontosságát, tiszteletben kell tartania a természet ezen mélyreható intézkedéseit: mert ha e törvények ellenére cselekszik, jóllétét ássa alá; . . . a föld kizsárolása megboszulatlanul nem marad . . .

---

1851

/1866/



## Harmadik Rész.

---

### **A talajnemek felosztása, jellemzése és meghatározása.**

#### I. Fejezet.

### **A talajnemek osztályozása.**

Az embernek természetében van, hogy azon tárgyakat, melyekkel bővebben foglalkozik, melyeknek sajátságait tanulmányozta: eredetük és tulajdonságaik, egyszóval belső természetükben tanúsított rokonságuk szerint csoportosítsa; – vagy megfordítva, bizonyos felvett jellegek szerint az illető tárgyak összeségét osztályokra válassa szét. És e törekvés igen helyes, mert ez által a tárgyakról szerzett ismereteink szilárdulnak s a tárgyak felett átnézetet csakis e csoportosítás által nyerhetünk. De hogy a talajok osztályozásában oly szabatos eredményre nem juthatunk, mint az állat- vagy növényországban, az nagyon természetes, minthogy az állat- és növényfajok az öröklés és fajválás törvényei szerint többnyire meglehetősen körülírható jellegeket öltöttek fel az évezredek hosszú sora alatt, melyek őket egymástól többé- vagy kevésbbé élesen különítik el; ellenben a talaj különböző nemeit egymással minden képzelhető változatok kötik össze. Ez az oka, hogy a mező- és erdőgazdák mai napig sem állapodtak meg azon elvek felett, melyek szerint a talajnemeket leghelyesebb volna osztályozni.

Nézetünk szerint legtöbb jogosultsággal bírnak azon osztályozási rendszerek, melyek a talaj származását és összetételét veszik fel alapul. De sajnos e két elv együttesen nem alkalmazható következetesen; mert ugyanabból a közetből eredő talajok, alkatrészeik egymáshoz való viszonyára nézve annyira



különbözhetnek, hogy ez által egészen elütő fizikai tulajdonságokat vehetnek fel. Pl. egy kvarczban és csillámban gazdag, és földpátban szegény gránit, meredek oldalon, köves, kődarás, durva talajt fog szolgáltatni; míg a földpátdús, de kvarcz- és csillámban szegény gránitból csekély lejtősség mellett kevesebb törmeléket tartalmazó agyagtalaj származhatik. Egy csillámtartalmu felzúporfirból, és egy apró szemcsés gránitból ellenben egészen hasonló homokos agyagtalaj származhatik.

Mindazonáltal, amint erről az elmállás folyamatainál meggyőződünk, kétségbe nem vonható, hogy az u. n. eredeti talajoknál az anyakőzet minőségéből értékes következtetéseket vonhatunk le az abból származott talaj vastagságára, anyagaira és termőképességére is és ily talajok megnevezése azok anyakőzete szerint egészen természetesnek látszik. Czélszerű azonban az anyakőzeteket az összetételükre nézve leglényegesebb ásványok szerint csoportosítani, mint ezt Girard tette.

Az üledék-talajokat geológiai korszakok szerint csoportosítani talajtani tekintetben nem okadatolható. Itt hát a beosztást csak a főbb talaj-alkotó anyagok alapján tehetjük.

Ezen elvekre van alapítva Fallou rendszere, mely Girard által módosított és lényegében a következő.

## **A talajnemek felosztása alkalmazásuk szerint.**

### **I. Osztály. Sziklai vagy eredeti talajok.**

1. csoport. Kvarcztalajok. Kvarcz sziklatalaj, kovapalatalaj.

2. csoport. Kvarczkőhomoktalajok. Kváder-, kárpáti, vörös homokkőtalaj; grauwacke homokkőtalaj stb.

3. csoport. Földpátos sziklatalajok. Gránit-, gránulit-, szienit-, felzit-, trachit-, fonolit-, szurokkő- stb. talajok.

4. csoport. Csillámostalajok. Gnájsz\*), csillámpala-, phyllit-, chloritpala-, talkpalatalaj.

5. csoport. Augitos és ámfibolos sziklai talajok. Melafr-, bazalt-, diorit-, diabasz-, szerpentintalaj.

\*) A gnájszot azért sorozzák ide, mert összetételére gyakran, s szerkezetére mindig közel áll a csillámpalához, s abba gyakrabban megy át mint a gránitba.



6. csoport. Agyagközzetalajok. Agyagpala-, grauwackepala-, márgapalatalaj.

7. csoport. Mészkötalajok. Mészkö-, dolomit-, krétatalaj.

## II. Osztály. Üledéktalajok.

Ezek víz által elmosott talajanyagok letelepedése folytán jöttek létre. Ide szokták sorozni, külön osztály kikerülése végett a televénytalamajokat is.

1. csoport. Köves talajok. Kaviestalaj, kődaratalaj.

2. csoport. Homoktalajok. Durva homoktalaj, finom homoktalaj, agyagos homoktalaj stb.

3. csoport. Vályogtalajok. Finom fővenynyel elegyített agyagtalamajok.

4. csoport. Agyagtalamajok. Ezeknél az agyag tulajdonságai tulnyomók. Szivós agyagtalamaj, homokos agyagtalamaj stb.

5. csoport. Márgatalajok. Főalkatrészük a mész által áthatott agyag, vagyis a márga. Mészmárga, agyagmárga, homokos márga.

6. csoport. Televénytalamajok. Televénytalamaj, tőzeg-talamaj, láptalamaj.

Ha az üledéktalamajokat kénytelenek voltunk alkatrészeik szerint felosztani, az a kérdés merül fel, vajon nem lehetne-e ugyanezt az elvet alkalmazni az összes talajnemekre? E kérdésre csak igenlőleg felelhetünk; csakhogv ez esetben a talaj azon alkatrészei közé, melyek szerint a csoportokat képezzük, még a meszet is fel kell vennünk, mely némely sziklai talajban igen jelentékeny mennyiségben van jelen. Eszerint a csoportok megkülönböztetésénél következő anyagok jönnek tekintetbe: 1. kötörmelék a kődara nagyságától felfelé (l. 95. lapon). 2. homok. 3. Agyag. 4. Mész. 5. Televény. De a gyakorlatban megkülönböztetik még a vályogot is (Lehm), mely igen finom fővenynyel úgy szólva átszótt agyagból —, és a márgát, mely finom mészpórral legbensőbben kevert, vagy tán helyesebben szénsavas mésszel átítatott agyagból áll. Eszerint tehát 7 csoportot lehet képezni, melyek mindenike az illető talajanyag oly mennyisége által van jellemézve, mely elegendő arra, hogv azon talajcsoportra saját bélyegét ráüsse, saját tulajdonságait érvényesítse. Ez a mennyisége az illető jellemző talajanyag-



nak, 50 %-on sokszor jóval alább marad, mint ezt a következő, Novacki(ó\*) kölcsönzött, táblácskából láthatjuk.

A talajok csoportjai:

| A talajnemek csoportjai |                           | A jellemző alkatrészek legkisebb mennyisége %-ban közelítőleg |       |       |      |           |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-----------|
|                         |                           | Kövek                                                         | Homok | Agyag | Mész | Tele-vény |
| I.                      | Köves talajok . . . . .   | 80**)                                                         | —     | —     | —    | —         |
| II.                     | Homoktalajok . . . . .    | —                                                             | 80    | —     | —    | —         |
| III.                    | Vályogtalajok . . . . .   | —                                                             | 50    | 20    | —    | —         |
| IV.                     | Agyagtalajok . . . . .    | —                                                             | —     | 50    | —    | —         |
| V.                      | Márgatalajok . . . . .    | —                                                             | —     | 20    | 5    | —         |
| VI.                     | Mésztalajok . . . . .     | —                                                             | —     | —     | 50   | —         |
| VII.                    | Televénytalajok . . . . . | —                                                             | —     | —     | —    | 20        |

Ezek a sulyszázalék minimumok különben kissé önkényesen vannak felvéve; de ez másként nem lehet, mivel valahol a határt meg kell állapítani, jöllehet a természetben épen a talajok összetételében ugrás nincs. A számok egyébiránt úgy értendők, hogy az illető talajcsoport a megnevezett talajanyagot a kitettnél magasabb %-ban tartalmazhatja, de csak bizonyos határig, melynek túllépésével valamely más csoportba megy át. Ez a maximum a táblácskában mellőzve van, mert az a szomszédos talajcsoport minimumával össze esik. Ha pl. valamely agyag és homok keverékéből álló talajban az agyag mennyisége 50 %-nál nagyobb, akkor az már nem vályog többé, hanem agyagtalaj; ha a homok mennyisége ugyanabban 80 %-ot meghalad, akkor már a homoktalajok csoportjába sorozzuk. Tehát a vályogtalajnak agyagtartalma 20 és 50, homoktartalma pedig 50 és 80 % közt változhatik. Ha valamely márgatalajban a mész 5 %-on alól leapad, akkor az átmegy agyag-, vagy vályogtalajba; ha ellenben mésztartalma 50 %-on felül emelkedik, mésztalaj lesz belőle. Ha a talajban a televény-tartalom 20 %-on alul van, akkor csak televényes talajnak mondjuk, pl. televényes homok, televényes agyagtalaj; ha ellenben 20 %-ot elér vagy meghalad, akkor televénytalaj lesz a neve.

\*) Dr. Anton Novacki, Kurze Anleitung zur einfachen Bodenuntersuchung. Zürich. 1885.

\*\*\*) Ebbe az apró törmelék is be van számítva.



Az egyes csoportokba eső talajnemeket az után a valóságban előforduló esetek szerint, vagy a többi, nem lényeges alkatrészek mennyisége, (pl. agyagos homok t.) vagy valamely jellemző fizikai tulajdonsága, (pl. szívós agyag t.), vagy végre sajátos képződése folytán nyert tulajdonságai szerint (pl. lösz, láptalaj s a t.) nevezzük meg.

A talajnemeknek alkatrészeik szerint való csoportosításuk azért is igen előnyös, mert fizikai s részben vegyi tulajdonságaik, tehát termékenységük is főképen ettől függ. Ezért leírásukban is ezen rendszert vagyunk kénytelenek követni.

## II. Fejezet.

### A talajnemek leírása.

#### I. Csoport. Köves talajok.

Ideszámítjuk mindazon, akár sziklai, akár vízhordta talajt, melyben a kövek, kövecs, kődara, s még ennél apróbb kőzettöredékek legalább 80% -ot tesznek ki; a finom föld benne ellenben hiányzik, vagy igen kevés, és legfeljebb 20% lehet

#### I. Alesoport. Törmeléktalajok.

Ebbe az alesoportba tartozik a legtöbb sziklai talaj; így a kvarcsziklából és a számos szilikátkőzetből eredők, melyek ritkán tartalmaznak, legfelsőbb rétegüktől eltekintve, 20% finom földes anyagot, a többi részük homok, kődara, kavicsból és kövekből áll, melyek mindnyájan szögletesek. Ha az ily talaj csillámpalából keletkezett, akkor igen sok csillámhomokot tartalmaz.

De nem minden sziklai talaj tartozik ide. A homokkővek nagyobb részint homokká hullanak szét, a márgakőzet elmállása után márgatalajt szolgáltat; de némely szilikát kőzet is átváltozhatik teljesen agyaggá vagy homokos agyaggá. Ez utóbbi talajok tehát más csoportokba tartoznak.

A törmék-talajok termékenysége általában csekély. A vizet és levegőt könnyen bebocsátják, de előbbi könnyen is átszivárog rajtuk, s mivel rendesen nagyon lejtősek, a csapadékok rajtuk könnyen lefolynak. Ilyen körülmények közt fenékvíztől sem lehet szó. Az átszivárgó vizet részint a törmékes talajágycsoportok bocsátja könnyen át, részint ha rétegesek, és a rétegek iránya lejtős, azon lefelé veszik útjokat. Ásványi alkatrészekben min-



dig gazdagok, a kvarcztalaj kivételével. Termékenységüket az elmállás folyamán képződő finom földes anyag, valamint kiváltképpen az alsóbb és felsőbb rendű növények korhadásából eredő televény fokozza.

Megkülönböztetjük a következő módosulatait;\*)

**Televényes törmeléktalaj.** Szegletes darabokból álló kötőrmelék, kődara és televény keveréke. Hegységekben nemcsak szilikát kőzeteken, hanem mészkősziklákon is gyakori. Különösen ez utóbbi esetben igen száraz; különben is termékenysége alig közepeszerű. Csak erdőnek való. Egyébiránt a 2. és 3. sz. alatti módosulatok is lehetnek televényesek, mely esetben termékenyebbek is.

**Márgás törmeléktalaj.** Az előbbihez hasonló, csak hogy agyagtartalma mésszel van áthatva, tehát higitott sósavban kissé pezseg. Színe rendszeren fehéres sárgás vagy világos sárgásbarna színű. Előfordul gyakran a mészkőzeteken, melyek elmállási származéka.

Ásványilag erőteljes, de termékenységét nagyon csökkenti az, hogy igen száraz szokott lenni. Északi oldalokon sokkal kedvezőbb, mint délieken.

**Meszes törmeléktalaj.** Az előbbitől abban különbözik, hogy földes részeinek mésztartalma az 50 %-ot meghaladja. Annál még melegebb, szárazabb és terméketlenebb.

**Agyagos törmeléktalaj.** Az agyag benne jól kivehető, 5—20 %-ot tehet, de marokba szoritva, a kődara és homok miatt nem áll össze. Hegységi talaj, melynek termékenysége rendszeren közepeszerű. Ez többnyire csak erdőnek használható; de ha szelíd hajlásu, mérsékeltlen legelőnek is.

**Tiszta törmeléktalaj.** Finom földes anyagban legszegényebb (0—5 %). Meredek sziklaoldalokon fordul elő. Ha évszázadokon át a rajta megtelepedett alsó rendű növények, u. m. zuzmók, mohok, s később harasztok s a t. hulladékaiból képződő televény a törmelék közeit kitölti, akkor az egészet mohából s más növényekből álló takaró és végre az erdő foglalja el, mely azonban itt nagyon silányul növekedik; de ha letaroltatik, a terület igen könnyen újból tiszta terméketlen kőgörgeteggé változik.

\*) Az egyes csoportokba eső talajnemek felsorolásánál a termékenyebbekkel kezdjük, s a terméketlenebbekkel végezzük. Ugyanis a talajnál a termékenységet kell rendes (normalis) állapotnak vennünk; a terméketlenséget ellenben rendellenesnek.



## II. Alcsoport. Hömpölytalajok.

Kerekded, vagy legalább lekerekített szélű, kisimitott felületű kavicsból és kődarából áll, mely közé durvább és finomabb homok van keverve, a finom földes anyagok ellenben víz által kimosva. Többnyire folyók völgyeiben, elhagyott folyamagyak helyén; de néha mint más geológiai korszakhoz tartozó képződmény, hegyeken is előfordul. Többnyire kisebb-nagyobb vastagságban később ráhordott iszapréteg borítja, sőt néha csak nagyobb mélységben képezi a talajágyat. Utak kavicsolására kiválóan alkalmas, kemény anyagot szolgáltat.

### Módosulatai:

**Agyagos kavics talaj.** A kavics közeit agyag foglalja el, mely azonban 20 %-on alól marad. Előfordul a folyók völgyében, de ritkán alkotja a felületet; többnyire csak talajágyat képez. Termékenysége mérsékelt vagy csekély. Főképp erdőnek és legelőnek való. Mindezen módosulatok tartalmazhatnak természetesen televényt is, miáltal újabb módosulatok keletkeznek.

**Tiszta kavics talaj.** A finom földes anyag benne 5 %-on alól van; gyakran kődarával s homokkal van keverve. Termékenysége igen csekély, száraz fekvésben erdőnek is rossz, de egyébre még kevésbé való; nedves helyeken gyakran füzesek foglalják el, s fűz vessző termelésére alkalmas.

**Porond-talaj.** Nagyobbára 1—2 mm. vastag porondból áll, a többi részét kődara, kavics és homok képezi, csekély agyaggal és televénnyel. Termékenysége csekély, de nedves helyen a füzek benne elég jól tenyésznek.

## II. Csoport. Homoktalajok.

Így nevezünk minden oly talajt, mely 20 %-nál kevesebb iszapolható földes részt tartalmaz. A többi homok (tágabb értelemben), mely közé egyes esetekben kődara is vegyül. A homokszemek átlagos nagyságukra nézve a legfinomabb fővenytől a legdurvább porondig különbözhetnek. Az iszapolás és a szél által való kiválasztás folytán a terjedelmes lapályok homokja gyakran igen egyenletes; míg a folyami már egyenetlenebb; de legeggyetlenebb, s a kődarába átmenő azon homok, mely homokkőből származott és még az anyakőzetten fekszik.



A homoktalaj a léget és a nedvességet könnyen bebocsátja magába, de magára sem a légnekemre, sem a vízre nézve jelentékeny visszatartó képességgel nem bír. Felső rétege könnyen kiszárad, s a nap hevét elnyelve és újból kisugározva a növények tövét égeti; minthogy a vizet a felszínre nem jól vezeti, alsóbb rétegeiben a nedvesség bizonyos fokát h u z a m o s a n tartó száraz időben jobban megőrzi, mint a napnak kitett agyagtalaj. A felszín felmelegedését a televénytartalom még inkább fokozza. A homoktalaj főképp kvarczzsemekből és csillámlemezkekből áll; azért tápanyagokban annyival is inkább szegény szokott lenni, mert azokat abszorbeálni és visszatartani nem képes. A homoknak ezen sajátosságait a belekevert agyag és televény többnyire előnyösen módosítják; de ezeken kívül mész és vas is szokott a homokszemekhez csatlakozni, azokat kéregképen vonva be. A humusz a homokot feketére, a vas sárgára vagy barnára festi. A mi lapályi homokjaink többnyire mésztartalmuak, bizonyos körülmények közt a talajvízből kicsapódó szénsavas mész (valamint a humuszsavas is) a homokszemeket kövé egyesíti, melyet kisebb-nagyobb lapokban találunk a homok felületén. Ily kérgesedést a homokterületeken azonban a vashydroxyd és a finom televény (humusz-sav) is okoz, ami különösen gyakori eset az észak német lapályokon. Az ily megkérgesedett homok a talaj felszine alatt kisebb-nagyobb, de a gyökerek által még elérhető mélységben összefüggő, és a vizet és a gyökereket átnem bocsátó réteget alkot, melyet réte g k ő n e k (Ortstein) neveznek. Ez az erdő- és mezőgazdaságnak legnagyobb akadálya. A homoktalajok legtöbbször üledéktalajok; mindazonáltal lehetnek sziklatalajok is; azért itt is két alcsoportot különböztethetünk meg.

### I. A l e s o p o r t. Ü l e d é k t a l a j o k.

Televényes homoktalaj. Minden előbb említett homoktalaj tartalmazhat több vagy kevesebb televényt; de fennebbi nevet csak azon esetben kapja, ha humusztartalma 5–10 százalékra emelkedik; amikor aztán nedves állapotban fekete vagy fekete-barna, száraz állapotban pedig barnás-szürke. Jobban megnézve meglátjuk benne a fehér kvarczzsemeket és gyakran ezen kívül apró csigatöredékeket. Meglehetősen termékeny talaj. Ha az ily talaj még jelentékenyebb mennyiségű agyagot vagy



márgát is tartalmaz, akkor termékenységből a többi homoktalajt felül mulja.

**Márgás homok.** Az előbbtől abban különbözik, hogy agyagtartalmát mészhatja át, mely 4—5 %-ra emelkedhetik. Ezért ha egy darabkát hígított sósavba vetünk, jól kivehető, de nem erős, pezsgés áll be. Meglehetősen termékeny, egészséges tevékeny talaj.

**Agyagos homoktalaj.** 5—20 % agyagot tartalmaz, s ezért már összetart ugyan, de nagyobb darabokban rendesen még sem áll össze; mindazonáltal 15—20 % agyagtartalom mellett kiszáradás folytán úgy megkeményedhetik, hogy szántani nem lehet. Ez az előbbénél már tetemesen termékenyebb.

**Közönséges homoktalaj.** Többnyire durvább szemű; nedves állapotban már van kevés összetartása, agyagtartalma 5 %-on alól, de 1—2 %-on felül szokott lenni. A szél játéka rendes körülmények közt nincs kitéve. Nemcsak erdőtenyésztésre, hanem, bár csekélyebb mértékben, a földművelésre is alkalmas. Termékenysége azonban még ennek is csekély.

**Vizenyős homoktalaj.** Vizenyösségét mély fekvése és a vízhatlan talajág okozza, mely néha éppen a homokban képződő rétegek. Ennek ragasztó anyaga itt rendesen vashydroxyd (gyepvaskő, mocsárvaskő). Felső rétege gyakran savanyu, vagy néha szenes, tétlen televényt tartalmaz. Gyakran égerfa erdő fedi. A növénytenyésztés rajta bizonytalan. Lecsapolás által nagymértékben javítható, amit árokrendszerrel és felágyalással\*) szokás itt eszközölni, mert a sovány talaj az alapcsövezést nem fizeti meg.

**Laza homoktalaj.** Oly kevés földes alkatrész van benne, hogy semmi összetartása sincs. Lehet durva, közepszerű vagy finom szemcsés (l. 95. lapon), vagy ezeknek keveréke. Színe legtöbbször szürke, minthogy kvarc és csillámszemecskékből áll, de lehet vashydroxyd által világos, televény által sötét barnára sőt feketére festve. Ide tartozik a szél játékaul szolgáló futóhomok, a nagyon finom szemcsés porhomok, a laza durvahomok sat. melyek csak 0.0—1.0 % iszapolható alkatrészeket tartalmaznak; ha ezek mennyisége szaporodik, akkor a homok megkötődik.

\*) Fekete. A tölgy és tenyésztése, Budapest, 1888. Kiadja az orsz. erdő egyesület. 89. 90. l.



A legterméketlenebb talajok közé tartozik, mely néha egészen kopár, sivatagot alkot. Leginkább erdőnek való, különösen akácznak, erdei és fekete fenyőnek. A mezőgazdaság itt már nem fizet; a legeltetés veszélyes.

## II. Alcsoport. Sziklatalajok.

A homokkőtalaj. Homokkövek elmállása folytán keletkezik, s annak ragasztó szere minősége és mennyisége szerint lehet többé kevésbé agyagos vagy márgás; néha vashydroxyd-tartalma is jelentékeny, 1—3 % -ra mehet. Eszerint tulajdonságaira nézve az előbb leírtak közül vagy a közönséges, vagy az agyagos vagy a márgás talajjal egyezik meg, s a szerint termékenysége is különböző.

Csillámhomoktalaj. Ritkán fordul elő és csak kis területeken, csillámpala hegységekben, ahol teknős mélyedésekben vagy a vizmosások aljában halmozódtak össze a csillámlemezek. Csak erdőnek szolgálhat talajul. Igen laza, gyökerek jól bele nem fogózkodhatnak. Termékenysége csekély.

## III. Csoport. Vályogtalajok.

Vályogtalajok (Lehmböden) alatt kell értenünk azon talajokat, amelyek 20—50 % legalább a felületen vaséleg által többé kevésbé festett agyagot és 50—80 % homokot tartalmaznak; mely utóbbinak egy része oly finom főveny, kovapor vagy más finomra osztott ásványianyag, melyet az agyagból iszapolás által külön választani nem lehet. Ezen kívül többnyire kevés, legfeljebb 5 % -ig emelkedhető és az agyagot átható szénsavas mésszel és kisebb-nagyobb, mennyiségű televénynyel vannak elegyítve.\*) He- egyes vidéken rendszeren kötörmelékkal van keverve.

Homok- s esetleg törmeléktartalma tehát utat nyit a gázok és folyadékok behatolásának, míg finom föld tartalma megköti

\*) Egyébiránt arra nézve, hogy mennyi homokot és agyagot kell a vályogtalajnak (Lehmboden) tartalmazni, eltérők a nézetek; Dr G. Heyer pl. azt mondja, 30—50 agyag, legfeljebb 5 % mész, s a többi homok; Ömler 26—60 % agyagot, 40—70 % homokot vesz fel, Segniz ellenben 8—30 százalékban állapítja meg az agyagtartalmat. Minthogy a homoktalajnál az agyag maximumát 20 % -ra tettük, ennyire kellett tennünk a vályognál a minimumot, mert a határoknak valahol érintkezniök kell.



azokat. A vályogtalaj ezen kívül többnyire mély is szokott lenni; s mindezen tulajdonságainál fogva a legjobb talajok egyike.

A vályogot az agyaggal könnyen össze lehet téveszteni; azért megkülönböztető jeleit ismernünk kell. A vályog nem zsiros tapintatu; körömmel megsimitva felülete nem lesz oly fényes, mint az agyagé és kiszáradva nem apad össze annyira. Gyurhatósága is jóval csekélyebb. Nagyobbára üledék talaj, de némely sziklai talaj is ide tartozik.

Termékenységük foka szerint következő nemeit különböztethetjük meg:

A televényes szelid\*) vályogtalaj. Benne 5—10 % televény van, mely porhanyóvá teszi. Sok úgynevezett „fekete föld” ide tartozik. Lapályokon, kivált folyók kiöntési területein gyakori, de másutt is előjő. A legtermékenyebb talajok közé tartozik, mely a földművelés minden ágára alkalmas.

A löszszerű vályogtalajt nagy mennyiségű finom homok, mésztartalom, kövek hiánya és sajátos szerkezete (lásd 72., 73. lapon) jellemzi. Termékenysége kitűnő, ásványi anyagokban az előbbinél rendesen még gazdagabb. Alföldünk szélein belmedenczékben (Erdélyi Mezőség), dombos vidékeken gyakori.

Közönséges vályogtalaj, 30—50 % iszapolható fővenyes agyagot tartalmaz, 50—70 % homokkal. Benne az agyag és homok tulajdonságai a legszerencsésebb viszonyban vannak érvényesítve. Helyes trágyázás mellett igen termékeny. Mindenféle gazdasági növény és a talaj igényesebb erdei fák tenyésztésére alkalmas.

Szivós vályogtalaj. Agyagtartalma 50 % sőt ezt meg is haladja, mi által az agyagtalajba megy át és tulajdonságaira nézve ahhoz közel áll.

Homokdús vályogtalaj. 70—80 % homokkal, minélfogva a homok tulajdonságai benne már kezdenek tulnyomók lenni és az agyagos homoktalajba megy át. Fizikai tulajdonságaira nézve az előbbinél kedvezőbb.

Köves, kődarás, porondos vályogtalaj. Kő, dara, porond, homok benne 70—80 %-ot, az agyag 20—30 %-ot tesz ki. A hegyi talajokban, melyek sziklák elmállása folytán keletkeztek, nevezett törmelékek minden arányban lehetnek keverve

\*) Szelid (mild alatt értjük itt a szivósnak, kötöttnek, terméketlennek ellenkezőjét.



egymással, s a töredékek szegletesek: ellenben az üledéktalajban a kavics, dara és porond-szemcsék le vannak kerekítve és koptatva. Ha a kavics tulnyomó, s az apróbb törmelék háttérbe szorul, akkor kavicsos vályogtalaj, ha a dara vagy porond tulnyomó, darás vályogtalaj, porondos vályogtalaj származik. Ezen talajnemek tehát egyrészt az agyagos törmelék-talajhoz, másrészt pedig az agyagos porondtalajhoz képeznek átmenetet. A közönséges vályogtalajnál soványabbak; különben erdőnek, legelőnek, sőt kedvező fekvés mellett rétnak és szántónak is alkalmasok, ámbár csekélyebb sikerrel, mint előbbieik.

Vizenyős vályogtalaj. Ha a talajagy a vizet át nem bocsátja, minden vályogtalaj lehet lapályos helyen vizenyős. Benne gyakran mocsárvas képződik. Igen terméketlen, de lecsapolás és alagsővezetés által javítható.

#### IV. Csoport. Agyagtalajok.

Az agyag színe rendszeren fehéres, kék, szürke; ha humusszal keverve van fekete, vaséleghydrattal festve sárga vagy vörösbarna. Tapintata zsíros, nyelvhez tapad, rá lehelve sajátságos szagot terjeszt. Körömmel fényesre simítható. Ha kiszárad nagyon összeapad, nagy repedéseket kap; néha keménynyé lesz; nagyon nehezen munkálható. Megnedvesítve gyurható, a szerszámokhoz tapad, sok vízzel péppé olvad szét.

Agyagtalajnak nevezünk minden talajt, mely a kődara és kavics kizárása után legalább 50%, iszapolás által külön választható, fennebbi sajátságokkal felruházott, agyagot tartalmaz. Ezen kívül kisebb-nagyobb mértékben előfordulnak benne, s módosítólag hatnak tulajdonságaira a homok, mész, vas és a humusz.

Az atmoszférái csapadékot nem veszi fel a felülete gyorsan, de annál jobban visszatartja azt. Abszorbeálási képessége légnemekre, vízgőzre és tápoldatokra nézve kitűnő; de kiváltképen ha a tulságos nedvesség likacsait elzárja, benne a légsere, s így az oxygenfelvétel akadályozva van. Ennélfogva gyakori meg-lazítása igen előnyös, de annál nehezebb munka. Leginkább a síkföldön van elterjedve, de a hegyes vidékeken sem ritka. Majd mindig vizek iszapolási terménye, azaz üledéktalaj. Ide tartoznak a következők:



Televényes agyagtalaj az, mely 5—10%, sőt néha még több humuszt tartalmaz. Színe a setétbarnától a fekete barnáig változik. Ha kevés benne a fővény, akkor megmunkálása nehéz. Ide tartozik az alföldön sok helyen elterjedt fekete agyagtalaj. Igen termékeny.

Mésztartalmu agyagtalaj. Az agyagot átható, 3—4% mésztartalma jellemzi. Higitott sósavban kissé felpeszdül. Mésztartalmánál fogva kevésbé szívós és a morzsalékos szerkezetet könnyebben felveszi, mint a közönséges agyagtalaj; a humuszt és trágyát is könnyebben bontja fel. Ha mésztartalma 5%-on felül emelkedik, az agyagos márgatalajba megy át.

Közönséges agyagtalaj. Ebben az agyagtartalom 60—75%. Mind a mezőgazdasági növények, mind az erdei fák meglehetősen jól tenyésznek benne.

Szívós agyagtalaj. 75—90% agyaggal. Ez még szívósabb és megmunkálása, melyet különben nagy mértékben megkíván, még nehezebb, mint a közönséges agyagtalajé; vizenyősségben is inkább szenved mint az és azért benne a vasiszap-leakódás is gyakori. Inkább rétnek való, mint szántóföldnek. Az erdei fák benne rosszul növekednek, csekély magasságot érnek el, mert gyökereik elég mélyre bele nem hatolhatnak.

Vizenyős agyagtalaj. Mélyebb helyeken, vizet át nem bocsátó talajágyon. Gyakran vasiszap-leakodással. Néha zsiros, sikk agyag; máskor sovány, mintegy 50% finom fővennyel. Rosta talaj, mely lecsapolás által javítható; de gyakran nem fizeti ki.

Tiszta agyagtalaj. 90%-nál több benne az agyag; földmívelésre s erdőtenyésztésre nagy szívósságánál, tömörségénél és megdolgozása nehézségénél fogva már nem alkalmas. Téglá, alagsövek s edények készítésére szolgál. Tógátak építésénél a víz elzárására igen keresett anyag.

### Függelék:

Székes talajok. Hazánk síkjain elég gyakoriak. Összetételüknél, névszerint agyag és fővenytartalmuknál fogva az előbbi csoportokba kellett volna szétosztanunk; de ez nem lett volna helyes mert sőtartalmuk mindnyájokkal közös —, és a növénytenyésztésre nézve felette jellemző tulajdonságokkal ruházta fel őket.



A székestalaj (szék, széktalaj) Kvassay Jenő\*) szerint egérszürke, igen kötött talajnem, 50—80 % felette finom kovaliszttal; 20—40 % agyaggal és a vízben oldható sóknak nagy mennyiségével, melyek közt a szénsavas nátrium a leggyakoribb ugyan, de ezen kívül a konyhasó, s a káli és nátronnak más oldható összeköttetései is előfordulnak. Szénsavas mész és magnézia tartalma különböző.

Ha megszárad, keménységre nézt úgy látszik minden más talajt felülhalad (aczéلكeményységűnek mondja néha a nagyító népies szójárás); nedves állapotban összefoly, s valóságos pépet képez. Mindazonáltal megüledett, megdolgozatlan állapotban a vizet igen nehezen veszi magába, úgy hogy felületén pocsolyák képződnek; egyes ily pocsolyák feneke padlókeménységű és a kocsikerék alig süllyed be a sárba 1—2 cm.-nyire. Ahol a felületen évek hosszú sora alatt megtelepedett gyepet a marha vagy kocsikerék felvágja, a szikes víz a talaj színét eléri s a humusz hiányzik, ott a terméketlen, szürke szék fehérlik ki, melyet a nép vakszéknek nevez. Az átmenet a vakszékéből a növényzettel borított székbe patkaszerűleg történik, miért is az ily talajt némely vidéken patkás széknek is nevezik. Némely mélyebben fekvő területet a szik- s más sókkal többé-kevésbbé telített víz oly gyakran ellep, hogy azon a növényzet meg sem telepedhetik; de néhány cm.-nyi emelkedés gyakran már elegendő, hogy a kilugzás folytán megszeliđült talajon bizonyos növényzet megtelepedhessék.

A sókkal kevésbbé átitatott és művelés alá vehető talajt a nép szeliđ széknek, s ha televény által fekete színt vesz fel, fekete széknek nevezi.

A sziksó vagy széksó eredetileg nem jelentett egyebet, mint a székes talaj felületén kivirágzott s ott összesepert söt, később kizárólag a szénsavas nátronra lett e kifejezés szorítva. E sók mindenesetre tengeri eredetűek, épúgy mint a kősó, chlorcalium s mások, melyek azonban a szénsav, légsav stb. hatása alatt átváltozást szenvedtek.

\*) Mezőgazdasági vízműtan, 1881. II. köt. Átvéve az Erdészeti Lapokból. 1881. foly. III. f. 193. l. E talajnemet époly joggal sorolhattuk volna az előbbi csoporthoz is.



A székes talaj a Tisza mindkét oldalán, de annak partjaitól bizonyos távolságra, sokszorosán megszakított szalagban húzódik Tokajtól Titelig; de egyszersmind a Berettyó, Körösök, Maros és Temes mentén is megtaláljuk azt. E terület felsőbb részén, különösen Szaboles és Hajdumegyében gyakori a kálisalétrom, melyet az u. n. salétromszérűken gyűjtenek, s mely amint ismeretes, mint ásványi trágya is igen értékes; a Tisza vidékén ellenben a nátronsók lépnek fel túlnyomólag.

Ezen sók, természetesen más, u. m. homokos talajokban is előfordulhatnak, amidőn ezeket, a bennök nagy mértékben előforduló sziksó miatt szikes talajoknak nevezik.

E szerint van szikes homok, szikes agyag, stb. talaj is.

Azon talaj, melyet a fenékvíz által feloldott sók oly nagy mértékben járnak át, mely a talaj abszorbeáló képességét (lásd fennebb 172. l.) messze túlhaladja, nem alkalmas az erdőmivelésre; a mérsékelt szikes talajban azonban némely pázsítfélék, pl. a *Glyceria maritima*, igen értékes takarmányt szolgáltatnak. A szelid és a fekete szék pedig épen nagyon kedvelt buzatalaj.

A vakszék termékennyé tételére nézetünk szerint nincs más mód, mint a felágyalásos megművelés (Rabattencultur); mely szerint t. i. a terület széles árkok által táblákra osztatik; az árkokból kihányt föld a táblák emelésére fordittatik, s ha egy pár év alatt a légköri csapadékok kilugozták, beültethető vagy begyepesíthető.

## V. Csoport. Márgatalajok.

Ide számítunk minden oly talajt, mely 5—50%, szénsavas mésszel legkisebb részeeskéiben áthatott agyagot tartalmaz. Különben ugyan-ily tulajdonságú talajok tartalmazhatnak 50%-nál több meszet is, de a fennebb már elfogadott határszámnál fogva ezeket a mésztalajokhoz fogjuk számítani. Ellenben a márgatalajokhoz fogjuk számítani azon mészkő- (szikla-) talajokat is, amelyeknek finom földes anyagában a mésztartalom az 50%-ot túl nem haladja, mert az ily talaj márgatermészetén a benne előforduló kötőrmelék nem változtat.

A márgában a mészhez gyakran még jelentékeny mennyiségű szénsavas magnézia csatlakozik. A márgatalajok ezenkívül



homokot mindig, s vasoxydot is gyakran tartalmaznak. Aszerint amint mésztartalmuk apad, s agyag- vagy homoktartalmuk emelkedik, a márgás agyag-, illetve homoktalajba képeznek átmenetet. Mészközeteken pedig átmehet e talaj a márgás törmelék- talajba. A márgatalaj legtöbbször márga- és némely mészdús tályogtelepekből veszi eredetét; gyakori azonban agyagtartalmu mészközeteken is; sőt származhatik az által is, hogy az agyagtalajon átszivárgó szénsavas mészoldatból előbbibe lassanként több-több mész rakódik le.

A márga porrátorve és sósavval leöntve, minden részecskéjében egyenletesen pezsdül fel. Néha lemezes, néha törmelékes vagy poralaku. Utóbbi esetben megnedvesítve jól összeáll; de ha megszárad újból apró darabocskákra hull szét. Azért igen porhanyó; de ha nagyon sok agyagot tartalmaz, akkor nedves állapotban a megdolgozásnál ragad. Színe szürke, szürkés sárga, barna vagy vöröses. Ásványi tápanyagokban gazdag. Abszorbeáló képessége gázokra, vizgőzre és tápoldatokra nézve igen jelentékeny. A televényt és trágyát könnyen bontja; vastartalma ártalmassá nem válhatik, minthogy itt oldható vassók nem képződhetnek. E miatt, valamint aránylag nagy phosphortartalmánál fogva a legegészségesebb, legjobb talajt szolgáltatja.

Megkülönböztetjük következő módosulatait:

**Televényes márgatalaj.** 5—10 % televénynyel. Megdolgozása könnyebb és fizikai tulajdonságai kedvezőbbek, mint a televényes agyag, vagy televényes vályogtalajnak, melyekhez annál jobban közeledik, mennél kevesebb benne a mész; de a különbség a termékenységben a márga javára annál nagyobb lesz, mennél nagyobb mésztartalma.

**Lőszmárga talajnak** azon lősz-t nevezzük, melynek mésztartalma 5 %-ot meghalad. Különben fizikai tulajdonságaira nézve avval megegyezik; de még termékenyebb, mint a közönséges lősz.

A **közönséges márgatalaj** 10—30 % szénsavas meszet tartalmaz, s benne sem a homok, sem az agyag 50 %-ot meg nem halad.

**Vályogmárgának** azt nevezzük, mely összetételére nézve a vályogtalajtól csak nagyobb mésztartalmával különbözik. Termékenységre nézve ennél magasabb fokon áll.



Agyagmárga az, melyben az agyag az 50 %-ot meghaladja. Ha mésztartalma körülbelül 5 %-ra leszáll, át megy a márgás agyagba.

Mésmárga az olyan, melynek mésztartalma a 30 %-ot jóval meghaladja s így fizikai tulajdonságaira nézve a mésztalajokhoz közeledik. Ha az ily, különben márgatermészetű talajban a finom földesanyag mésztartalma az 50 %-ot meghaladja, akkor a tulságos mésztartalom kedvezőtlen befolyása annyira tulsulyra vergődik, hogy gyakorlati szempontból helyesebbnek tartjuk az ilyet már a mésztalajokhoz számítani.

Homokos márgatalaj az, melyben a márgatartalom 20—30 %-ra süllyed, a többi 70—80 %- pedig a homokra esik; aminélfogva termékenysége a közönséges márgatalajéhoz képest tetemesen csökken.

Köves, kődarás, porondos márgatalaj. Hasonlít a köves, kődarás és porondos vályogtalajhoz, csak hogy itt az agyagot 20—30 %- márga helyettesíti. A közettöredékek lehetnek hőmpöly természetűek, vagy szögletesek. Utóbbi eset a mészközetekből eredő sziklatalajoknál fordul elő és mészkőhegységekben elég gyakori. Az ily talajnak termékenységét a közettörmelék jelentékenyen csökkenti és a növénytermelésre ily talajon különösen a tartós szárazság nagyon káros. A gazdasági növények közül csak a melegt szerető és a szárazságot tűrők valók az ily talajra verőfényes oldalakon; az erdei fák közül leginkább a feketefenyő, erdei fenyő, molyhos tölgy és virágos kőris.

Az előbbivel rokon a dolomitos márgatalaj, melyben sok a dolomitközet törmeléke, s így szénsavas mágnézia tartalma nagy. Agyagtartalma dolomitból és dolomitos mészközetekből ered, s a dolomitos mésztalajba megy át.

## VI. Csoport. Mésztalajok.

Ide számítjuk azon talajokat, melyek földes részeinek mésztartalma az 50 %-ot meghaladja. Sok idetartozó talaj ezenkívül még apróbb vagy durvább törmelék alakjában sok meszet tartalmaz. Az ily talajokat arról ismerhetjük meg, hogy higitott sósavval kezelve erős és tartós pezsgést mutatnak. Az egyes pontokon fellépő még erősebb pezsgés mészkőtörmelék darabkákból, szemcsékből ered. A sok meszet tartalmazó márgafajokból az



által különböztethetjük meg, hogy higitott sósavban nagyobb részük feloldódik, tehát a kiszáritott maradék sulya a feloldásnak alávetett föld sulyának felét sem teszi ki.

Mennél inkább meghaladja a talaj mésztartalma a márgatalaj mésztartalmának felső határát (maximumát), annál inkább eltérnek tulajdonságai a márgatalajtól. Ha az 50 és 70% közt áll, akkor bizonyos esetekben a termőképesség a márga talajéhoz közel áll; ha ellenben 80%-ot meghalad, akkor a talaj igen száraz, forró, a trágyát és humuszanyagokat igen gyorsan bontja és ezek miatt termőereje mindinkább csökken, sőt a terméketlenségig lepadhat.

Különben a mérsékeltbb mésztartalmu mésztalajok kivált a nap hevének kevésbé kitett fekvés mellett, jók, ásványi anyagokban gazdagok; a rajtuk termesztett növények egészségesek, a fűvek jó takarmányt adnak, a szemtermés tömött. Mennél több a mésztalajban az agyag és televény, annál termékenyebb az. A jó mésztalajon tenyésző növényzet époly változatos, mit a márgán. A fekete, erdei és vörös fenyő ezen talajon adja a legbecesebb fát, melynek értéke az agyagos talajon nőttét kétszeresen felül mulja. A legtöbb talajtápanyagot kívánó bükk, berkenyék stb. igen jól nőnek a jó mésztalajban; melegebb oldalakon jellemző rá nézve az erdei fák közt a molyhos tölgy és virágos kőris. De nem szabad felednünk, hogy a fák növekvése csak elegendő mély talajban kielégítő. A talaj mélysége pedig épen a mészkősziklán szokott leggyakrabban csekély lenni, ami igen sokszor a teljes terméketlenségig fokozódhatik.

Megjegyzendő, hogy a mészkősziklákon fekvő talajok a fennebb elfogadott beosztás szerint nem tartoznak mind a mésztalajokhoz; mert ha a törmelék tartalom a 80%-ot meghaladja, akkor már törmelék talaj a neve, mely lehet meszes, márgás vagy agyagos; ha a törmelék 80%-on alól van, lehet a mészkő sziklai talaj, mely a nevezett közet elmállásából eredett, márga, sőt vályog vagy agyagtalaj is, ha t. i. a finom földes részekből a mész annyira kimosódott, hogy a talaj ebbeli tartalma még az 5%-ot sem éri el. Ez első tekintetre nem látszik valószínűnek, de tényleg nem oly ritka eset, mint az ember gondolná. Mindezen mészkő talajokat azonban jelentékenyen módosítja azon körülmény, hogy kivált a talaj legalsó rétegében több vagy kevesebb, de nagyobbára jelentékeny mennyiségű mészkőtörmelékét tartal-



maznak és ágyuk a vizet könnyen elivó repedezett mészkőből áll; azért mindig szárazabbak és melegebbek, mint a hasonló anyagból álló, de más ágyon fekvő talajok. Ezenkívül a mészkő sziklákon a talaj mélysége rendszeren nagyon csekély, oldalos helyeken könnyen felvágja a marha lába, lehordja a víz, sőt a szél is. Termékenysége, kivált déli fekvés mellett csekély, csak is erdőnek való, rajta a legeltetés a talaj lekopását vonja maga után, s kezelése az erdész részéről legnagyobb vigyázatot és kiméletet igényel. Ily kopár területek beerdősítése a legnagyobb nehézségekbe ütközik (Karst.)

A tulajdonképeni mésztalajok közt a következőket különböztetjük meg:

**Televényes mésztalaj.** Leginkább erdőkkel borított mészhegyeken fordul elő, hol az erdei fák lehullott lombjából képződött televény a mészkőtörmelék közeit a mállás útján szárazmazó meszes földdel együtt tölti ki. Vastagsága mindig csekély. Feltétlen erdő talaj, miután bármely más gazdaság mellett elemezszik, elsorvad humusztartalma.

**Agyagos mésztalaj.** A mész mellé még 30—50 % agyag csatlakozik, mi által a talaj száraz és forró természete mérséklődik. Ez is többnyire feltétlen erdő talajt képez, s csak is jelentékenyebb mélység és laposabb fekvés mellett használható gazdasági növények alá.

**Vályogos mésztalaj** a neve annak, mely a részint földes, részint törmelékszerű meszen kívül 30—50 % más anyagu homokkal kevert agyagot tartalmaz. Laza, meleg, de a nedvességet jobban tartja, mint a tiszta mész talaj. Termékenységre nézve ez és a vályogos márgatalaj közt áll. Fekvés szerint lehet feltétlen erdő talaj, vagy gazdasági célokra is alkalmas, mint előbbi.

**Homokos és porondos mésztalaj.** Mésztartalma mellett 15—20 % kvarcshomokot, porondot (sőt kavicsot is) tartalmaz. Sovány, forró, száraz. Erdei, fekete és vörös fenyőnek még alkalmas; csekély lejtés mellett juhoknak való legelőt szolgáltat.

**Köves mésztalaj.** Mészközeteken gyakori, földes részein kívül 70—80 % mészkőtörmelékot tartalmaz. Száraz, forró, meglehetősen terméketlen s a mészkőtörmelék-talajba megy át. Fekete fenyőnek, erdei és vörös fenyőnek való. Gyakori rajta déli oldalakon a molyhos tölgy és virágos kőris. Fanövekvés igen gyenge.



Tiszta mésztalaj. Ez majd egészen mészporból áll. Csak kréta kőzetén, valamint nagyon sok meszet tartalmazó vizek lerakódásaként tavak fenekén, mint mocsármész fordul elő, s utóbbi esetben a víz lecsapolódása után a felszínre kerül. Néha tőzeg fedi. Termékenysége csekély vagy igen csekély. Mészben szegény talajok javítására alkalmazható.

Függelékkepen megemlítjük még a gipsztalajt, mely a hasonnevű kőzet elmállásából származik. Igen terméketlen; de mint értékes ásványi trágya — és az állati trágyának szagtalanító és ammoniák-kötő szere, igen értékes.

## VII. Csoport. Televénytalajok.

Minden jó talajban van több vagy kevesebb televény. Ez minden ásványi talajt javít, ha avval keverve van. A talaj televénytartalmának következő fokait lehet megkülönböztetni:

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| televénymentes . . . . .            | 0 %     |
| televényben szegény . . . . .       | 1—2 %   |
| televénytartalmu . . . . .          | 3—4 %   |
| televényes . . . . .                | 5—10 %  |
| televényben gazdag . . . . .        | 10—15 % |
| televényben nagyon gazdag . . . . . | 15—20 % |

televénytalajnak végre csak az olyat nevezzük, melyben súly szerint legalább 20 % humusz van. Minthogy a televény fajsúlya az ásványi talajéhoz körülbelül úgy áll mint 1 : 2·5-hez. ebből következik, hogy 20 súlyszázalék televény mintegy 50 térfogat-százaléknak felel meg. A televénytalajnak tehát térfogatra nézve legalább 50 % -át televény alkotja. Tisztán talajtani tekintetben a tőzeg sem egyéb televénynél, mely vízi növényekből, és a légnek a víz által többé kevésbé való elzárása mellett képződött, s azért szabad humuszsavat is szokott tartalmazni.

Amily kívánatos a televény, ha ásványi alkatrészekkel, u. m. agyaggal, homokkal, mésszel van keverve, époly hátrányossá válik lazasága miatt a valódi televénytalaj, mely többnyire csak kis területeken fordul elő. Az ily talaj túlságosan laza és könnyű lévén, benne a gyökerek nem állanak szilárdan, fekete színénél fogva felületét a napsugarak erősen felmelegítik, ellenben éjjelenként nagyon kihűl; a csirázó növények a legfelső rétegben könnyen kiszáradnak, az apró csemetéket és a téli vetést a fagy



könnyen kihúzza, mert az ily talaj annyi vizet képes felvenni magába, hogy annak folytán felpuffad, s a felső réteg a megfagyás által a növényekkel együtt jelentékenyen felemeltetik. Külömben egyéb tulajdonságait a televénytalaaj a humusz minőségétől kölesönzi (lásd 81. és köv. l.) A korhadás terményeinek jelentőségéről fennebb (85. és k. lapokon) már bővebben volt szó. Itt csak a humusznak vízfeltevő és visszatartó, valamint nagy abszorbeáló képességét a légnemekre és oldatokra nézve, emeljük ki.

Mint a televénytalaaj gyakrabban előforduló és viszonyaiból könnyen felismerhető féleségeit, megkülönböztetjük:

Az erdei televénytalaajt. Ez az erdőterület mélyedéseiben, teknős helyein víz által összehordott, többnyire szelid televényből áll (l. 81. lapon), mely az erdei fák évenként lehullatott lombjából és más hulladékaiból, továbbá mohából s az erdő félhomályában tenyésző mindenféle növényzetből képződött. Magasabb hegységekben, a lúczfenyő régiójában, valamint az erdő nedves helyein több vagy kevesebb humuszsavat is tartalmaz, amikor e tekintetben a moha- és zsombéktelevényhez közeledik: továbbá a fenyvesekben néha jelelmentékeny mennyiségű gyantát is tartalmaz, amikor az u. n. hanga-televényhez lesz hasonló.

A gyep televény a folyók széles és sík völgyeiben, kellő de nem tulságos nedvesség mellett, jó féle, u. n. édes pázsítfüvekből képződik, s időnként beiszapolásnak van kitéve. Ha a beiszapolás gyakran ismétlődik, átmehet televényes vályogtalaajba; de televényes agyag vagy homoktalaajba is. Igen termékeny s a legjobb rétek (kaszálók) vannak rajta.

Zsombéktelevény. Álló sekély, gyakran mészben bővelkedő vizekben, mocsarakban, mélyedésekben, elhagyott vízmedrekben, lassan folydogáló, majdnem álló vízerekben, a folytonos nedvességtől majd mindig vizenyős területeken képződik mocsári és vizenyős talajt kedvelő növényekből, milyenek a sás, káka, nád stb., melyek a zsombékokat szokták alkotni. Ezeken kívül a közöttük buján tenyésző mindenféle más vízi s részben vízen úszó növények, meg apróbb mohok, (főkép Hypnumfajok) szolgáltatják az anyagot az ily televény (tőzeg) képződéséhez. A zsombéklápok közepe mindig mélyebben fokszik széleinel és gyakran tiszta vztükörbe megy át. A képződő televényréteg ritkán haladja meg a 40—50 cmt. Tömött, földes vagy iszapos, setét színű; benne



aránylag kevés a jól felismerhető növényrost. Humuszsavtartalma aránylag nagy; de fenekén mégis gyakran találunk mészerakodást (mocsármész), ha a víz mésztartalma igen nagy. A zsombéktelevényen gyakran találunk égerfát és fűzeket (néha nyírt és erdei fenyőt is). Lecsapolva és homokkal, márgával meghordva, feltöltve és vegyítve, kiszáritva igen termékeny.

A mohatelevény. Többnyire az előbbi felett, de mészmentes vagy legalább mészben szegény vizek hatása alatt képződik. Amíg a zsombékláp felületét a mésztartalmu víz nedvesíti, addig a mohatelevény (mohatőzeg) képződése lehetetlen; ha azonban a zsombéktőzeg annyira emelkedett, hogy már csak a hajcsővesség útján felemelkedő vizek és a légköri csapadékok tartják nedvesen, megtelepednek a tőzegmohák (főképen *Sphagnum*fajok), melyek szára alól elhalva, felül gyökhajakat bocsátva tovább növekedik. A mohatőzeg finomrostu vagy összekőczosodott könnyű, világosabb vagy sötétebb barna anyag, mely megszáradva lánggal vagy senyvedve ég. Vastagsága elérhet 4–5 métert is. Gyarapodása vastagságban 100 évenként 0,5–1,5 méter, de néha több is. A mohatőzeg-terület felülete domboru, azaz közepén legmagasabb, mely egyik megkülönböztető jele. Ha egész vastagságában átmetszük, fenekén megtaláljuk a zsombéktőzeget, melyen felépült. Képződhetik azonban erdei televényen is, de ilyenkor vastagsága csekélyebb szokott lenni. Hazánkban leginkább a magas hegységekben találjuk. A fák közül megtelepednek rajta némely fűzek, égerfák, a molyhos nyír és cserjés nyírek, mocsári fenyő (*Pinus uliginosa*) és az erdei fenyőnek egy törpe alakja.

Nedvességénél, savanyúságánál, szivacsosságánál és ásványi anyagokban való szegénységénél fogva a mohatelevény-talaj még sokkal rosszabb a zsombéktelevény-talajnál. Csak víztelenítés és elégetés által lehet a talajt ily helyen némileg használhatóvá tenni. Különben némely vidéken a tőzeg elég értékes tüzelő anyag, s így kiaknázása magát megfizeti.

A hangatelevény is a savanyutelevényekhez tartozik, de különbözik a zsombék- és mohatelevénytől nagyobb gyanta- és viasztartalma, valamint fizikai tekintetben szárazsága által. Szerkezetére nézve laza, morzsás, vagy poros (poros televény); színe száraz állapotában barna, feketebarna vagy feketés szürke;



nedves állapotában fekete. Főképen hangából (*Calluna vulgaris*) képződik, mely Éjszak-Európa homokos pusztáin sok helyen tömött fedi a homoktalajt; de nálunk is, kivált az ország nyugati részein és kvarczban gazdag talajon elég gyakori növény. A televény e faja azonban néha a zsombék- és mohatelevény tetején is képződik, az ott megtelepedő hanganövényzetből. Rendszeresen csak 10—20 cm. vastag réteget alkot. Termékenysége igen csekély. Rajta az erdei fenyő, nyír és nyár is igen gyengén tenyészik; s más talajigényesebb fának épen nem való. A mezőgazdák elégetés és márgával, agyaggal, fahamuval és ganajjal való trágyázással javítják az ily, rendszeren homokos ágyu talajt annyira, hogy azt mezőgazdaságilag mivelhessék és használhassák.

### III. Fejezet.

## A talajnemek megvizsgálása.

### A talaj termőképességének meghatározása.

Mezőgazdasági munkákban gyakran találkozunk a talaj osztályozásának kísérletével gyakorlati szempontok szerint; találunk utasításokat, a talaj jóságának, termőképességének becslésére, a talaj egyes sajátságai meghatározása és egymással, valamint a klímái viszonyokkal való összehatásuk megítélése alapján. Ámbár a talaj jósága megítélésének ezen módja a mezőgazdaságban is nagyon hiányos; de még kevésbé alkalmazható az erdőgazdaságra, kiváltképen hegyes vidéken, ahol annyiféle talaj, oly változó mélységgel, oly különböző tenger feletti magassággal, oly változatos kitettséggel (*expositio*) és lejtési fokkal fordul elő gyakran kis területen. Ennélfogva legbiztosabb következtetést vonhatunk a termőhely jóságára nézve, a talaj által okszerű kezelés mellett bizonyos időn át hozott termékek mennyiségéből. Ez azonban nemcsak a talaj termőerőinek, hanem ezeknek a klímában rejlő termőerőkkel való közreműködésének az eredménye, s így ezek összeségének lehet mértéke. Ha több talajt egymással akarunk összehasonlítani e tekintetben, akkor csak ugyanazon fekvés és klíma, ugyanazon gazdasági növények, erdőszetnél ugyanazon fánem és kezelés mellett nyert eredmények összehasonlítása által állapíthatjuk meg azon talajok termőképességének fokát. Mivel azonban a



gyakorlatban mindig csak a termőhely minősége jó kérdésbe, melyben a talaji és klimai termőtenyezők egyesülnek: az azon okszerű kezelés mellett évenként létre jövő termés, erdőnél az u. n. átlagos évi növedék szolgál a termőképesség mértékéül.

Ha valamely talajt erdő nem borít, vagy olyan áll rajta, mely rossz kezelésben részesülván, irányadóul nem szolgálhat: akkor mégis kénytelenek vagyunk a talaj minőségét számba venni, s a hasonló viszonyok közt lévő, hasonló vagy tulajdonságaiban ahhoz legközelebb álló, erdővel borított talaj termőképessége szerint ítélni meg az erdőtlen vagy hiányos kezelet alatt álló talaj jóságát.

Az erdőtalaj jóságának ilyen alapon való meghatározása tehát erdőbecslési munkálatokkal van egybekötve, s ezért az erdőbecsléstan körébe tartozik.

Ha termési adataink nincsenek, nem marad egyéb hátra, mint a talaj mindazon viszonyait megvizsgálni, melyek annak jóságára befolyással vannak, s azok egybe vetése által alkotnunk magunknak fogalmat, annak termőképességéről.

A legtöbb esetben a talaj minőségéről már beható helyszíni szemle által is elég helyes ítéletet hozhatunk; ez tehát legelső és multhatatlan teendőnk; de néha ezen kívül még szobai vizsgálatnak is alá kell vetni a talajt, kiváltképen akkor, ha alkátrészeinek egymáshoz viszonyáról pontosabb adatokat akarunk szerezni, amit a helyes osztályozás is gyakran megkíván.

### Talajvizsgálás a helyszínen.

Minthogy a fekvés egyes tényezői első sorban a növénytermelésre közvetlen, — de ezen kívül az elmállásra, televényképzésre és különösen a talaj nedvességi viszonyaira is befolyással vannak; annál fogva valamely meghatározott esetben a talaj leírásánál az említett tényezők is tekintetbe vétetnek.

A földirati fekvést megtudjuk az ország térképéből; a tengerfeletti magasságra nézve támpontokul szolgálnak a katonai törzskar számos magassági mérései, a vasuti állomásoknak ismert tengerfeletti magasságai, geológok s mások által felvett magassági adatok.\*) Ily ismert pontokból kiindulva aztán akár trigonometriai,

\*) Számos ily adatot találunk Hunfalvy J. „A magyar birodalom term. viszonyainak leírása, Pest Emich Gusztávnál. 1864.” még többet a katonai törzskar által készített térképeken.



akár barometermérések útján meghatározható a talaj t. f. magassága. Használható adatokat szolgáltatnak ez esetben az aneroiddal (szelencze-légsulymérő) eszközölt felvételek is.

A lejtés fokát vagy százalékát különböző mértani vagy egyszerű fmagasságmérő eszközökkel, vagy ilyenek hiányában egy vízszintesen fektetett karó s egy ennek végéről lefüggő függély által is felvehetjük. Legkényelmesebb eszköz azonban e célra az u. n. geologus-kompasz, mely e végett belsejében kis függélylyel van ellátva. Ha a lejtés irányában lefektetett léczen élére állítjuk a kompaszt, akkor a függély a megfelelő beosztáson a hajlásszög fokát megmutatja. Ezt soha sem szabad elmulasztani, mert a szembecslés annyira csal, hogy rendesen kétszer akkorának itéli az ember a lejtő fokát, mint a mekkora.

A kitettségét, vagyis azt, hogy a lejtő, mely égtáj felé néz, leghelyesebben a fennebb említett kompaszszal határozzuk meg; ámbár az óra és a nap állásának összehasonlítása szerint is tájékozhatjuk magunkat.

A talaj eredetéről, hogy t. i. szikla elmállásából a helyszínén keletkezett-e, vagy vízből való leülepedés terménye-e, vagy végre szerves anyagok korhadéka képezi-e azt: legtöbb esetben első tekintetre meggyőződhetünk. De ha ebben kételkednénk, megítélhetjük ezt az általunk eszközölt talajátmetszésből, vagy útbevágások- és földszakadásokból. A talajvizsgálat céljából eszközölt bemetszések 1—2 m. hosszú árok, melyeket oldalos helyen a lejtés irányában ásatunk ki. Egy hektáron 5—6 ily próbárok rendesen mezőgazdasági talajoknál is elegendő. Sziklai talajoknál az árok mélységét a talaj vastagsága határozza meg; üledéktalajnál ellenben ez 1—2 m. mélységre terjedhet. 1 méter mélység mellett 40 cm. szélesség és 120 cm. hosszúság, 2 méter mélységnél 60 cm. szélesség és 160 cm. hosszúság czélszerű. Ily átmetszéseknél felveendő a talajtakaró és humuszréteg, továbbá a televényes és a sovány ásványi talajréteg vastagsága és minősége, s végre a talajágy minősége. A vastagságokat függélyes irányban mérjük, még pedig úgy, hogy az árokra keresztbe jól a talaj felületéhez nyomva léczet fektetünk, mellette függélyt bocsátunk le, a talaj átmetszetét behatóan megvizsgálva, késsel megjelöljük a televényréteg, a televényes talaj (illetve a termőtalaj), és a sovány ásványi talaj határát, s esetleg



(üledéktalajnál) a talaj egyes rétegeinek határait is; azután a függély mellett minden egyes emelet, illetve réteg, vastagságát megmérjük. Ugyanekkor megállapítjuk sziklatalajnál az anyakőzet faját és minőségét, különös tekintettel az elhnállási viszonyokra és az elmállás látható terményeire, a víz átbocsátására stb. Üledéktalajoknál megállapítandó a talajágy minősége, rétegeinek fekvése, vízátbocsátó képessége, vagy víz által való átjárhatatlansága s más tulajdonságai. Megvizsgálandó az is, hogy mely rétegegig, illetve mely mélységig hatolnak le a gyökök, s mily befolyással van erre nézve a talajágy.

Továbbá különös tekintettel kell lenni a szerkezetre; a talaj vázának minőségére (a törmelék durvasága- és anyagára) és a finom földhöz való viszonyára, az elegyülés alakjára sat. a mennyiben ez szabad szemmel megítélhető. Épúgy a talaj színe és kötöttsége s a mennyiben lehet nedvességi viszonyai is megvizsgálandók és feljegyzendők.

A talaj anyagára nézve is lehetőleg a helyszínén kell már egy és más adatot kipuhatolni. A kinézés, tapintat, szín, szag, szerkezet is elárulja a gyakorlottsággal bíró előtt, hogy homokkal, agyaggal vagy televénynyel van-e dolga. A mész jelentékenyebb mennyiségben való jelenlétét sósavval ítéltethük meg. Jó mindig egyenlő töménységű sósavat használni, olyat pl., mely fele részben sósavból, fele részben pedig vízből áll.

Annak megjelölése is fontos, amennyire megítélhető, hogy az ember a használat által mennyire és mily irányban változtatta meg a talaj eredeti állapotát. A helyszínén a növényzet minőségéről is fel kell a megjegyzendőket írni, még pedig a vadon növő növényzetről épúgy mint a tenyésztettekről.

A talaj belsejének megvizsgálására még bizonyos szerszámokat is lehet használni, ami sokkal kevesebb időt és fáradságot igényel, mint a próbaárkok, de nem ad oly tökéletes átnézetet. Egy kis 5—8 cm. átmérőjű lyukat készítő földfuró kőmentes talajban igen jó szolgálatot tesz. A furó alsó vége, mint a fafuróé, csigaszerű, e felett két csavarmenetes, csak kevés emelkedéssel bíró lapátalaku szárnya van, mely a földet kivágja és a furó kihuzásánál (amikor csavarni nem szabad) magával hozza azt. A furó nyelét, mely közel 3 cm. vastag, csavarmetszetek segélyével közbetett darabokkal tetszés szerint meg lehet



hosszabbítani. Felül fafogantyú van a nyélnek karikát alkotó végén átdugva, melynél fogva két ember csavarja a furót. Hogy a talaj egyes emeleteinek, illetve rétegeinek meghatározása e számmal hogy történik, azt könnyű kitalálni.

Ugyane célra szolgál a furópálcza is. Ez felül fafogantyúval ellátott, 1 cm. vastag vaspálcza, melynek alól hegyes, kanálalaku része csavarás nélkül a földbe nyomatik, ott egyet csavarunk rajta, és így csavarva emeljük vele ki a földet, megvizsgálás céljából.

Vége a mocsárvas és réteggő kutatására szolgál a kutató vas, mely 1·2 m. hosszú hegyes vaspálcza. Földbeszurása által a homokos, agyagos, vagy tözezes földben netalán előforduló kövesedésekről győződhetünk meg általa.

A helyszíni vizsgálat alkalmával gyűjtjük össze természetesen azon talajadagokat is a talaj egyes emeleteiből és rétegeiből, melyeket a talaj pontosabb meghatározása végett szobai vizsgálatnak akarunk alávetni.

### **A talaj egyes alkatrészeinek meghatározása.**

A talaj egyes alkatrészei viszonylagos mennyiségének meghatározása a talaj minőségének megítélésére nézve igen fontos, sőt néha már az osztályozás miatt is szükséges.

Alábbiakban csak azon alkatrészekről lesz szó, melyeket az osztályozás alapjául szoktak felvenni. Ezek: kövek és kötőrmelék, homok, agyag, mész és televény. A meghatározásnak ezen leg-egyszerűbb, a gyakorlatban is bárki által alkalmazható módjait írjuk le. A pontosabb meghatározást, mely csak vegytani intézetekben hajtható végre, egészen mellőzzük.

### **A talaj kavics és durvább kötőrmelék tartalmának meghatározása.**

A kőtuskóknak, köveknek, kavicsnak, kődarának jelenlétéről, viszonylagos mennyiségéről, egyenletes vagy egyenlőtlen elosztásáról, legjobb felvilágosítást ad a talaj átmetszete. Épúgy győződhetünk arról is, hogy valjon szögletesek-e vagy lekerekítettek, lekoptatottak, hogy minő kőzetnek töredékei, minő ásványokból állanak, aminek megítélésére az apróbb szemecskéknél a nagyító üveget sem nélkülözhetjük. Azt is figyelembe kell ven-



nünk, kivált a sziklai talajoknál, hogy valjon az elmállásnak mily fokán állanak. Ennek megítélésére zsebkésünk is jó szolgálatot tesz. A karczolás nehéz, vagy könnyű volta, a karczolási vonal élénksége vagy földessége stb., mind tekintetbe veendő. Az elmállás fokának megítélésénél tekintetbe jó az is, hogy valjon mily ellentállást gyakorol a kődarab a kalapács ütésének. Az elmállás bizonyos fokán a kőzet könnyen széthull, sőt néha kezünk szorítására is szétmorzsolódik.

Ha a kövek mennyiségét százalékokban akarjuk meghatározni, akkor kénytelenek vagyunk a talaj egyes emeleteiből vett talajanyagot, melyet először napon, vagy legfeljebb 100 °C hőmérsék mellett kiszáritottunk és súlyát megmértük, oly drótrostába tenni, mely csak a 2 mm.-en alóli átmérőjű kötőrmeléket bocsátja át, ott vízzel merev ecset segélyével jól kimosni, hogy minden homoktól és földes résztől megszabaduljon, s akkor megint megszáritni és súlyát megmérni. Végre a kapott súlyt az összes száraz talaj súlyával viszonyba téve, megkapjuk a kötőrmelék %-ban. Ha pl. a kiszáritott talaj volt 250 gr., a kötőrmelék 150 gr., akkor ez százalékokban tesz:

$$\frac{150 \times 100}{250} = 60 \%$$

### A homok és az agyag elválasztása és meghatározása.

E célra, ha a talaj köves, kötőrmelékes, a vizsgálat alá vetett talajadag homok- és agyagtartalmát az előbbi módon választjuk ki a törmelék közül.

Hasonlóan történik a durvább törmeléknek a finomabbtól való elválasztása a porond-, homok- és agyagból álló talajoknál is. A célszerűen kiválasztott próbaadagokat a helyszínről tömött vászon zsacsókban visszük haza. Egy-egy ily adag körülbelül 1 liter lehet. Minden adag külön-külön vizsgáltatik meg a következő módon.

A talajt először csak annyira száritjuk ki, hogy ujjaink közt szétmorzsolhassuk. E morzsákat azután 2 mm. átmérőjű likakkal bíró drótrostán átdörzsöljük, s a benne lévő kövektől, kődarától, gyökerektől stb. megszabadítjuk. A köveket jó lemosni és félre tenni, hogy — amennyiben szükséges — azok mivoltát, s ha az osztályozás miatt kívánatosnak látszik, később súlyukat is megha-



tározhassuk. A rostán átment finom földet azután napon vagy 25—30° C (de mindenesetre 100 foknál kisebb) hőmérsék mellett, pl. elegendően lehűlt sütő csőben addig szárítjuk, míg nedvességet már sem színe, sem tapintata által el nem árul. Nagyon agyagos talaj napon csak több nap alatt éri el a szárazság ezen fokát. A légszáraz anyagból most lemérünk 50 grammot, a maradékot a próbavétel helyének és más körülményeinek megjelölése mellett, netaláni további vizsgálatra félre tesszük. Ugyanezt tesszük a talajpróba vizsgálat alá nem vetett, át nem rostált részével is, melyet esetleg talajgyűjteményhez használhatunk fel. A lemért talajadagot most porcelláncsészébe tiszta vízzel össze keverjük és kemény fából készült lapiczkával vagy üvegpálczikával gyakran megkeverve, több napig áztatjuk, vagy e helyett  $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{1}{2}$  óráig óvatosan főzzük, hogy belőle semmi el ne vesszen. Ez anyagot most már iszapolásnak vetjük alá, mely különböző készülékek által eszközölhető, melyek közül itt csak a Kühn féléét írjuk le.

Ez 29 cm. magas egyszerű hengeres üvegedény, mely fenekétől 5 cm. magasságban kaucuk dugóval elzárható nyílással van ellátva. Ezen edénybe tesszük óvatosan a vízben áztatott vagy főzött talajt; azután megtöltjük vízzel a tetejétől 4 cm.-re eső jegyig és az így felhigitott talajanyagot egy keményfa pálczával óvatosan, körülbelül egy perczig keverjük. Ekkor a zavarékot épen 5 perczig nyugalomban hagyjuk. Ez idő elegendő arra, hogy a homok leülepedjék; az agyag és más földes részek ellenben lebegve maradnak. Erre a víz, a benne úszó finom földes részekkel együtt a csapon lebocsáttatik. Most a csapot bedugva, megint megtöltjük az edényt, felkavarjuk, 5 perczig nyugodni hagyjuk stb. és így annyiszor ismételjük az iszapolást, míg a felkavart vízben iszap már nincs. Gyakran azonban a víz sehogy sem akar megtisztulni, hanem fehéres vagy sárgás marad, habár már számba vehető iszapanyagot nem tartalmaz. Hogy ily esetben mikor lehet már félbe hagyni az iszapolást, arra a gyakorlat tanítja meg az embert.

Az iszapoló edényben hátramarad a homok, melynek hogy súlyát meghatározhassuk, azt óvatosan egy csészébe, vagy egyenesen a szűrő tölcserbe kell vízsugár segítségével átmosnunk. A víz leszivárgása után a szűrőpapíron maradt homokot sütő csőben kiszárítjuk, a szűrőpapírról óvatosan porcellán csészébe seperjük



és súlyát megmérjük. Ha szükségesnek látja az ember, különböző átmérőjű likacsokkal bíró drótszítákkal még e homokot is el lehet különíteni a finomság kívánt fokai szerint.

A hátramaradt iszap rendszeren nagyobb részben agyagból áll, de ezen kívül van benne igen finom főveny is, melyet azonban gyakorlatilag az agyaghoz számíthatunk. Ha az ily értelemben vett agyagot, a televénytől és mésztől külön akarjuk választani, azt az alább leírandó módokon tehetjük. Ha a mész- és televénytartalmat tudjuk, akkor ezt csak az iszap súlyából le kell vonnunk, hogy az agyagtartalmat pontosabban megtudjuk.

### A mésztartalom meghatározása.

A mésztartalomnak megközelítőleg és a gyakorlat kívánalmait gyakran kielégítő meghatározását Novaeki\*) szerint úgy vihetjük végbe, hogy egy kis üveg oly higitott sósavat öntünk, melynek fele tiszta tömény sósav, másik fele pedig tiszta víz. Ebből a kísérlet alá vetett talajra 2—3 cseppet csepegtetünk és az eredményt megfigyeljük.

Ha semmi felpeszsdülés nem mutatkozik, akkor a talaj mésztartalma 1 %-on alul van.

Ha a felpeszsdülés csak gyöngye, akkor a mésztartalmat 1—2 %-ra tehetjük. Ha a felpeszsdülés jól felismerhető, de nem tartós, akkor 3—4 %.

Ha erős és tartós, akkor a mésztartalom 5 %-ot meghalad és lehet 10, 20, 30, 50 stb. is.

Ha a talaj minden részében egyenletesen pezsdl fel, akkor a mész egyenletesen van benne eloszolva; ha ellenben egyes pontjain gyorsabban és erősebben pezsdl fel, akkor benne mészkő szemesék vannak.

Ha a talajt merev ecset segítségével  $\frac{1}{2}$  mm. átmérőjű likacsokkal bíró szítán átmoszuk, meggyőződhetünk arról, hogy valjon a talaj földes részében vagy homokos és törmelékes részében, vagy mind kettőben van-e mész.

A szikes talajokban azonban e módszerrel nem érünk czélt, mert a szénsavas nátrium (sziksó) époly, sőt még gyorsabb pezs-gést mutat. E próba tehát szikes talajnál ki van zárva.

\*) Novaeki, Kurze Anleitung zur einfachen Bodenuntersuchung. Zürich, 1885.



Ha a mésztartalmat pontosan meg akarjuk határozni, akkor legjobb a talajt vegyelemző intézetbe küldeni.

Mindazonáltal, ahol az a kérdés, hogy valamely talajt az agyaghoz, vagy a márgához, ehez vagy a mésztalajhoz számít-sunk-e, ott a Novacki által ajánlott következő egyszerű eljárással is célt érhetünk, melyhez csak egy finom, 150–200 gramm mérésére alkalmas mérlegre van szükségünk.

A légszáraz talajból egy kis próbát veszünk, s azt porcelán vagy achat, vagy ilyenek hiányában közönséges mozsárban porrá dörzsöljük. Ebből szépen letörölgetett és megmérlegelt tiszta óraüvegen lemérünk körülbelül 5 grammot. Most egy, körülbelül 12 cm. magas és 5–6 cm. széles orvosságos üvegbe üvegtölcsérrel egy jó centiméternyi oly hígított sósavat öntünk, melynek fele víz. Ezt is pontosan megmérjük. Az után a porrá dörzsölt és pontosan lemért talajadagkát az óraüvegről késhegyenként óvatosan az üvegbe eresszük, hogy abból semmi se vesszen el. Egyszerre sokat, vagy gyorsan egymás után a sósavba bocsátani a meszes talajanyagot nem szabad, mert különben a gyors felpeldülés folytán az üvegből apró talajrészecskék is sziporkálnának ki, sőt ki is futhatna a sósav. Időnként az üveget óvatosan meg kell kissé rázogatni, hogy a fenekén levő iszap minden részével érintkezzék a sósav, és a mészrészecskékből a szén-savat kiűzze. Végre az óraüvegről és a használt kés hegyéről a talajport megnyírt tollvitorlával vagy finom ecsettel szépen be kell seperni az üvegbe, hogy a próba a legkisebb veszteség nélkül az üvegbe jusson. Ha ez sikerült, akkor meg kell várni, míg az üveg gyöngéd megrázására sem mutatkozik semmi szénsav-fejlődés, és a folyadék teljesen nyugalomba jött. Most az üveget tartalmával együtt pontosan megmérjük.

A súlyvesztéség mutatni fogja a kihajtott szénsav mennyiségét.

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| Feltéve pl. hogy volt az óraüveg . . . . . | 6.32 gr.                    |
| az óra üveg a talajjal együtt . . . . .    | 11.60 „                     |
|                                            | tehát a talajpróba 5.28 gr. |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Továbbá az üveg a sósavval . . . . . | 75.84 „   |
| Akkor ez összesen                    | 81.12 gr. |

|                                                                          |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| De a kísérlet végén volt az üveg a sósavval és talajjal együtt . . . . . | 80.55 „                      |
|                                                                          | tehát súlyvesztéség 0.57 gr. |



Feltéve hogy ez mind szénsavas mészből volt jelen, megkapjuk a szénsavas mész tartalmát, ha a súlyvesztéséget 2·272-vel szorozzuk. Ez onnan van, mert 100 rész szénsavas mészhöz 44 rész szén-sav ( $\text{CO}_2$ ) szükséges. Fennebbi esetben tehát tartalmazott 5·28 gr. talaj 1·29 gr. szénsavas meszet, vagyis 24 %-ot.

### A talaj televénytartalmának meghatározása.

A televénytartalom pontos meghatározása nagyon nehéz. Ezt csak vegyészi készülékek segítségével lehet véghez vinni, és hosszadalmas eljárás. A gyakorlatban a mezőgazda és erdész kénytelen a következő egyszerű, de megbízhatóság tekintetében még sok kívánni valót hátra hagyó módszerrel megelégedni.

A fennebb már leírt módon, 2 mm. átmérőjű likakkal ellátott szitán átdörzsölt s azután megszáritott (légszáraz) talajból veszünk egy kis mennyiséget, pl. 10 grammot, azt porcellán vagy platin csészébe téve pontosan megmérjük, s azután szárító szekrénybe tesszük, vagy ennek hiányában sütőcsőbe, melynek feneke-n egy ujnyi homok van kiterítve. Elérhetjük a czélt vasserpenyővel is, melynek fenekére homokot terítettünk ki. A hőmérsék egy 200 fokos hőmérő segítségével úgy szabályozandó, hogy az 140—150 fokon maradjon, de utóbbit át ne hágja, mert e szárításnál most csak a hygroskopos víz eltávolítása a czél, és magasabb hőmérsék mellett a televény már felbomlásnak indulna. A szárításnak legalább 2 óráig kell tartani. Ez megtörténvén, mihelyt a földet tartalmazó csésze annyira kihűl, hogy ujjunkkal megfoghatjuk, a súlyát újra pontosan meghatározzuk. A kapott súlyvesztés az elpárolgott víznek felel meg.

Most a csészét kettős légvonásu, úgynevezett Berzelius-féle spirituszlámpa, vagy gázláng felett először gyöngén, azután erősebben izzítjuk és a földet eközben platindrót vagy platinlapiczkával szorgalmasan de óvatosan kevergetjük. Ez addig tart, míg a szénrészek mind el nem égnek. A kihűlt talaj színét jól szemügyre vesszük, és ha gyanunk van, hogy még szerves részeket tartalmaz, újra izzítjuk, mindaddig, míg kihűlés után színét többé már nem változtatja. Minthogy minden talaj tartalmaz több vagy kevesebb vasat, a humusz elégeése után a vaséleg színe lép fel; ami a kiégésnek biztos jele. Erre a kihűlt földet néhány csepp szénsavas ammoniával megnedvesítjük, hogy a mésznek s netalán



más vegyeknek, a belőlük kihajtott szénsavat megint visszaadjuk. Azután a csészét néhány percig gyengén újra felmelegítjük, hogy a talajból az ammoniát kiűzzük. Ez megtörténvén még egyszer megmérjük a csészét, tartalmával együtt. A legutolsó két mérés különbsége, vagyis az izzítás által okozott súlyvesztés, adja a televénytartalom súlyát.

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Ha pl. volt a talaj sulya . . . . . | 10·00 gr. |
| Az üres csésze sulya . . . . .      | 59·22 „   |
| összesen . . . . .                  | 69·22 „   |
| A víz kiűzése után . . . . .        | 67·90 gr. |
| Izzítás után . . . . .              | 67·26 „   |
| A televény sulya tehát . . . . .    | 0·64 „    |

A kísérlet alá vetett, átszítált föld televényszázaléka e szerint

$$\frac{0·64 \times 100}{10} = 6·4\%$$

Ha pedig az át nem szítált talajra vonatkoztatjuk a televényszázalékot, amit az osztályozás tekintetéből tennünk is kell, akkor azon törmeléket is számításba kell vennünk, mely az átszítálásnál a szítán maradt vissza, azaz a kötőanyagot is meg kell határoznunk a már ismertetett módon. Ha az volt pl. 25 %, akkor következő számokat nyerünk:

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Átszítált talajanyag . . . . .                               | 10·00 gr. |
| Ennek megfelelő törmelék . . . . .                           | 2·50 „    |
| összesen . . . . .                                           | 12·50 „   |
| Ebben televény . . . . .                                     | 0·64 „    |
| Amely megfelel $\frac{0·64 \times 100}{12·5} = 5·11\%$ -nak. |           |

Az izzítás által okozott súlyvesztés azonban csak azon esetben felel meg elég pontosan a televénymennyiségnek, ha a talajban 10 %-nál kevesebb az agyag; tehát törmelék, kavics, homoktalajnál. Ellenben az agyagban gazdag talajoknál mindig tetemesen nagyobb az izzítási súlyvesztés a televény súlyánál, mert azok vizőknek egy részét 150 foknál magasabb hőmérsék mellett veszti el. Itt tehát az izzítási súlyvesztés nemcsak a televény, hanem az elvesztett víz súlyát is magába foglalja. A hibának meg-



közelítőleg való kiigazítása végett Novacki, javaslatba hozza, hogy a kapott izzítási súlyvesztéséből levonjuk agyag és szivós vályogtalajnál annak  $\frac{1}{2}$  részét, közönséges vályogtalajnál  $\frac{1}{3}$  részét, homokos vályog és vályogos homoktalajnál  $\frac{1}{4}$  részét. Ha pl. fennebbi meghatározás homokos vályogtalajra vonatkoznék, akkor annak televénytartalmát 5·12% helyett csak 3·8%-ra tehetnők.





# TARTALOM.

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bevezetés . . . . . | Lap<br>1 |
|---------------------|----------|

## Első rész.

### A talaj keletkezése.

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. Fejezet. A talaj képződéséről általában . . . . .                           | 3  |
| II. Fejezet. Talajképződés vulkáni erők által . . . . .                        | 5  |
| III. Fejezet. A talajképződés légköri hatók által . . . . .                    | 9  |
| A) A kőzetek elmállása . . . . .                                               | 9  |
| B) Talajképzés és szállítás jégárok, vizek és légáramlások által . . . . .     | 55 |
| IV. Fejezet. A növény- és állatország közreműködése a talajképzésben . . . . . | 73 |

## Második rész.

### A talaj alkatrészei és tulajdonságai.

|                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Fejezet. A talaj alkatrészei . . . . .                                                                           | 92  |
| II. Fejezet. A talaj alkata és tulajdonságai . . . . .                                                              | 97  |
| 1. A talaj alkata . . . . .                                                                                         | 98  |
| 2. A talaj mélysége . . . . .                                                                                       | 101 |
| 3. A talaj színe . . . . .                                                                                          | 103 |
| 4. A talaj szerkezete vagy szövete . . . . .                                                                        | 103 |
| 5. A talaj sulya . . . . .                                                                                          | 111 |
| 6. A talaj nedvességi viszonyai . . . . .                                                                           | 115 |
| 7. A talaj viszonya a léghöz . . . . .                                                                              | 131 |
| 8. A talaj hőviszonyai . . . . .                                                                                    | 128 |
| 9. A talaj képessége a vízben lévő zavarék, festő és szaganyagokat,<br>valamint oldott anyagokat elnyelni . . . . . | 167 |
| 10. A talajban véghez menő fizikai és vegyi folyamatok áttekintése . . . . .                                        | 172 |

## Harmadik rész.

### A talajnemek felosztása, jellemzése és meghatározása.


|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| I. Fejezet. A talajnemek osztályozása . . . . .    | 177 |
| II. Fejezet. A talajnemek leírása . . . . .        | 181 |
| III. Fejezet. A talajnemek megvizsgálása . . . . . | 199 |

## Talajtérkép.









ERDÉSZETI




1851

1866











# A MAGYAR ÁLLAM TALAJ-TÉRKÉPE

R.v.Hauer nagy geológiai térképe után rajzolta és helyenként Toulai talajtérképe szerint kiegészítette:

**TÉGLÁS KÁROLY**  
m. kir. bányászati és erdészeti akadémiai tanársegéd

Mérték: 1:2,500,000.

Földrajzi merődül. 13-1' az egyenlítőnél.  
Kilométer: 11,33 - 1' az egyenlítőnél.

## Szin magyarázat:

Kovászban dús kristályos tömeg kőzetek.

- Granit, sienit, gneisszgranit.
- Trachit, diorit, porfír.
- Kovászban szegényebb kristályos tömegkőzetek: Augitporfír, bazalt, melafir, szerpentin, amfibolit.
- Kristályos palakőzetek: Gneiss, szilámpala, phyllit, chlorit és talkpala.
- Keményebb kovászban üledékkőzetek: Kvarcszikla, kvarcshomokkő és kvarcszkonglomerát.
- Lúgyabb, agyagos homokos kőzetek: lúgyabb homokkővek, márgás homokkőzetek.

- Trachit- és bazaltudbók.
- Mészakőzetek.
- A harmadkori formáció agyagos és homokos kőzetei és a lösz.
- Homoktalajok:
- Futóhomok.
- Kötött homok.
- Kavics és durva homok, agyaggal keverve, sok helyen evel fedve.
- A völgyek alluvium talaja. Tőzeg és láptalajok.



# A MAGYAR ÁLLAM TALAJ-TÉRKÉPE

R.v.Hauer nagy geológiai térképe után rajzolta és helyenként Toulai talajtérképe szerint kiegészítette:

TÉGLÁS KÁROLY  
m. kir. bányászati és erdészeti  
akadémiai tanársegéd

Mérték: 1:2,500,000.

Földrajzi merőleges, 15-1°-as egyenlítővel.  
Kilométer, 10 km = 1°-as egyenlítővel.

## Szin magyarázat:

Kovasszabon dúis kristályos tájeg közetek.

- Örvény, szienit, gneisszörvény.
- Trachit, diorit, porfir.
- Kovasszabon szögletes kristályos tájegközetek: dioritporfir, bazalt, melafir, szerpentin, amfibolit.
- Kristályos palaták: örvény, szienit, gneiss, chlorit és talpa.
- Keményebb kovasszabon üledésközetek: Kovasszabon, kvarcagglomerát, kvarcagglomerát.
- Lágyabb, agyagos homokos közetek: lágyabb homokos közet, mélyes homokos közet.

- Trachit- és bazalttűzők.
- Mészaközetek.
- A harmadkori formáció agyagos homokos közetek és a lész.
- Homoktalajok: Pálhomok.
- Költi homok.
- Kavics és durva homok, agyaggal keverve, sok helyen evel fedve.
- A völgyek alluvium talpa. Tömeg és láptalajok.

