

12

1

Upton

1019

Y

1800

1019

Y

1800

1019

Y

1800

1019

Y

1800

1019

Y

1800

1019

Y



1800

1019

Y

1800

995



OEE Könyvtár
Áll.EII. 2018

A TÖLGYLISZTHARMAT KÁROSÍTÁSA A VINKOVCEI, LIPPAI ÉS GÖDÖLLŐI KINCSTÁRI ERDŐBIRTOKON

IRTA

DR. TUZSON JÁNOS

EGYET. TÁNÁR

№: 3788.

KÜLÖNLENYOMAT

AZ ERDÉSZETI LAPOK 1917. ÉVFOLYAMÁNAK V—VI. FÜZETÉBŐL



BUDAPEST

“PÁTRIA” IRODALMI VÁLLALAT ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

1917

A TÖRTÉNELMI ÉRTÉKELÉS
A TÖRTÉNELMI ÉRTÉKELÉS
A TÖRTÉNELMI ÉRTÉKELÉS

DR. TÓTH JÁNOS

8248: 918



1866/1

1866/1

1866/1

A tölgylisztharmat károsítása a vinkovcei, lippai és gödöllői kinestári erdőbirtokokon. *)

1. A helyszínen tett megállapítások.

1. A vinkovcei főerdőhivatal területében a leginkább veszélyeztetett tölgyesek a Boszut, Sztudva és Szmogvicza folyók környékén vizsgáltattak meg. E területek évenként több hónapig árvíz alatt állanak, az 1915—1916. évben pedig közel 6 hónapig rendkívüli áradásnak voltak kitéve. Az illető részeket kezelő és őrző személyzet bemondásai szerint az utóbbi 10—12 év alatt 3—4 éves közökkel háromszor volt bennük erős hernyórágás. A hernyórágáson kívül fokozódó mértékben lepte el évenként ezeket az erdőrészeket a tölgyfa lisztharmatja (*Oidium quercinum* Thüm. = *Microsphaera quercina* Arn. et Foex). Hogy ez az idén is bekövetkezett, azt a közvetlen helyszíni megfigyelések is igazolták, még pedig úgy a 30—80 éves pusztuló félben levő erdőben, mint itt-ott szórva-nyosabban az egészen fiatal és a néhol szintén pusztuló 200—400 éves erdőkben is. A lisztharmat fellépése jelenleg közepes, sőt a fiatalosokban csekély foku.

A leginkább megtámadott részekben, mint a „Blata“ erdő 60—80 éves, a „Malovanczi“ 40 éves részletein, valamint más szomszédos erdőkben is a fák koronája részben pusztuló félben van, nagyrészt azonban már teljesen elpusztult. A levágott törzsek keresztmetszetein meg lehetett állapítani, hogy növekedésük eléggé rendes, erőteljes volt; itt-ott azonban (kétségtelenül a hernyórágásos években) az évi növekedés hirtelen megcsappant. A növe-

*) Ezt a hivatalos jelentést a földmivelésügyi miniszter ur küldötte meg közlés végett.

Szerk.

kedés legutolsó, hirtelen megakadása végül egy igen keskeny gyűrűben nyer kifejezést, mire azután a fa elpusztulása következett. Az ilyen fák szijácsa a gyökerektől a csucsig többnyire *egyenletesen* korhadásnak indult, amit a *Stereum hirsutum* Fr., *Daedalea quercina* és más gombák okoznak, amelyek nem mint élősködők, hanem mint saprophita gombák telepedtek a már elhalt, illetőleg elhaló félben levő fák szijácsába, hogy lassanként a gesztbe is behatoljanak.

A kevésbbé megtámadott fákon a korona valamelyes része még életben van, de a lombozat lisztharmatos; az ilyenek törzsén is bekövetkezett a növekedés hirtelen megcsappanása, de a törzsek fája még él, nem korhadt. Az említett terület 30—80 éves erdőségei igen csekély kivétellel ilyen erősen megtámadott, még élő és egészen elhalt részletekből állanak. Az elhalás időpontja többnyire az 1914., 1915. és 1916. évre tehető, még pedig a *Debrinyi* erdőrész már nagyrészt 1914-ben elhalt, a *Blata* erdőrész ellenben főleg 1915-ben és 1916-ban. Egészen ép részt a bejárt területen alig találunk (pl. a *Debrinyi*-ben a vadászlak közelében). A „Szmogva” vagyonszéki erdőben a 300—400 éves őstölgyesben is vannak kipusztuló félben levő és kipusztult részletek.

A szlavóniai állami tölgyes erdőkben ilyen módon mutatózó kipusztult és pusztuló félben levő részletek fatömege, a kezelő szakemberek becslése szerint, a tapasztaltak megbeszélésekor 200—500 ezer köbméterre tétetett.

A baj eredendő okaira vonatkozólag elsősorban is fontos, hogy a pusztulás a vinkovcei főerdőhivatal területén főleg a keleti, mélyebb fekvésű erdőgondnokságokban tapasztalható; legerősebben pedig az említett Boszut és Sztudva folyók környezetén. Ezen kívül a magánterületeken is bizonyos fokozatok különböztethetők meg: némely részeken az erdő épebb, másokon erősebben megtámadott és nagy foltokban teljesen ki is pusztult. E részek összes jelenlegi és a multa nézve kipuhatolható viszonyaiból meg lehetett állapítani, hogy a bajt mindenütt és egyaránt a hernyórágás *indította* meg. A tavaszi lombozattól megfosztott erdőrészek fái ugyanabban az évben másodszor is kihajtottak; ezeket a hajtásokat azonban ellepte a lisztharmat és az új lombozatot beteggé téve, lényegesen fokozta a bajt.

Teljes pusztulást ugyszólván kivétel nélkül ott találtunk, ahol a terület mélyebb fekvésű és így nyirkosabb. Minthogy a szóban levő tölgyesekben nagyon csekély foku nivókülönbségekről van szó, főleg az aljnövényzet jelzi a vizenyős és kevésbé vizenyős területeket. Míg a magasabb fekvésű lapályokon az erdő alját a mérsékelt nyirkos erdők aljnövényzete jellemzi, addig a nyirkosabbakban a *Genista elatior* és *Rubus caesius* cserjék mellett *Chrysanthemum uliginosum* lép fel, az egészen vizenyős területeken pedig ezek is elmaradva, a *Polygonum mite Schrk.* (keserű fű), a *Gnaphalium uliginosum* (mocsári gyopár) és a *Scutellaria hastifolia* ritkásan álló példányai jelentkeznek. Utóbbi részeken a tölgyesek 80—90%-a teljesen kipusztult. (A szmogvai vagyonszélességi erdőben a 300—400 évesek is.)

Ez a mindenütt ismétlődő körülmény kétségtelenné teszi, hogy — jóllehet a *Quercus pedunculata*, a híres szlavóniai tölgyesek bizonyossága szerint, áradásos, mély területen kitünően fejlődik — a hernyórágástól és a rákövetkező lisztharmattól megtámadott erdők összes életműködéseikben meggyengülve, a túlságosan árvizes talajt nem bírják el. Fokozta ezt a hatást a szóban levő erdőkben az, hogy az 1915—16. évi árvíz rendkívül nagy volt és majdnem hat hónapig (októbertől márciusig) tartott.

Ezt a feltevést megerősíti az is, hogy a vinkovcei főerdőhivatal nyugati, magasabb fekvésű részében kisebb foku a baj, úgy hogy itt egészen kipusztult tölgyeseket alig észleltek, pedig itt is volt hernyórágás és lisztharmat is. De ugyanezt a feltevést erősíti meg az a körülmény is, hogy a lippai főerdőhivatal kerületében — a továbbiak szerint — igen nagyfoku a hernyórágás, a kései fagy és a lisztharmat okozta baj és daczára ennek egészen kipusztult tölgyeseket itt még sem lehet találni. A lippai kerület egyes részei azonban csak itt-ott, rövidebb ideig (1—2 hétig) kerülnek víz alá és így a talaj általában szárazabb, illetőleg ebben a kerületben nincsenek hónapokon át elárasztott területek, úgy mint a vinkovcei kerületben. Önkéntelenül is felmerül itt az a kérdés, hogy vajjon a régi, híres szlavóniai őstölgyesek miért nem estek áldozatul, holott hernyórágás, árvizek — és valószínűleg lisztharmat is — mindig lehettek és voltak?

E kérdés mérlegeléskor nem szabad elfelednünk, hogy a régi értékes szlavóniai erdőkben holdanként alig volt 40—50 darab

tölgyfánál több; a többi u. n. „fehér fa” (*Fraxinus ornus*, *Ulmus effusa*, *U. campestris*, *Acer campestre*) volt. Aránylag tehát csak itt-ott érte el egy-egy tölgyfa a magasabb kort. Ezenkívül pedig nem szabad idevonatkozólag figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy míg az őstölgyesek a természetre bizva a kor tekintetében is kevert erdők voltak, addig az utóbbi 30—40 év alatt a szlavóniai tölgyesek nagy, egyforma koru fiatalosokká alakultak, amelyekben *tiszta tölgyesekre* törekedtek. Az ilyen elegyetlen fiatalosok pedig epidemikus bajok katasztrófális fellépését nagyon elősegítik.

2. A lippai főerdőhivatal kerületében tapasztaltakat már a fentiekben röviden érintettem; az aradi és pécskai erdőgondnokság területén úgy a fiatalosok, mint a középkoru és a koros tölgyesek a lizstharmattól többé-kevésbé és helyenként ijesztő mértékben el vannak lepve. A lizstharmat itt is a rendkívül erős, a fákat lombozatuktól teljesen megfosztó hernyórágásra következett; mikor is ez a gomba a csekély ellenállóképességű másodhajtást könnyen elárasztja. Sőt — amint már érintettem — a lippai főerdőhivatal kerületében a lizstharmat-kalamitásnak még egy másik, a fákat gyengítő előkészítője is van: a gyakori erős késői fagy. Erről megfigyeléseim alatt bőségesen volt alkalmam meggyőződést szerezni. (Erős rovarrágás és késői fagy az aradi 15., 16., 17. tagban, valamint pl. ugyanez igen nagy mértékben az ópécskai 4. tagban.) És a lippai kerületben tényleg igen erős, a szlavóniai tölgyesekben tapasztaltnál jóval erősebb a lizstharmat fellépése, mind a fiatalosokban, mind pedig a középkoru és az egészen koros (pl. az óbodrogi ut mentén levő vágható) erdőkben is. Megjegyzendő, hogy fokozza itt a lizstharmat nagyfoku fellépését az is, hogy míg a szlavóniai tölgytelepitvények a természettől némileg mégis elegyesek, addig a lippai kerületnek mezőgazdasági közteshasználattal felújított fiatalosai kizárólag tiszta tölgyesek.

Ennek daczára is azonban a lippai kerületben pusztuló vagy éppen elhalt erdőfoltokat egyetlen egy esetben sem találtunk és ilyenről az ottani szakközegek sem tudnak, úgy, hogy a szlavóniai tölgyesek szomorú esetéről a lippai kerületben szó sem lehet. Itt csupán az említett rovarrágásra és késői fagyra következő lizstharmat folytán előálló nagyfoku növedékvesztéssel állunk szemben. Eszerint a lippai kerületben kétségtelenül meg volt

állapítható, hogy a megtekintett tölgyeseket, amelyek ugyyszólván tiszta *Quercus pedunculata* erdők, pusztán a *hernyórágás*, a *kései fagy* és a *nyomukban járó nagyfoku lisztharmat katasztrófaszerűen hirtelen megölni együttesen sem volt képes*. A nagyobbfoku pusztuláshoz tehát még egy tényező szükséges. Ilyen döntő tényező itt-ott a lippai kerületben is szerepelt; nevezetesen a szikes részeken,*) vagy ott, ahol az altalaj kavicsos hordalék, vagy tulságosan nedves (aradi gondnokság 16. tag) és ez a körülmény tényleg meg is adta az illető részeken a döntő impulzust a teljesen beteges állapot bekövetkezéséhez.

3. A *gödöllői erdőhivatal területén* a tölgyesek pusztulása nagyobb mérvű és itt az összes bejárt területek közül a legváltozatosabb és — első pillantásra — legrejtélyesebb viszonyokra akadunk.

Nagyrészt kipusztult és pusztuló félben levő 12—15 éves fiatalosok vannak, homokterületen, a valkói erdőgondnokság „Ökör-állás” nevű erdőrészében. Ezeket a részeket helyenként hernyórágás érte 1913-ban és 1914-ben. Lisztharmat jelenleg a fiatalosokban alig van. A vad általában sok kárt okozott bennük állandóan. A fiatalosok tisztán *Quercus pedunculata*-ból állanak, csupán itt-ott vannak bennük egyes *Quercus cerris* példányok, amelyek azonban teljesen épek, egészségesek. A teljesen kipusztult részek fácskái már 2—3 év előtt elhaltak. Az itt kipusztult fiatalosok majd a buczkák tetejére, majd pedig a mélyedésekbe esnek és általában a ki nem pusztultakkal a legszeszélyesebben váltakoznak. A kihalás eredendő okainak megállapítása szempontjából a gödöllői kerület szóban levő homokos részei egészen más elbírálás alá esnek, mint akár a szlavóniai, akár pedig a lippai kerületben levők. A *Magyar Alföld homokterületein ugyanis a terméketlen, kevésbé termékeny és termékeny részek, szóval különféle minőségű homoktalajok általában igen bonyolultan váltakoznak.***) Ez a természetes állapotban levő részeken a növényzet változásaiban szembetűnően kifejezésre jut; a szántott, ásott és egyáltalán kultivált részeken pedig abban nyilvánul meg, hogy a termesztett mező-

*) Ezeket minden kétséget kizárólag elárulta az *Aster punctatus* W. K. nevű, sziket jelző növény a pécskai gondnokság 4. tagjában.

**) Erre vonatkozólag l. dr. Tuzson J.: „A Magyar Alföld növényföldrajzi tagolódása” cz. munka 158., 168., 169. oldal.

gazdasági növények, vagy az erdősítéshez használt ákác-, tölgy- vagy fenyőfajok bizonyos részeken nem fejlődnek jól. Ugy hiszem, az „Ökörállás“-i erdőrészekben is ezzel az esettel állunk szemben. Ezek a részek bizonyára sohasem voltak tölgyerdőktől borítva és legkevésbé *Q. pedunculata* erdőktől. A megfelelőbb talaju részek — úgy ahogy — tenyészik a *Quercus pedunculata*; a kevésbé megfelelő és teljesen alkalmatlan részekben ellenben nem tenyészthető sikerrel és ilyen helyeken a hernyórágás, a vadkár és lisztharmat hatásai alatt épenséggel hamar teljesen kipusztul. Látszólag egészen más kérdés előtt állunk a gödöllői kerület televényes agyagtalaju területén. Az ilyen agyagos talajok nem szoktak oly hirtelen és szeszélyesen változni és — az itt elő nem forduló, síksági szikesektől eltekintve — a lősz egyformán szokott megfelelni a tölgynek. Ezekben az erdőrészekben is volt nagyfokú hernyórágás és a bejárásakor ezek is eléggé lisztharmatosak voltak. Daczára ennek nagyrészt sokkal jobb állapotban vannak, mint az előbb említett homoki erdők; a gyertyánnal, mezei juharral, mezei szillal kevert középkorú és idős tölgyesek mind e bajok daczára is eléggé üdék, habár nagy átlagban görbe és alacsony törzsű példányaik jelzik, hogy a talaj nem elsőrendű tölgytalaj. A szlavóniai kipusztult tölgyesekhez hasonló, sőt helyenként még ezeknél is rosszabb állapotú részletekkel azonban a gödöllői erdőhivatal lősz talaján is találkozunk. Ilyen például az 50—60 éves „Turtula“ erdőrész, melyben a fák 50—80%-a kihalt. És hasonló az „Urak rétje“ nevű 80 éves tölgyes, amely még szomorubb képét mutatja a pusztulásnak. Mindkettő mesterségesen telepített, elegyetlen *Quercus pedunculata* erdő, amelyben már elegyetlen volta következtében is igen erős volt a hernyórágás meg a lisztharmat is. Ezeken kívül az egész gödöllői kerületben gyakori a késői fagy is. Mindezek a bajok megvoltak azonban mindenfelé és így pl. a „Turtula“ fensik lejtőjén is, ahol pedig ugyanaz a tölgyes erdő zöldelő koronákat mutat. Ez a helyenkénti teljes kipusztulása a középkort már meghaladó tölgyerdőknek a hely magasságával nem hozható kapcsolatba, mert éppen a „Turtula“ fensik, az „Urak rétje“ pedig mély teknőbe esik. Itt tehát más okban: a talaj összetételében keresendő a baj. Erre nézve megvizsgáltuk a 2 m mély próbagödörök talaját és azt

találtuk, hogy az „Urak rétje” nevű erdőrész altalaja 1,2—1,4 m mélységben annyira meszes (CaCO_3), hogy a mész a talajban fehér só alakjában csapódik ki. Ez a mész a talajvízzel feljebb, lejjebb vándorol és a *Quercus pedunculata*-ra mindenesetre káros hatása. Itt a tölgyes mindaddig, amíg a felső, televényes agyagtalajból élt, jól fejlődött, amint azonban a gyökerek mélyebbre haladtak és a karbonátos részbe nőttek be, meggyengült a növekedésük. Erre következett 1913-tól kezdve évenként a hernyórágás, a kései fagy és a lisztharmat, *amely a jobb talajon álló tölgyeseket nem tudta elpusztítani, az Urak rétje erdőrész rossz altalaján tengődő 80 éves tölgyes azonban nem bírta el ezt a többszörös támadást.* Hasonló eset volt kideríthető a „Turtula” erdőrész elpusztult tölgyesére is: a talajszelvényből vett próbák azt bizonyították, hogy a humuszos, agyagos lösz csak 75 cm vastag, alatta pedig világos-sárga, igen meszes-homokos talaj következik. Amikor ebbe a rétegbe kerültek a gyökerek, azt kétségtelenül megérezte a tölgyes: elért ugyan 50—60 éves kort, azonban a törzsek keresztmetszetén meg volt állapítható, hogy az utóbbi 10—15 évben igen gyengén növekedett, éppen csak hogy tengődött az erdő és ilyen állapotban érte az említett hernyórágás, kései fagy és nagyfokú lisztharmat, ami 1913-tól kezdve ezen a rossz altalaju részen megadta a kegyelemdőfést az erdőnek. A homokos altalaj itt bizonyára ép oly változatos minőségű, mint általában szokott lenni az Alföld homoktalaja, csak hogy itt agyag borítja. Ahol pedig ez a homokaltalaj rossz minőségű, ott a hernyórágást, kései fagyot és az állandó lisztharmatot, abban a korban, amikor gyökerei a homokos talajba jutnak, ép úgy nem bírja el az erdő, mint ahogy a takaratlan silányabb minőségű homokos talajon sem állja azt ki.

Hogy a gödöllői kerületben a talaj, különösen az altalaj meszes, azt már természetadta ujjmutatás is igazolja: t. i. sok helyen diszlik itt a molyhos tölgy (a helybeliek „magyalfá”-ja, *Quercus lanuginosa*), amely előfordulás többé-kevésbé összefüggő folytatást talál a molyhos tölgynek az Alföld északi részén, pl. Monor környékétől észak felé mutató természetes előfordulásában. Ezek mind homokos területek és tudvalevőleg ez a homok igen meszes. Ahol a meszes réteget északabbra vastag lösz borítja, ott megél a *Quercus pedunculata* is, de ahol ez a takaró hiányzik, vagy vékony, ott a *Quercus*

lanuginosa megtelepszik ugyan és eléggé jól is fejlődik, de a *Quercus pedunculata* ilyen helyre nem való, növekedése gyenge, törzse girbe-görbe és az ilyen részeken az elkerülhetetlen betegségekkel nem tud megküzdeni.

II. A bajok orvoslására vonatkozó javaslat.

A szlavóniai, lippai és gödöllői kerületekből felsorolt esetek egymástól igen eltérőknek látszanak, alapjukban véve azonban ugyanazokra az okokra vezethetők vissza: *a hernyórágás és a lippai és gödöllői kerületben a késői fagyok után*) igen erősen ellepi a fákat a lisztharmat, amely epidemiával tölgyeseinkben ma már állandóan számolni kell.* Az így megtámadott erdők a bajt növekedésükben mindenütt igen érzékenyen megszenvedik, ahol pedig a talajban is van valami hiba, ott rohamosan kipusztulnak. Amint Szlavóniában a tulságosan áradásos, mocsaras mélyedésekben bekövetkezett, úgy kezd a lippai kerületben a hasonló, illetőleg a szikes vagy pedig a kavicsfordalékos altalaju részeken jelentkezni a baj és nagy mértékben állt be a pusztulás a gödöllői kerületben is a kevésbé alkamas homokterületeken a fiatalosokban, és a televényes agyaggal borított, de karbonátos, homokos altalaju részeken, az idősebb erdőkben.

A baj *közvetlen* orvoslása legyőzhetetlen akadályokba ütközik: *a lisztharmat ellen nagy erdőségekben a direkt védekezés lehetetlen;* a kénpreparátumok ismert alkalmazása legfeljebb csemeterkekben, faiskolákban alkalmazható. Tehát csakis úgy vehető eleje a bajnak, *ha a tölgyerdők egész kezelése, az egész gazdálkodás minden műveletében a baj leküzdésére, elkerülésére irányul.* Ennek már több megbízható és gyökeres módja van, ami azonban *a helyi viszonyok szerint más és más kell legyen.* Ugyanazt a bajt ugyanis a szlavóniai, a lippai és a gödöllői kerületben az illető területek viszonyai szerint más és más módon kell orvosolni.

Bizonyos elvek betartása mindamellett általánosítható. Így — miként azt rendszerint már maga a természet is elénk tárja — *Quercus pedunculata* erdők *elegyetlen telepítésétől lehetőleg tartózkodni kell.* Kiválólag jó tölgytalajon ugyan az elegyetlen állomány-

*) A gödöllői kerületben jelentékeny szerepe van a vadkárnak is.

nak is meg kellene felelnie, de az ilyen elegyetlen *Q. pedunculata* erdőben is mindig fenyeget a nagyobbfoku hernyórágás és a lisztharmat, ami legalább is növedékvesztéseget jelent. Tehát még az ilyen elsőrendű tölgytalajon is czélszerűbb elegyes erdőt nevelni, melyben legfeljebb mintegy 60—70%-ot tegyen ki a *Quercus pedunculata*; a kevésbbé jó, vagy a vizes részeken azonban már csak 40—50%-ot, a tulságosan vízenyős és rosszabb talaju helyeken pedig, amilyenekben most nemcsak növedékvesztés, hanem az említett pusztulás tapasztalható, legalább is 20—25%-ra kellene leszállítani az arányt. Hogy mit elegyítsünk a tölgy közé, azt természetesen a helyi tenyészeti viszonyok és a gazdasági szempontok állapítják meg. A szlavóniai tölgyesek elegyítéséhez, áradásos területekről és déli fekvésről lévén szó, *virágos kőris* és az ott honos két szilfaj: a *mezei* és a *vénicz* szil és az igen vízenyős helyeken esetleg *fehér nyár* használható. A lippai kerületben az elegyítendő fajok tekintetében nem forog ily megkötöttség fenn, amennyiben szárazabb területről lévén szó: a *közönséges kőrisfán*, a *két szilfa*-fajon és esetleg itt-ott a Maros holt ágaitól járt helyeken *fehér nyáron* kívül *gesztenye*, *gyertyán*, *juhar* stb. is szóba jöhet. A lippai kerületben különben maga a tölgy is több fajban és változatban igen czélszerűen volna elegyíthető; nevezetesen pedig a *kocsányos tölgy* mellett a kései tölgy (*Quercus pedunculata tardissima*) és a magyar tölgy (*Quercus conferta*) volnának itt igen ajánlatosak, amely két utóbbi a késői fagyokra és a lisztharmatra való tekintettel előnyösnek ígérkezik.

A gödöllői kerületben a homokterületeken a *Quercus pedunculata*-ról *egészen le kellene mondani* vagy legfeljebb, csak 10—20% arányban telepíteni ezt a fajt. Ellenben a *fekete fenyő*, a *csertölgy*, *molyhos tölgy mezei szilfával*, *juharral* és *fehér nyárfával* a homokon is megfelel. A gödöllői agyagos részeken a kocsányos tölgy a talaj, illetőleg a letarolt erdő minőségének utmutatása szerint 30—60%-ot tehetne ki, *a két szilfával*, *gyertyánnal*, *juharral*, *kőrissel* elegyítve. Ezen elegyítendő fajok közül pl. a szil a *Turtula* és *Urak rétje teljesen pusztuló tölgyeseiben is szépen diszlik*.

A gödöllői kerületben nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy a homokos területeken *az üregi nyul nagyon pusztít, az agyagos talajon nem*.

A másik általánosítható elv az volna, hogy kerültesse *a nagy kiterjedésben egykoru, megszakítatlan és tulsűrű erdők*. A megszakítás más fafajból álló, vagy tisztás, vagy lényegesebben elűtő koru fákból álló sáv lehetne. A tulságosan sűrű állomány pedig rendszeres ritkítással volna elkerülhető.

Mindezekhez az óvintézkedésekhez természetesen sok oly részletkérdés fűződik, amelynek a szükséges erdőgazdasági tapasztalatokkal bíró és a helyi viszonyokkal behatóbban ismerős illetékes szakférfiak véleménye szerint kell megoldást nyerni.

Fontos kérdés az is, hogy mi történjék most az elpusztult erdőkkel? A már kipusztult erdőrészekre vonatkozólag nem lehet kétség aziránt, hogy azok *mennél hamarább értékesítendőek, mert az élettelen fa törzse a saprophita gombák martaléka és rohamosan korhad. A pusztuló félben levő és még tengődő erdőrészek jövője iránt nem lehet azt a reményt táplálni, hogy ezek magukhoz jönnek és így nem tarthatók fenn*. A ma már egész Középeurópában általános és úgy látszik nyugatról kelet felé terjedt lisztharmatkalamitás oly nagymérvű, hogy *mindazok az elegyetlen és nem egészen megfelelő, vagy éppen alkalmatlan talajon álló Quercus pedunculata erdőrészek, amelyek betegesek és koronájuk $\frac{1}{2}$ — $\frac{1}{3}$ része már elpusztult, a bajnak előbb-utóbb egészen áldozatul esnek*. Ezeket tehát szintén czélszerű mielőbb kihasználni. Hogy milyen lépésben történjék ez, azt természetesen a gazdasági, a munkás stb. viszonyok dönthetik el.


A tölgy lisztharmatját *Thümen* már évtizedekkel ezelőtt 1878-ban irta le Portugáliából. Tehát ez a gombafaj nem új keletű az európai tölgyeseken, mindamellett nagyobbfoku fellépésről csak az utóbbi időkben panaszkodnak. Ma azonban a lisztharmat oly általános baja a tölgyeseknek, amelylyel a jövőre nézve számolni kell és ha valahol Európában, úgy elsősorban hazánkban fontos a kérdés részletesebb tudományos és gazdasági tanulmányozása. Így a jövő teendőiről szólva nem mulasztható el itt annak a hangsúlyozása, hogy a selmeczi erdészeti kísérleti állomás legfontosabb és egyuttal talán legszebb feladata a hazai tölgyesek lisztharmat betegségének tanulmányozása. Ez nemcsak mint általános európai érdekű erdőgazdasági téma bír jelentőséggel, hanem Magyarország növényföldrajzi fekvéséből kifolyólag egyenesen legéletbevágóbb kérdése a magyar

erdészetnek. Rendszeres megfigyeléseket és a kapcsolatos kérdések szakszerű megoldását a külföld is tőlünk várhatja legelső sorban. *Kiváncos ennél fogva, hogy a selmeczi kísérleti állomás különösen a vinkovcei, a lippai, a lugosi és a gödöllői kerületek területén az illető gazdasági szakférfiak intenzív közreműködése mellett ez irányban a rendszeres munkálatokat felvegye, még pedig felvegye mindama kérdések szemelőtt tartásával, amelyek az előbbieken csupán főbb vonásaikban a talaj minőségével, a hernyórágással, a kései fagyokkal — és az egyes tölgyfajokkal és fajtákkal, — különösen pedig a Quercus pedunculatával kapcsolatban felhozattak.* Igen fontos az ilyen tanulmányok szempontjából a helybeli szakférfiak részéről *pontosan vezetett nyilvántartása az idevágó eseményeknek*, ami a jelen tanulmány végzésekor is égető követelménynek bizonyult. Szükséges ennél fogva a jövőre nézve az, hogy a selmeczi kísérleti állomás vezetése mellett az erdőgondnokságok legalább is a *hernyórágás, a kései fagy és a lisztharmat* fellépésének idejét, illetőleg időtartamát és mérvét, a saját idevágó egyéb megjegyzéseik, árvíz stb. feljegyzése mellett gondosan nyilvánartsák, hogy az idevonatkozó gyakorlati és tudományos részletkérdések megoldásához további alapot szolgáltatassanak. Az előbbieken tett megállapítások a kérdés további tanulmányozásától teljesen függetlenek és így a nagyméltóságu miniszter ur magas rendelkezései a fentiekben előadottak szerint:

1. az elpusztult és a pusztuló erdők kihasználására,
2. az újabb erdősitések czélszerű irányítására és a most meglevő fiatalosok megfelelő kezelésére és
3. a kísérleti állomás által felveendő vizsgálatokra nézve mielőbb igen kíváncsok.







171332

A szlavoniai lisztharmatos erdők kérdéseihöz.

Írta: *Dr. Tuzson János* egyetemi tanár.

Az Erdészeti Lapok legutóbbi számában (113. old.) össze van foglalva főbb vonásokban mindaz, amit az ott leírt hazai tölgyes erdőkben, ezek lisztharmat betegségére vonatkozólag meg lehetett állapítani, valamint az is, hogy miként lehet a baj ellen a legcélszerűbben védekezni.

A megállapítások tavaly ősszel történtek és azóta csak egy tél telvén el, az ott leírtakhoz újabb adatokat legfeljebb csak annyiban kapcsolhatok, hogy azóta a gróf Károlyi Lajos-féle erdői uradalomtól azt az értesítést kaptam, hogy a lisztharmatgombától az ottani tölgyesek szintén a nyirkosabb talaju foltokon szenvedtek erősebben. Tehát éppen úgy, amint egyes más esetekre az idézett cikkben is ki van emelve. Egyebekben e fontos erdőgazdasági probléma részletes megoldásához csakis az érdeklődés általánosabb felébredése és az ország minden részére kiterjedő figyelem mellett várhatók újabb és újabb adatok és eredmények. Erős a meggyőződésem, hogy azok szem előtt tartásával, amik áttekinthetőség okából tömören és röviden az előbb említett cikkben le vannak írva, és az újabb és újabb esetek helyes megítélése mellett, a baj leküzdése, a nagyarányú károk elkerülése és egészséges tölgyes erdők nevelése kitartó munkával kétségtelenül sikerülni fog.

Eziránt biztosítékot nyújt az illetékes vezető szakkörök élénk érdeklődése és a selmeczbányai erdészeti kísérleti állomás körültekintő munkássága is.

A magam részéről a jelen közleményben csupán az előbbi cikkben a szlavoniai tölgyes erdőkről írottakhoz kell hogy egy pótlással és helyesbitéssel hozzájáruljak. Nevezetesen e tölgyeseknek u. n. „fehérfájú” fafajai között a *Fraxinus excelsior*-nak oly nagy jelentősége és fontossága van, hogy ennek a cikkemből történt kimaradása, ha ezt itt legalább pótlólag nem hangsúlyoznám, annak lényeges hiányát képezné. Ezt a fajt a lisztharmat veszedelem csökkentése okából ajánlott elegyítéshez feltétlenül és elsősorban kell használni. Ehhez kétség nem fér és nem férhetne a

hozzáértő szakférfiak előtt még abban az esetben sem, ha cikkemből kimaradva, azt pótlólag sem említeném.

Hogy azonban ezt itt ennek daczára is külön hangsúlyoznom kellett, annak az az oka, mert egy a Morović melletti erdőrészekben szedett kőrisfahajtás kapcsán a *Fraxinus ornus* (virágos kőris) is bekerült a jegyzékembe és éppen mint feltűnő adatot a cikkembe is felvettem a 116. és a 121. oldalon. Ez által a véletlen szövegezés által most már félreértés lehetett volna abban az értelemben, mintha a *Fraxinus excelsior*-t egyáltalában nem tartanám fontos, odavaló fának, aminek tehát éppen az ellenkezőjét kell hangsúlyoznom.

Ennek a pótlólagos megjegyzésnek kapcsán rá kell térnem a *Fraxinus ornus* kérdésére és arra is, hogy van-e valóban virágos kőris a szóban levő erdőkben.

Az a leveles ág, amelyet ott szedtem és amely az egyetemi növényrendszertani intézet herbáriumában van, mindenben a *Fraxinus ornus*-ra vall. A levélkéek csekély száma (9), azok széles és elül lekerekített volta, a rügyek szürkésege a *Fraxinus ornus*-t sejtetik. Csupán a levél szegélye valamivel mélyebben fogazott, mint ahogy az utóbbi fajon szokott lenni. Nekem az adat fontos volta, ami különösen a *Fraxinus excelsior*-nak a cikkből való kimaradása következtében válik súlyossá, akkor ötlött szemembe, amikor a cikk nyomtatásban állt előttem és amikor egyuttal Roth Gyula erdőtanácsos ur kérdést intézett hozzám, hogy vajjon valóban *Fraxinus ornus*-ágakat szedtünk-e Morović mellett?

Ekkor fogtam hozzá a levelek tüzetesebb, a kézikönyvekben és flóraművekben megszokott körülírások határain kívül eső, részletesebb megvizsgálásához. Főleg pedig az erezet viszonyait vizsgáltam, mert ismeretes, hogy a levélerezet igen sok esetben nagyon fontos és állandó ismertető jeleket szolgáltat.

Ez beigazolódott a *Fraxinus ornus* és *Fraxinus excelsior* fajokra vonatkozólag is, amennyiben a kettőnek kifejezett levelén az erezet között igen jól megállapítható és teljesen megbízható különbség van. Míg ugyanis a *Fraxinus excelsior* levelének alsó oldalán csak a főér és a szárnyasan futó másodrendű erek domborodnak ki a lemez szövetéből, a harmadrendűek pedig a lemez szövetébe vannak beágyazva és mint sötét színű vonásokból álló hálózat láthatók, melyben a legfinomabb elágazások rendszeren sötét pontocskában

végződnek, addig a *Fraxinus ornus* leveleinek alsó oldalán az összes erek, még a legfinomabbak is, a lemez szövetéből kidom-borodva kuszálódnak össze-vissza, amint azt a 1. és 2. sz. ábra mutatja.

Nem akarok itt ama szövettani okok részletes tárgyalásába bocsátkozni, amelyek ezt előidézik, csupán azt említem meg, hogy a *Fraxinus ornus* levélereit sokkal több szilárdító szövet veszi körül, mint a *Fraxinus excelsior* ereit.

Sajátságosnak látszik, hogy ezt a kitűnő ismertető bélyeget olyan esetekre, mint amilyen a mi esetünkben is fenforgott, t. i. amikor sem virágzat, sem terméságazat rendelkezésre nem áll, eddig a levélkulcsok és dendrologiák nem ismertetik. Legalább az általam átnézett művek nem. *) Ennek okát kétségtelenül abban kell keresnünk, hogy a kettő két külön sectióba tartozó, egymással közletről nem rokon faj, amely között a virágzatban, termésben, termelben, levélalakban, a levélkék számában, a rügyek színében stb. általában oly nagy különbségek hozhatók fel, hogy feleslegesnek tartották további különbségek után kutatni. Holott a levélalak, a levélkék száma és a rügyek, éppen a szlavoniai esetben, nagyon is bizonytalan alapot nyújtanak a meghatározáshoz.

Csupán *Ettingshausen*-nek *Die Blattskelete* (1861) cz. munkájában találtam röviden megemlítve, hogy a *Fraxinus ornus* levélerei „scharf hervortretend“, a *Fraxinus excelsior*-éi pedig

*) *Frank A. B.*: Pflanzen-Tabellen, 1869. 160. old.

Nördlinger: Deutsche Forstbotanik II., 1876. 29. és 39. old.

Hempel G. u. Wilhelm K.: Die Bäume u. Sträucher 1889. 115. és 120. old.

Dietz S.: Rügy- és Levélkulcs. 1882. 86. old.

Köhne E.: Dendrologie, 1893. 508. és 513. old.


Solereider: Syst. Anat. d. Dicotyledonen, 1899. 589. old. — Ergänzungsband, 1908.

Lingelsheim A.: Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung *Fraxinus*. Botan. Jahrb. für Systematik etc. 40. 1908.


Tőkés L.: Levélkulcs. 1908. 59. old.

Fekete L. Mágocsy-Dietz: Erdészeti Növénytan, II. 1896. 1076. és 1081. old.

Itt a *Fraxinus ornus*-nál „később... átlátszó“ erekről van szó, amit legalább is a herbáriumi példányokról és a *Fr. excelsior*-ral szemben nem lehet kiemelni, mert utóbbinak levélerezete sokkal áttetszőbb,



i. ábra.



2. ábra.


1. A *Fraxinus excelsior* L. levelének alsó oldala. — 2. A *Fraxinus ornus* L. levelének alsó oldala kiemelkedő erezettel. Mindkettő kézi nagyítással vagy élesebb szabad szemmel is látható.

„wenig deutlich hervortretend“. Ez a két kitétel azonban nem egészen tiszta, magam is csak utólag a leírt különbség felismerése után kölcsönöztem ezeknek nagyobb jelentőséget; alapjában a „hervortretend“ és „wenig deutlich hervortretend“ kifejezéssel szersző csak olyasfélét akart mondani, hogy „szembetűnő“ és kevésbé „szembetűnő“, mert ha nem így volna, akkor a *Fr. excelsior*-ra nem írta volna, hogy „wenig deutlich“, mert ezen a levélerek egyáltalában nem emelkednek ki. Az *Ettingshaus. n* idevonatkozó levélváz-ábráiból sem állapítható meg egyéb. Az egy évvel később kiadott levélkulcsából pedig *Ettingshausen**) még ezt a jellemzést is kihagyta.

A moroviéi kőrisfák leveles ágát csakis a leírt erezetbeli különbség alapján sikerült biztosan meghatároznom, úgy, hogy gyűjtött anyagom alapján most már egészen kétségbe kell vonnom, hogy azokban a tölgyerdőkben virágos kőris volna. Nincs zárva, de bizonyíték nincsen rá.

Mindamellett az ottani sajátos levelű *Fraxinus excelsior* nem lehet azonos a mi közönséges kőrisfánkkal, illetőleg majdnem bizonyos, hogy ennek egy, a közönségestől eltérő alakjával van dolgunk, amelyet minden bizonynyal külön név is illet meg. A növény összes részeinek, virágának, termésének stb. ismerete nélkül azonban ez a kérdés nem oldható meg. Talán módja fog azonban akadni még az idei tenyészteti idő lefolyása alatt annak, hogy a hiányzó adatoknak is birtokába jussak.

*) *Ettingshausen C.*: Medicinalpflanzen, 1862. 121. és 336. old.





101-201
011611132

1851

1866

