



BERENDI

BÉLA.

A  
havas-  
takarmány-  
kiserleti-  
állomásokról.




DK

241














NÉHÁNY SZÓ  
A HAVASTAKARMÁNY-  
KISÉRLETI-ÁLLOMÁSOKRÓL

IRTA:

BERENDI BÉLA.



Különlenyomat  
az Erdészeti Lapok 1902. évi VIII-ik füzetéből




BUDAPEST  
"Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság  
1902









Lk. 315.

## Néhány szó a havastakarmány-kisérleti állomásokról.

Irta: Berendi Béla.

A havastakarmányt szolgáltató növények alatt nem csupán a szó szoros értelmében havasokon vagyis a fás-növények tenyészetén felül élőket kell érteni, hanem azokat is, melyek a havasgazdálkodás gyűjtőfogalom alá foglалható gazdasági ág nál a havasi legelőkön és havasi réteken, tekintet nélkül azok helyrajzi fekvésére, tenyésznek.

Nem czélom jelenleg azt ismertetni, hogy hazánk florájában melyek azok a növények, melyek ez elnevezéssel illethetők, hanem csak az, hogy e tárgyban olvasott, hallott s részben tapasztalt és az erre fordított idő rövidségével arányban álló szerény ismeretekről beszámoljak, és másrészt, hogy ezen nagy horderejű s az ország őstermelési ágaira valamint az állattenyésztésre is kiható, sőt mondhatnám azt irányító körülményekre rámutassak.

Közelről érdeklí az erdészetünket is, mert ott, ahol a havasnak és erdőnek tulajdonosa egy és ugyanaz a birtokos, ott a havaskezelést ez idő szerint rendesen az erdészet végezi. Ez különben a dolog természetéből is következik mert annak előtte a legeltetés ezeken a területeken felváltva történt s mert a havasi gazdálkodáshoz szükséges fát az erdő szolgáltatja.

Igen sok helyen az erdő fentartásától van a havas használhatósága feltételezve s az erdészeti kezelés nyilvánvalóan gazdaságosabb, mint külön gazdasági személyzet



alkalmazása. Hozzá teszem azonban, hogy ez a műszaki kezelés és a tulajdonképeni havasgazdálkodás: mint állattenyésztés, sajtgazdálkodás stb. nem egy és ugyanaz a fogalom.

A havastakarmányt sajnos, még csakis a havasi legelő alakjában ismerik az országban. Más alkalommal már kimutattam azok szánalmas állapotát és leírtam azokat a gazdasági módokat, melyekkel a havasi legelők okszerű kezelését elérhetjük. Most magával az *anyaggal* mint *organikus lénynyel* szándékozom foglalkozni.

Régi magyar közmondás, hogy «saját kárán tanul az ember.» Ez másként úgy is kifejezhető, hogy ha valami jónak gondolt dolgot el szeretnénk érni, de nem tudjuk, hogy az adott körülmények között mikép juthatunk célhoz, hát akkor kicsinyben megpróbálkozunk vele, vagyis saját erőnkhez és tehetségünkhöz képest *kísérletezünk*.

Igen ám, de a kísérletezés kárral, költséggel és fáradtsággal jár, szóval pénzbe kerül. Megbízható adatokat sem nyújt mindig, mert a megfigyelőnél többnyire hiányzik a szükséges tudományos képzettség. Nehogy tehát rendszertelen kísérletezésekre hiábavaló költségek fordíttassanak és főleg, hogy a megfigyelések tudományos alakban ahhoz értő szakemberek által végeztessenek s annak alapján az eredményről a nagy közönség is tudomást szerezhessen, létesültek a különféle *kísérleti állomások*.

Manapság felölelik ezek a tudománynak és gyakorlati gazdálkodásnak majdnem valamennyi ágát. Létjogosultságuk kétségtelen.

Bennünket most a «havasgazdálkodás» szempontjából szükséges havastakarmány-tenyésztési kísérletek érdekelnek.

Hogy vajjon szükségesek-e ezek, erre a kérdésre csak azzal felelek, hogy az ország mintegy 48 millió



kat. hold összterületéből ez idő szerint másfél millió kat. holdnál nagyobb területet foglalnak el a havasi legelők. Ennek a körülménynek felemlítésével és a következőkben elmondandókra való utalással, az ügy iránt komolyan érdeklődők és a tárgyhoz értők bölcs felfogásához és hazafias érzületéhez apellálok.

*Dr. C. von Nägeli* svájci származásu tudós tanár «Über Pflanzenkultur im Hochgebirge» czimű dolgozatában a többek között a következőleg nyilatkozik:

„Minden ország sajátos kulturnövényekkel rendelkezik és pedig annál többféleképpen, minél régebbi a nép és minél sűrűbb a lakosság. A hegyvidék ily kulturnövényekkel nem rendelkezik, mert itt a szükség parancsolólag nem lépett fel.

Ha elfogadjuk azt a theoretikus állítást, hogy kulturnövények a hegyvidéken is tenyésztethetők, ezzel kapcsolatban azt a gyakorlati kérdést kell felállítanunk, milyen módon és mily eszközökkel lehet ezt elérni? Kultur variétásoknak a hegyvidék részére való nevelésénél a tenyésztőnek azokat a válfajokat kell választani, melyek a zord klímát elviselik s rövid tenyészidőt kívánnak. A kísérleteknek feltétlenül zord égélj alatt kell történni.

Az ily kísérleteket s illetve már a tenyésztést magát helyesen csakis az ily célra megfelelő „*havasi kísérleti kertekben*“ végezhetjük, melyeknek főcélja ugyan az új kulturnövények termelése, de nem kevésbé fontos feladata annak kutatása is, hogy mily feltételek mellett termelhetők a síksági növények a hegyekben, valamint az ide még hidegebb tájakról került fajok magatartásának a tanulmányozása is.

Ezekon kívül a havasi kertek a különféle állati és műtrágya hatásának tanulmányozására, az elkopárosodott legelők miként történő megjavítására és az erdőket alkotó fajoknak a fatenyészet határán való fejlődésére vonatkozó és egyáltalában több hasonló kérdés tanulmányozására is szolgálnak.

Hogy ezen gyakorlati kérdéseken kívül növényphysiologiai szempontból a botanikus még egyéb tudományos kérdéseket is tanulmányozhat, az természetes.



Teljesen osztom Dr. Nágelinek azt a felfogását, hogy az ily kísérleteknek nagyobb területen, különféle irányban kell történni, megfelelő szakember vezetése alatt.

Rendszer és alapos megfigyelések nélküli kísérletezések az ügynök csak ártalmára lehetnek.

A havasi kísérleti kert ott, ahol az ország tekintélyes részét hegyvidék alkotja, az egyéb irányban folytatott tudományos kísérleteknek elmaradhatatlan kiegészítő része.

Kiváló szolgálatot tehet egyáltalában a havasi növénytenyésztés és annak emberi hatalmunkban álló mikénti védelmének tanulmányozására is.

Szükség van a havaskísérleti állomásokra már azért is, mert a havasok növényzete fejlődésében és élettani megnyilvánulásaiban nagy mértékben eltér az alsóbb régiók növényzetétől. Érdekesen fejtegette ezt a párisi 1900. évi nemzetközi kiállítás idejében a *«Congrès international de l'alpinisme»* alkalmából az *«Association pour la protection des Plantes»* tevékeny elnöke M. Correvon a *«Havasi flóráról és annak védelméről»* szóló előadásában, melyet mint a congressus tagja magam is szerencsés voltam végighallgatni. Az előadás idevágó részéből a következőket idézem:

„A magas hegység növénytenyésztete, ugymond, de különösen az Alpeseké, oly változatos és jellegző, hogy felette meglepi még azt is, aki különben irányában közönyös. A növények többnyire törpék és többé-kevésbé satnyák és ez annál inkább szembe tűnik, minél jobban emelkedünk a hegyekben.

A sovány hegygerinceken, a sziklák hasadékaiban és a kövek között a növények gyakran nem egyebek, mint virággal födött levélgomolyagok. Ezeknél a virágzat foglalja el az első helyet, ennek szerveiben nyilvánul és összpontosul a növényélet teljes erélye.



Tündöklő és pazar szinpompájával magához vonzza megtermékenyülésének nélkülözhetetlen kellékét, a rovarokat. A rövid tenyészidő alatt a havasi növény sem szárát, sem ágakat nem fejleszthet és a levelek is csak oly korlátozott számban jelennek meg, hogy a legszükségesebb légzést biztosítsák. Minden törekvésük oda irányul, hogy a szaporítási szervek, melyeknek a virág a védő leple, kifejlődjenek és feltünővé tétessenek.

A phytogeographia semmiféle növényzetnél sem mutat fel oly különös elterjedési mozzanatokat és oly nagymérvű rendelle-  
nességeket a példányok méreteiben, mint a havasi növényeknél.

Némely faj csaknem kosmopolita, míg másoknak elterjedési köre, bár egymástól nagyon messze vidéken, igen szűk határok közé van szabva. Hogy ezek hajdan nagy mérvben el voltak terjedve, az valószínű, de általunk nem ismert okoknál fogva sok helyről kipusztultak.

Ez az a körülmény, amire úgy az alpinisták, mint a botanikusok figyelmét felhívom és amely a következőkben foglalható össze:

*Vannak hegyi, de különösen havasi növények, amelyek régi és kiveszőfélben lévő családokhoz tartoznak, amelyekben már nincs meg az az erő, hogy a fiatalabb, erőteljes fajokkal küzdjenek a létfenntartásért. Ezzel szemben bizonyára vannak keletkezőben lévő fiatalabb fajok, melyek hivatása a terjeszkedés.*

A fajok élettartama bár egymástól igen különböző, de mégis határolt, nem örökös.

A termőföld rétegeinek tanulmányozói állítják, hogy a jelenlegi tenyészlet különbözik a hajdanitól és hogy a régi fajok eltűntek, helyettük újak keletkeztek. Ezeknek is van születésük és haláluk, kezdetük és végük.

Az elmondottak után bizvást állíthatjuk, hogy azok a fajok, melyeknek elterjedési köre ma már szűk határok közé van szorítva, kiveszőfélben vannak.

*Szent-Ilona* szigetén van egy fa, mely életét annak köszöni, hogy I. Napoleon pihent árnyékában. Ez a historiai nevezetességű fa a compositák családjába tartozó *Psiadia rotundifolia*, Hook: mely annak előtte sűrű erdőként borította a szigetet, fajából az utolsó példány, nincs annak a világon sehol se párja. Szaporodni



azonban már nem képes, mert magva egyáltalában nem csirázik, dugványai vajmi hamar kivesznek. Kihalása tehát bizonyos.

Hasonló körülmények között igen számos havasi növényfaj van. Ezért indokolt tehát érdeklődésünk. Ha a pusztulást az emberi kéz bármily alakban elősegíti, akkor kiveszésök gyorsan be fog következni. Azért tehát ezek a még meglévő kis kolóniák, melyek a „morituri” fajtákat tartalmazzák, a tudomány szempontjából feltétlenül pártfogásban részesítendőek, ha ezt nem tesszük, akkor vétünk azon kötelesség ellen, melyet az intelligencia szab elénk.

A veszélyek számosak, ezeknek lehető elhárítása céljából alakult *Genève*-ben az „*Association protectrice des plantes*” s ennek első feladata volt havas kerteket létesíteni, ahol ezek a fenyegetett növényfajok is tenyésztetnek.

Egyike a legszebbnek *Bourg-Saint-Pierre*-ben van, melyet a szövetségi kormány segítyez.

A fent megnevezett társulat ténykedéseinek eredménye az Olaszországban alakult „*Pro Montibus*” egyesület is, mely a fenti célokon kívül még a kopár területek beerdősítését, illetve termékenynyé tételét is erkölcsileg és anyagilag már ezidőszerint is konstatálható, szép eredménnyel támogatja.

A gazdálkodás szemponijából M. Correvon előadásából azt a gyakorlati következtetést vonhatjuk le, hogy az elnyomott havasi növényeket, ha érdemesek, részesítsük védelemben, míg a terjeszkedőknek, ha nem hasznosak, vessünk gátat. Hogy melyek a hasznos, melyek a káros havasi növények, melyek életképesek, melyek nem, ezt kideríteni éppen a kísérleti állomások feladata.

*Dr. F. G. Stebler* és *Dr. C. Schröter* zürichi tanárok „*Beiträge zur Kenntniss der Matten und Weiden der Schweiz*” czimű értekezésökben, mely értekezés kiválóan tudományos és lelkiismeretes alaposságánál fogva az ahhoz értők feltétlen elismerésében részesült és a melynek alapján és nyomán jelen ismertetést közlöm, előadják, hogy a havaskísérleti kertnek szükségét már a mult század elején



Kasthofer nevű svájci is belátván, Interlaken mellett az „Abendberg“-en létesítette az első kísérleti mezőt.

Ez alapon dr. Fleischmann és Freiherr von Giese is hasonló kísérletezéseket végeztek Allgäuban.

A. v. Kerner az osztrák földmívelésügyi minisztérium támogatásával a „Blaser“ nevű havason — Tyrolban — létesített egy kísérleti telepet, melynek célja volt meg tudni, vajjon a völgyek rétjeinek némely fűfajait nem lehetne-e a havasokon tenyészteni és ahol az iránt is folytak kísérletek, hogy czélszerű-e a hegyvidéki sovány legelőket évenként kaszálni.

Nemkülönben a gyepek magvetés útján való megjavítása tárgyában is tétettek rendkívül érdekes kísérletek.

Bajorországban 1884. évben a „Wendelstein“ nevű havason dr. Dingler müncheni botanikus 1849 m. magasságban létesített egy kísérleti állomást. Hasonlóképen Wallis Canton kormánya az „Association pour la protection des plantes“-al szövetkezve, Sion városban telepített egy kertet s azt F. O. Wolf ottani tanár vezetésére bízta. A „Monte-Rosa“ egyik leghatalmasabb gletscherje alatt mintegy 3000 m. tengerszín feletti magasságban ismerkedtem meg ezzel az urral, kinek társaságában barangoltam a Gorner Grat-on és szomszédos hegycsoportjain, tanulmányozva a növénytenyészetet, a takarmányul szolgáló fűféléket s a fűvek bokrosodását úgy a szarvasmarha, valamint a juhjárta havasokon; továbbá folytatólag egymagam annak okát, hogy helyenkint miért szorul le a fatenyészet a völgyek felé s ismét, hogy némely helyen a fák habitusát tekintve miért nincs átmenet a fatenyészeti öv felső határa felé a sudarnövés és a bckrok között?

Minden tekintetben tudományos alapokra fektetett



nagyobb szabású ily telep létesült 1884. évben Svájcban Graubünden Cantonban a „Fürstenalp“ nevű havason.

A telep vezetése dr. F. G. Stebler tanárra, a Zürichben székelő „Schweizerische Samen-Control-Station“-nak tudós és érdemes főnökére van bízva, akinek rendkívüli előzeny szívesége folytán alkalmam volt, a mennyire azt a rendelkezésemre állott idő alatt megtehettem, a telepet megsejmlélni s különféle irányban az idő rövidségéhez mért szerény tanulmányokat végezni.

Minthogy megtörténhetik, hogy honfitársaim közül valaki közelebbről is érdeklődik ezen kísérleti állomás holléte iránt, leírom, hogy mikép lehet oda legczélszerűbben eljutni.

A Sargans-Thusis-i h. é. vasutvonal mentén fekszik „Trimmis“ község vasuti megállóhelye. A község maga innét husz percz gyalog. Az egyedüli vendéglős, aki egyzersmind postamester és aki a kísérleti telep személyzetének élelmiszerekkel való ellátásáról is gondoskodik, az érdeklődőket szívesen utbaigazítja és a havasra, ha ő ezt maga nem tehetné, vezetőről is gondoskodik.

Legczélszerűbb a havasra kora reggel, vagy legkésőbb délelőtt felmenni, mert a délutáni nap egész késő estig teljes erejével éri a turistát és az itt otthonias „Föhn“ szél szinte elviselhetetlen forróságot áraszt és nehezíti a lélegzést.

A „Fürstenalp“ havas legelői a Hochwangkette hegláncz déli részén a festői szépségű „Schanfigg“-völgy északi partja felett északkeleti fekvéssel birnak s 1780 m.-tól 1970 m. tengerszin feletti magasságban terülnek el.

A 648 m. tengerszin feletti magasságu Trimmis-faluból rendkívül meredeken mintegy 1000 m. magasságig vezet fel bükkös erdőben a gyalogut a „Talein“ terasse-ig.



Tovább az út lankásabb s az erdeifenyő az uralkodó fánem.

*Talein* felett kezdődik a tulajdonképeni fenyves, alkotva vörös-, lucz-, és jegenyefenyőből, mely mint rendes zárt erdő 1700 m. magasságig emelkedik.

Az út azután lavina-járatokon vezet át, mely részeken csakis a hajlékony havasi éger és néhány fűzfaj tenyész.

Itt vagyunk a Rhododendronok birodalmában; legelőször a Rh. hirsutum, pillás havasi rózsza, majd feljebb a rozsdavéres színű Rh. ferrugineum s mindenhol, ahol e kettő előfordul, ezeknek hybridje a Rh. intermedium Tausch. lép fel.

Ezeket elhagyva, az ammoniak-növények coloniája (*Rumex alpinus*; *Senecio cordifolius* stb.) jelzi, hogy a legelőjóság hol szokott tanyázni.

Végre körülbelül 1200 m. abszolút magasságnak rövid, mintegy 4 km. hosszban, tehát nagyon is meredeken való megmászása után, elértük a havas alsó tanyáját.

A havas itt kis fösiköt képez; délkeleti irányban a Faulenberg komor, sötét sziklafalai láthatók, északnyugat felé erdős hegyoldalak váltakoznak havasi tanyákkal, melyeknek hátterét a „Säntis“ hómezői képezik. A völgyben pedig a történelmi nevezetességű Rajna zavaros és azzal a bizonyos, a gletscherekben és a kopasz sziklák régióiban eredő szürkésfehér színű cementes márga-iszappal telített hullámai hömpölyögnek; magokban zárva oly energiát, mely lejjebb az ipar szolgálatában milliókat ér.

Tanulmányozzuk e helyen a tenyészetet, mely azt a meghatározott sorrendet itt is éppen úgy követi, mint akár minálunk Magyarországon, vagy máshol. A különbség csak a fajokban és a nemekben van.

Mily nagyszerű és mily tanulságos ez az átmenet!



Mindennek meg van az oka. Nem a véletlen játéka, hogy a nedves részeken, a köves oldalakon más és más a tenyészet, hogy a napsütötte oldalak florája különbözik az éjszakitól, hanem a természet törvénye követeli így. És igen bölcsen. Ha ellene vétünk, megbosszulja magát, az árát csak mi adjuk meg, de jól ellesve, anyagi hasznunkra fordíthatjuk.

A növénytenyészetet általában véve két főosztályba sorozhatjuk, fás növényekre és fűfélékre.

A *fás* növényeket az erdei fák és a különféle bokrok alkotják, ez utóbbiakat a havasi éger, fűzfélék, a havasi rózsza és egyéb törpe bokrok képezik.

A *fűfélék* vagy összefüggő gyeptakarót alkotnak vagy pedig csak foltonként tenyésznek. Az előbbiek a kaszálókat, legelőket képezik míg az utóbbiak a kőomlásokon, meredek oldalakon vagy a sziklák hasadékaiban teremnek.

Vegyük ezeket a tenyészhatárokat közelebből szemügyre.

Az *erdőről* már fentebb emlékeztem meg. Itt csak azt jegyzem meg, hogy az *erdei legelő*, mint egyáltalán mindenhol, úgy itt is a lehető legrosszabb s néhány nedvességszerető és árnytüdő fűfélén kívül, mint az Alchemilla alpina és a Ranunculaceák, alig tartalmaz más fajokat. A marha csak szükségből járja, számokban kifejezhető hasznót nem hajt.

A bokrokat többnyire a havasi éger alkotja, mely a nedves helyeket szereti s azokat a helyeket foglalja el itt, a melyeket a száraz talaju hegyekben a *törpefenyő*.

A *fű* ezek alatt is csak szórványosan kél s inkább szálasan mint bokrosan.

A havasi rózsabokrok pedig elterjedésöikkel veszélyeztetik a legelőt. Ritkább eseteket kivéve csakis az *északi*



oldalakon lehetők és ez a jelenség Dr. Stebler véleménye szerint abban leli magyarázatát, hogy a fagyok iránt érzékenyek. A havasi rózsza elterjedésére, különösen a fák vagy bokrok közelségében, előnyösen hat a területnek a marha által való „kijárása”. Kis halmok képződnek, melyek körül a föld mélyebben és mélyebben letapostatik. A dombocskák szárazakká és az erős száru füvek tanyájává lesznek melyek humusréteget képezve a Rhododendronok céljaira felséges szolgálatot tesznek; de ki is használják ám a helyzetet, mert nem nagy időre már ők uradják az egész területet, nagy kárára a legelő jószágnak, mely nem csak hogy itt nem lel semmi legelni valót, hanem igen gyakran a lábát töri benne.

A törpe bokrokat a *Salix herbacea* képezi, melyhez a *Soldanella minima*, *Sagina Linnaei*, *Veronica alpina*, *Saxifraga oppositifolia*, *Leontodon pyrenaicum*, *Chrysanthemum alpinum* és *Carex foetida* is csatlakoznak. A törpe bokrok kétféleképpen foglalják el a területeket. A fás szár vagy egészen a felső talajtakaró alatt fut végig főbb elágazásaival együtt s ezekből emelkednek ki az alacsony és kevés levéllel borított száracsók kefesűrűségben, vagy pedig csak a fás szár fő ága fut a földben. Ez utóbbi esetben az ágak oly módon terjeszkednek szét a talajon vagy köveken, hogy arról azt mint egy kis szőnyegtakarót fel-emelhetjük.

Nem szabad azonban kicsinyelnünk e jelentéktelennek látszó bokrokat, mert ezek gyakran a gyepek előfeltételei. A termőföldről kiindulva ellepik a köveket, a kopár részeket, tömkelegőkben lerakódik a por, a levelekből az ágakból képződik a humus, mely a szélhozta magvak melegágya. Így fejlődik itt időnk múltán a pázsit, mely hovatovább mind sűrűbb és sűrűbbé válik, míg nem szülő okát hálá-



datlanul teljesen elnyomja. Szépen látható ez az átmenet a köves talajokon.

Ha tehát rét- vagy legelőnyerés szempontjából e törpe bokrokat irtjuk, tegyük azt óvatosan és csak ott, ahol hivatásukat már befejezték s ahol a *gyeptakaró életfeltétele már biztosítva van*, mert a kelletnél korábbi használat pótolhatatlanul megboszulja magát.

Ez az a talaj, melyről azt tartják, hogy kaszálni nem lehet, legeltetni kell; tévedés; az állandó legeltetés tönkreteszi, vagy csak kaszálni szabad, ha másra nem, alomnyerés céljából, vagy a marhajárás ellen kell védeni, ha ugyan már fásítani nem lehet.

A gyeptakaró egyik neme a delelők és marhaállások növénytenyészetete, amit a germán nyelvű svájcziaiak «*Lägerflora*»-nak neveznek. Ezek a marha és juhtrágya helyeken fejlődnek s *Poa alpina*, *Taraxacum laevigatum*, *Alchemilla vulgaris*, *Poa annua* és az *Aconit* által alkotvák.

A pázsitnak gazdasági jelentősége a réteken és a *legelőkön* nyilvánul.

Vizsgáljuk első sorban a *legeltetést*.

A legeltetés tényleg nem természetes valami, hanem az ember által alkalmazott tényező és csakis az évezredek gyakorlat után tekintetik természetes dolognak.

A legeltetés következtében épen úgy megváltozik a gyeptakaró mint a beárnyalás vagy az öntözés következtében. Nem ellentmondás tehát az a definíció, hogy a legelő a növényeknek mesterséges tényezők befolyása alatt álló karakterisztikus együttlése.

A legelő növényzete a talaj, a fekvés, a magasság és a legelő jószág neme, valamint az évszakok szerint is változik aszerint, amint a kora tavaszi, nyári és őszi növények válnak uralkodóvá.



A *havasi réteket*, melyek kaszálatnak, már messziről meg lehet a legelőktől különböztetni: mert míg a réteknél a gyeptakaró folytonos, a fűnövés egyenletes, addig a legelőknél az többé-kevésbé ki van járva a termőréteg kevésbé humuszos és a fűnövés bokros.

Van még egy fajta gyeptakaró, mely rendszeren sem legeltetve, sem kaszáva nem lesz. Ezek a völgyek meredek zárlatánál, sziklacsoportok terassain és egyáltalában bajosan megközelíthető részeken vannak. A kecskék, zergék és a havasi mormoták eldorádója.

Szinte bámulatba ejti a vándort egy ily «*vadfüvet*» termő rét, amit a svájcziaiak «*Grasplanggen*»-nak neveznek. Menedékhelye ez a legjobb, legaromatikusabb és legritkább havasi füveknek, melyek mindenhol ott, ahol az állatok hozzá férnek, finom zamatjoknál fogva legelőszőr esnek áldozatul.

Ezek többnyire pillangós virágzatúak és füvek, valószínű növényarisztokraták és a kvintessenciáját képezik a legelőknék.

Azt tanácslom a botanikusnak, hogyha a vidék pázsitflorájának igaz képét akarja megismerni, az ilyen helyeket keresse fel. De felebaráti szeretetből hozzá teszem, csak abban az esetben, ha «*jó fejé van*», mert különben életével fizeti meg tudásvágyát.

A havasi legelő és a terméketlen kőszikla között van a *megszaggatott gyepe*, mely különösen meredek oldalakon és ott lelhető fel, ahol a kőzet nehezen málik el, vagy pedig ahol a viharok már alvilági módon pusztítanak.

A növényélet e tájakon esetleges, ma ez, néhány év múlva más faj terem, épen úgy, mint mozgó kötőrmeléken, ahol a növények évről-évre eltemettetnek, tehát folyton új életre kelnek.



Végül megemlítem még a kőszikla floráját. Jelentéktelen és többnyire kuszó növények ezek, melyek azonban nem zöld színűek, hanem mindig a kőszikla színével egyeznek meg. Amily jelentéktelennek látszanak, a természet háztartásában mégis pótolhatatlan szerepet játszanak, mert a kőzetekre bontó hatással vannak, azoknak elmálását elősegítik. Teremtenek és pusztítanak.

Ily változatos képet nyújt itt ez a táj, mely a természet örökös munkájának következménye.

Az ember a természet nyújtotta adományokat saját anyagi előnyére kihasználja. Kutat, kísérletez, ha vajjon nem lehetne-e abból még több hasznot elvonni, miként annak munkáját elősegíteni.

Kísérletez, hogy azt, amiben a természet egy helyen pazarul bánt, nem lehetne-e mesterségesen ott is elérni, ahol az ma nincs, vagy ahonnét azt a lakosság kapzsi önzésből vagy tudatlanságból, esetleg szükségből kipusztította.

Ily elmélkedések és megfigyelések között érünk fel az ottani *kísérleti telephéz*, mely közvetlenül a havasi tanya mellett terül el.

A havastanya-épületben van egy dolgozó szoba a szükséges különféle műszerekkel és a hálószoba az ott tartozkodó kertész és az időnként kiszálló megfigyelők, kísérletezők részére.

A házon kívül meteorológiai megfigyelésekre szolgáló készülékek állanak.

Szándékoson választotta Stebler ezt a helyet, mert ha ily tanyahelyen sikerül a jó gyeptakaró létesítése, akkor a svájczai havasoknak ezer és ezer hektár területe mely ma hasznavehetetlen füveket terem, a kulturának meghódítható.



A kert egy méter magas száraz kőfállal és e felett három sor galvanisált dróttal van körülvéve s két főrésztre osztva.

A terület legelső alkalommal 1884. évben tavaszkor töretett fel és a kövektől megtisztítva *Sinapis alba*-val (Fehér mustár) lett bevetve.

A második évben ismét felásták s az egyik részén különféle fűmagvak keverékét vetették el, míg másik felében a növények külön-külön tenyésznek. A vetésre használt magvak egy részét a közeli havason gyűjtötték, míg más-részét magkereskedésekben vették vagy tudományos intézetektől kapták.

Messze vezetne, ha úgy a keverékek, mint az egyetlen pázsitfélék tenyészetét leírnám, de nem is tehetném azt közvetlen megfigyelés alapján, mert a rendelkezésemre állott idő alatt eredményes munkát alig végezhettem volna. Közlöm tehát dióhéjban azokat az adatokat, melyeket Dr. F. G. Stebler és Dr. C. Schröter urak «*Die Alpen-Futterpflanzen*» czimű kitűnő munkájokban ismertetnek.

Az elegyes vetés tíz, pontosan egy „ar“ nagyságu ágyba történt, betakarás nélkül, a következő magvakkal:

1. *Trifolium pratense* L., 2. *Trifolium repens* L., 3. *Trifolium hybridum* L., 4. *Arrhenatherum elatius* L., 5. *Lolium perenne* L., 6. *Phleum pratense* L., 7. *Dactylis glomerata* L., 8. *Festuca pratensis* Hud., 9. *Trisetum flavescens* Beau., 10. *Alopecurus pratensis* L. és 11. *Cynosurus cristatus* L. És pedig körülbelül akként, hogy az első ágyban az 1. szám alatti, a 2-ik ágyban az 1. és 2. sz. alatti, a 3-ik ágyban az 1., 2. és 3. sz. alatti s így tovább, növények magvai lettek elvetve.

Ugyanabban az esztendőben a fűvek nem kaszáltattak le, hogy gyökérzetük télen át védve legyen.



Néhány évi tapasztalat azt bizonyította, hogy egymásik növény részben vagy egészen kipusztult és legellentállóbbaknak azok bizonyultak, melyeknek gyökérzete erős s különösen a melyek a föld alatt kúsznak.

Hogy tulajdonkép a világosság megvonása (a kiéhezés) vagy pedig a kellő levegő hiánya (megfulladás) okozta-e halálukat, az nem állapítható meg. Nagyjobb részben tönkre mentek a következők:

Arrhenatherum elatius, Lolium perenne, Trifolium pratense.

A legjobban ellentállottak:

Alopecurus pratensis és a Poa pratensis.

Azok helyett, melyek tönkre mentek, ismét más fajták fejlődtek. Ezek közül megemlítendőek: Rumex alpinus, Senecio cordifolius, Poa annua, Cerastium trivale, Alchemilla vulgaris, Ranunculus nemerosus, Stellaria nemorum, Aconitum Napellus.

Ezek évenként kitépettek ugyan, de újra meg újra fejlődtek.

A fejlődés vagy már a talajban megvolt magvakból vagy vetényülés útján történt. Mindkettőt megakadályozni igen bajos.

Nyilvánvaló tehát, hogy amint a síkság megtermi az ő hasznavehetetlen gyomféléit, épen ugy a havas is; *csakis tömöt gyep képes annak ellentállani*, amint arról a külön-külön tenyésztetteknél meggyőződhetünk.

A fenti tényekből tehát az következik, hogy azok a lóherfélék és füvek, melyeket a völgyekben a mesterséges réteken kultiválunk, a havason nem felelnek meg.

E kísérletekből azt a tanulságot is levonhatjuk, hogy az ugynevezett tanyahelyek sikeresen átalakíthatók kulturterületekké, mert a gazdaságilag hasznos fajok a káros



*gyömököt, különösen az ugynevezett ammoniak-növényeket, elnyomják és hozamuk épen olyan lehet mint a völgyi réteké!*

A csoportos, vagy ha úgy tetszik, elegyes tenyésztésen kívül a havaskisérleti kertben több rendbeli havasi takarmánynövénynek elegyetlen tenyésztése is képezte a tudományos megfigyelések tárgyát. A tenyésztésnek az a célja is volt, hogy évek során szerzett tapasztalatokból vonassék



1. kép. A «Fürstenalpe»-n lévő havasi kísérleti kert részlete.

következtetés arra, hogy a különféle tengerszín feletti magasságban a növényfajok mikép viselkednek.

E célból kisebb-nagyobb ágyakat képeztek s ezek mindegyikébe elegyetlenül vetették vagy ültették el a megfigyelendő fajokat.

Az 1. sz. képen látható az ágyak beosztása s néhány fűfajnak tenyészete.



Stebler és Schröter már megnevezett művekben havasi takarmányul szolgáló 33 növényfajt írnak le és pedig: botanikai jellegök, előfordulásuk, növekvésük és takarmányértékek szerint; ismertetik azok tenyésztési módját, a magnak nyelését, a növények betegségeit és végre rokonfajtaikat.

Nem lehet ugyan czélom sem a jelzett munkában részletesen leírtakat, sem saját tapasztalataimat itt ismertetni, de mégis czélszerűnek vélem, ha a havasi növényeket, azok előfordulását és viselkedését tekintve, nevezett tanárok által képezett osztályokat röviden ismertetem.

Az *első* osztályba tartoznak azok a siksági növények, melyek úgy a sikságon, mint a havasokon előfordulnak s amelyeknek magja a havason jól kél, tekintet nélkül arra, hogy az a hegyekben vagy a sikságon gyűjtetett-e.

A *második* osztályba tartoznak azok a siksági növények, melyek a havasokon is jól tenyésznek.

A *harmadik* osztályba tartoznak azok a siksági növények, melyek a lapályban kitünő takarmányt szolgáltatnak, de a melyek a havasi legelők régióiban már nem tenyésznek.

A *negyedik* osztályba tartoznak azon érdekes növények, melyek a sikságtól a havasokig elvannak ugyan terjedve, de a melyeknek a havasokon való tenyésztésére: csakis azoknak acclimatisált alakjai szolgálnak.

Régen ismert dolog, hogy a növény idők multával bizonyos és állandó klimatikus viszonyokhoz annyira alkalmazkodik, hogy más viszonyok között — ahol őse annakelőtte jól tenyészett — egyáltalában nem életképes.

Dr. Stebler ezt úgy fejezi ki, hogy a klíma tartamos befolyása alatt egy „*klimatikus válfaj*” származik, mely külsőleg a nemző őséhez teljesen hasonlít, de belsőleg



abban különbözik, hogy csakis a változott viszonyok mellett életképes.

A leggyakrabban előforduló ily válfajok a következők: *Dactylis glomerata*; *Trifolium pratense*; *Trifolium repens*.

Ez a jelenség egyébiránt nemcsak a gazdasági növényeknél, de a gyomoknál, pl. a *Poa annua*-nál is megvan, nemkülönben az erdei fáknál is előfordul. Sohasem voltam barátja annak, hogy az Alpések dolomitjain évszázadokon át tenyésztett fenyvek magjából homokos vagy agyagos talajainkon és más klimatikus viszonyok között neveljünk erdőt. A slavoniai tölgyek magja a hegyek jura-képződményeire nem való.

A hangzatos reklám és czifra katalógus nem elég ok a mag megválasztására. Nincs egyáltalában okunk honi fanemeink magvát külföldön keresni. Gyűjtsük azt jól kiválasztott példányokról magunk.

Az idegen fajokat, ha a kísérletek azok mellett szólnak, ám tenyészük, de felette óvatosak legyünk.

Az ötödik osztályba azok a növények tartoznak, melyek magról szaporodnak és a melyeknek magnyerés céljából való tenyésztése előnyös.

A hatodik osztályba végre azok, melyek gyöksarjakról szaporíthatók.

A tenyésztésnek, a magtermelésnek s egyéb tudományos megfigyeléseknek részletes leírásába nem bocsájtkozhatom, hanem utalok a fent megnevezett szerzőknek idézett nagyszabásu munkájokra.

Mielőtt azonban arra a kérdésre térnék át, hogy hazánkban hol és miként volnának ily havasi takarmányszerzési állomások létesítendőek, megemlékezem még néhány ausztriai havasi kísérleti kertről, melyeket azonban sajnos nem volt alkalmam felkereshetni s így hivatkozom *Dr. Th.*



*Ritter von Weinzierl* cs. kir. udvari tanácsos és a bécsi cs. kir. magvizsgáló állomás főnökének „*Alpine Futterbauversuche*“ czimű, a sajtó alól nem rég kikerült felette tanulságos művere.

A legnagyobb és legrégebb osztrák kísérleti kert Aussee mellett a „*Sandling*“ nevű havason van 1400 m. tengerszín feletti magasságban. (2. sz. kép.) A kert mellett látható a botanikus laboratoriuma és a szertár. A kert



2. kép. Havastakarmány-kísérleti kert a Sandling-alpon.

4680 m<sup>2</sup> területtel az 1890. évben telepítettét s célja, rendeltetése ugyanaz, mint a Fürstenalp kísérleti kerté.

Ugyancsak nevezett havason van még a „*Leislingkogel*“ kísérleti kert 1425 m. magasságban, melynek célja annak a befolyásnak tanulmányozása, melyet a sovány talajok a növények fejlődésére gyakorolnak; és a „*Rutschfläche am Kritweg*“ nevű kert, mely a meredek hegyoldalak begyepesítésének tanulmányozására szolgál.



Felső-Ausztriában a Langwies melletti Spitzalpe nyergén létesített „*Hintere Spitzalpe*“ nevű; továbbá Karinthiában Millstatt mellett telepített „*Grundalpe*“ nevű kerteknek célja a különféle havastakarmány fejlődésének megfigyelése, megjegyezvén, hogy az utóbbiban rendszerint a Sandling havasi kertben aratott magvak vettettek el.

A megfigyelések általában véve ugyanazon szempontokból történnek, mint a svájci Fürstenalpon s itt is kétféle tenyésztés van, csoportos és egyes.

További tanulmányozás tárgyát képezte a havasi klímának befolyása a havasi takarmánynövény-tenyésztésre. Dr. Weinzierl megállapította, hogy a hatás különösen morfológiai szempontból a szárnak megrövidülésében, a levelek sűrűbb állásában és egyáltalában a tenyészszerveknek erősebb kifejlődésében nyilvánul.

A phytophänologiai megfigyeléseket illetőleg dr. Weinzierl csatlakozik O. Drude növény-geographusnak ahhoz az állításához, hogy a földrajzi szélességeknek és tengerszint feletti magasságoknak emelkedésével a kifejlődés phásisaiban ugyanazon növénynél késedelem áll be s ez „*napokban kifejezve*“ a két termőhely éghajlati különbségét jobban kifejezi, mint a helyek középhőmérséklete.

Az ily megfigyelések az országos tenyészképességet illetőleg rendkívüli horderővel bírnak.

A csirázási energiára vonatkozólag azt a két nagyfontosságú szabályt is megállapította dr. Weinzierl, hogy:

1. az aklimatizált síksági növényeknek a völgyben termelt magvai korábban csiráznak, mint ugyanazon fajnak a havason termelt magjai; és

2. hogy a par excellence havasi fajoknak magjai gyorsabban csiráznak, mint ugyanazon fajoknak a síkságon termelt magvai.



Mindezekből tehát azt látjuk, hogy rendkívül számosak azok a kérdések, melyeknek jelentősége gyakorlati.

Hogy mi legyen hazai viszonyaink között célunk és hogy e kérdésnek tanulmányozását mikép kell megkezdenünk, erre vonatkozólag a következőkben fejtem ki nézetemet.

\*

Mindenekelőtt meg kell ismernünk azokat a takarmányféléket, melyek havasainkon tenyésznek, azután kísérletek alapján meg kell állapítani azt, hogy miként lehet ezeket eredményesen és gazdaságosan tenyészteni, melyek azok a siksági új kulturnövényfajok, a melyek bár a havasi klíma alatt morfológiai és physiológiai változásnak vannak ugyan alávetve, mégis a havasokon sikeresen és gazdaságosan tenyészthetők és végre, hogy a különféle viszonyok között mikép kell eljárni.

Az előbb tárgyalt tudományos megfigyeléseken nyugvó leírásokban tulajdonkép már benfoglaltatnak a havastakarmány kísérleti állomás felállításához szükséges adatok is, mert nem kell mást tennünk, mint a közölt megfigyeléseket, kísérleteket és tenyésztéseket a mi viszonyainkhoz alkalmazni.

A havasainkon tenyésző takarmányféléknek és egyáltalában a havasi flórának megismerésénél segítségül szolgálhatnak a hazai botanikai munkák és a különféle leírások, nemkülönben nagy segítségünkre lehetnek a botanikával különösen foglalkozók által gyűjtött tapasztalati adatok is.

Tekintve azokat a különböző tényezőket, melyek minálunk a különféle kőzetek által alkotott és tekintélyes magassági határok között mozgó s különböző klimatikus viszonyoknak kitett havasi legelőkre befolyást gyakorolnak, nézetem szerint legcélszerűbb volna két nagyobb szabásu



kísérleti telepet berendezni és pedig egyet a gránitkőzet alkotta „Magas Tátrában“ és egy másikat az északkeleti vagy keleti kárpátok homokkő elmálásából keletkezett talaján.

A kísérleti telepekhez lehetőleg sík terület választandó; amennyiben ez nem volna lehetséges, keleti vagy délkeleti lejtősségű. Minthogy az ily telepnek hosszú időre terjedő fennállást kell biztosítani, legczélszerűbben kincstári havasokon volnának berendezendők.

A szigoruan tudományos alapokon nyugvó megfigyelések a havasi legelőket alkotó takarmánynövényeknek csoportos és elegyetlen tenyésztésére, havasi rétek, vagyis kaszálók alakítására, a legelők gyeptakarójának miként való javítására és különösen a már elkopárosodott talajoknak újra gyepesítésére; továbbá a bokroknak a havasi legelőkön való tenyésztésére és mindezekon kívül még annak a rendkívüli fontos kérdésnek tanulmányozására is kiterjesztendők volnának, hogy az erdőt alkotó fanemeinket mikép lehet a fatenyészet felső határán sikeresen tenyészteni, illetve mily uton-módon lehetne a fatenyészet határát a havasokon ha nem is nagy területeken, legalább kisebb csoportokban, a kedvezőbb fekvéseken, minél magasabb tengerszin feletti magasságra felvinni. Szükséges ez avégből, hogy a roppant kiterjedésű havasi legelőkön kisebb-nagyobb ligetek legyenek alakíthatók.

Ebből a célból is a már előbb javasolt két havasi kísérleti telepen kívül minél számosabb helyen kisebb területek is megfigyelés alá lennének vonandók. Szükségesnek tartom azt, mert a növények fejlődésére befolyással van a tengerszin feletti magasság, a fekvés, a hőmérséklet, a csapadékmennyiség, a tenyészidőtartam, a talaj melege és annak szerkezete. Minél több a lelkiismeretesen pontos



megfigyelés, annál helyesebb lehet a következtetés. Erre a célra igen kedvezően fel lehetne használni azokat a kincstári havasokat, ahol a legeltetés, illetve havasgazdálkodás házi kezelés mellett történik és ahol a szükséges rétek alakításáról a kincstár fog gondoskodni.

Legelső kellék ezeknek a területeknek a legelőállatok és sajnos minálunk még inkább a dűvadak ellen való megvédése.

Kétségtelen, hogy az elkertelési módzatok közül legjobb a száraz kőfalazat 60—80 cm. vastagságban és egy méter magasságban, mely felett 2—4 sor vasdrót van kifeszítve. A kőfalkerítésnek kerülköltsége főleg attól függ, hogy a köveket mily távolságról kell szállítani. Dr. Stebler adatai szerint egy folyóméter költsége 2—5 korona között váltakozik. Nagy átlagban egy hektár bekerítése 1000—1200 koronába kerül.

Az bizonyos, hogy a kőfal a legtartósabb, de ahol kővel nem rendelkezünk és fa bőven van, ott a fakerítés is tökéletesen megfelel a célnak. Ahol a fával is takarékoskodni kell, ott a drótkerítésre vagyunk utalva.

Különös súly helyezendő arra, hogy a kisebb kísérleti telepek egy része a régi havasi tanyahelyeken rendeztessék be, hogy ezek a területek a kulturának visszahódíthatók legyenek. Előnyük az is, hogy megmunkálásuk rendszerint könnyű.

Ezután a talaj megművelendő, a kövektől, gyomoktól gondosan megtisztítandó s kisebb-nagyobb ágyak alakításával a különféle takarmánynövények elegyes és elegyetlen tenyésztésére iparkodunk.

A csoportok, vagyis a havasi rétek alakításának tanulmányozása céljából az ágyak az ott legjobban tenyésző fűfélékkel lennének bevetendőek.



De minthogy jelenleg a mi viszonyainkra vonatkozólag saját tapasztalati adatokkal nagyon kevésel rendelkezünk, legczélszerűbbnek vélem elfogadni azokat a végeredményeket, melyeket a Fürsten-alpon 18 évi tapasztalatok után szereztek és a melyekhez a helyszínén szóbeli felvilágosítások után jutottam.

*Havasi rétek* alakításához egyelőre legczélszerűbb a következő fűmagkeveréket választani:

|                          |              |      |     |     |
|--------------------------|--------------|------|-----|-----|
| 1. Phleum alpinum;       | hektáronként | 1.75 | kg. | mag |
| 2. Meum mutellina;       | „            | 1.00 | „   | „   |
| 3. Trifolium alpinum;    | „            | 0.50 | „   | „   |
| 4. Poa pratensis;        | „            | 1.25 | „   | „   |
| 5. Trisetum flavescens;  | „            | 1.00 | „   | „   |
| 6. Festuca rubra;        | „            | 2.00 | „   | „   |
| 7. Alopecurus pratensis; | „            | 1.75 | „   | „   |

Bizonyos, hogy saját területeinkről ezidőszerint magot keveset, vagy egyáltalában semmit sem gyűjthetünk. Ily körülmények között kénytelenek vagyunk a már meglevő ily tudományos telepekhez, vagy megbízható magkereskedőkhöz fordulni, különösen pedig olyanokhoz, akik főképen havasi takarmánymagvakkal kereskednek.

Föltétlenül oda kell azonban iparkodnunk, hogy idővel saját magunk termesszük és gyűjtsük a magot és evégből a magtermelést iparaggá és magát az anyagot kereskedelmi cikké kell fejlesztenünk, mely a hegyi lakóknak tekintélyes jövedelmet fog biztosítani.

Hogy egy-egy havasgazdálkodáshoz tartozó havasi legelőn mily nagyságu rétet rendezzünk be, erre oly sok körülmény bír befolyással, hogy ennek magyarázatába most nem bocsájtkozhatom.

A *havasi legelőknek* megjavítására vonatkozó kísérletek véleményem szerint legsikeresebben és leggazdaságosabban



*kis* területeken minél több helyen történhetnek avégből, hogy ezzel a fütermésre befolyással bíró különféle tényezők hatását megismerjük és másrészt, hogy a legelésnek hatását változó viszonyok mellett tanulmányozhassuk.

A flóra megismerése itt is a főkéllék, minthogy a *havasi legelőre gazdaságosan ugyanazokat a növényfajokat nem alkalmazhatjuk, mint a havasi rétekre*, mert míg a legelőkön az alacsony növésű és bokrosodó, sűrűn tenyésző fajok vannak indokolva, addig a rétekre a szálások, a magasnövésűek valók.

De azért nem baj az, ha a réteket idővel átengedjük legelőknek s új réteket alakítunk más helyeken, mert ha már egyszer a jó gyepléleke alapfeltétele megvan, az a viszonyokhoz maga alkalmazkodik s rövid néhány év alatt a legelőflóra válik uralkodóvá.

Czélyszerű a csere gyakran azon oknál fogva is, mert a havasi legelőkön ma még meg nem fejtett okoknál fogva egész váratlanul kisebb-nagyobb kopasz foltok képződnek. Bár e foltok magvetéssel javíthatók, mégis czélyszerűbb, ha néhány éven át pihentetjük s ez alatt a területet gazdaságosan mint rétet kezeljük.

A *havasi legelő* alakítására, a meglevőknek javítására a már emitett források nyomán és szóbeli értesüléseim alapján a következő növényeket ajánlhatom:

*Dactylis glomerata*, *Arrhenatherum elatius*, *Festuca pulchella* és *alpestris*, *Plantago alpina* és *montana*, *Alchimilla vulgaris*, *Meum mutellina*, *Hedysarum obscurum* és *Rheum undulatum*.

Hogy ezek közül melyek, hol és mily arányban használtassanak, arra ez idő szerint nálunk egyáltalában semmiféle alappal nem rendelkezünk. Kihagyjuk azt, mely kivész vagy rosszul tenyészik.



További munkálkodásunk és a kísérletek kiterjesztendők a havasi kopárterületek, a földcsuszamlások és a meredek oldalak újra gyepesítésének tanulmányozására is. Ez a kérdés nemcsak a birtokos szempontjából fontos, de országos érdekből is, és egyike a legnagyobb horderejű talajjavítási munkálatoknak. Mert ezek a helyek azok, ahonnan a veszedelem a legnagyobb mértékben fenyegeti az alsóbb régiókat, ahonnan a patakok és folyók medre néhány év alatt annyira beiszapoltatik, hogy már közepes vízállás mellett is árvizek keletkeznek, a melyek vetésben, állatban és kulturintézményekben, köztudomásulag roppant károkat okoznak.

A kísérletek kiterjesztendők a különféle trágyanemek (istálló- és műtrágya) hatásának tanulmányozására is, mert rendes havasgazdálkodásnál a tanyahelyeken tekintélyes mennyiségű istállótrágya gyűl egybe.

A kísérletek eredményének gyakorlati alkalmazásánál legfőbb szabályként azt javaslom, hogy tekintve a havas-használatra utalt kisbirtokosok konservatív szokásait, a munkálatok aránylag kis területen és évről-évre fokozatosan és kiváló gonddal foganatosíttassanak, mert egy-két balsiker azon a vidéken évtizedekre visszaveti a munkát, míg az eredményes eljárás a birtokosokban rendkívüli munkakedvet kelt.

Végre meg kell még emlékeznem a kísérleteknek néhány gyakorlati eredményéről is.

Dr. Weinzierl 22 táblában 10 éven át évenként a lehető legpontosabban megmérte az évi szénatakarmányhozamot, mely hektáronként és évenként 35 és 95 métermázsa között váltakozott. A 22 tábla eredménye a következő:

az 1898. évben 1 hektáron átlag 53 q. széna termett,



az 1899. évben 72 q., az 1900. évben 45 q. széna termett. E három év átlaga tehát közel 57 métermázsa termés évenként és hektáronként.

Még kedvezőbb eredményt ért el azokon a kísérleti telepeken, melyeket a magánbirtokosok rétjein rendezett be.

Ily kísérleti telep 8 állott rendelkezésre elszórtan a havasokon. Ezeknek a lelkiismeretes kísérleteknek eredményeként közölhetem a következő adatokat:

Az 1898. évben egy hektár átlag 82 q., az 1899. évben 79 q., az 1900. évben 76 q. szénatermést szolgáltatott kétszeri kaszálás mellett.

A három év átlaga tehát évenként és hektáronként 79 q. széna és sarju.

Dr. Stebler és Schröter kísérleti rétjei 9 alatt évenként és hektáronként 53—136 q. szénaeredményt szolgáltatott; ezek átlaga mintegy 90 q. volt évenként és hektáronként.

Szerzők számításai szerint *egy hektár havasi rét*, beszámítva a bekerítési, talajmegművelési stb. költségeknek 36 évi amortisatio mellett részleteit, továbbá a fűkaszálás és szénagyújtás, valamint az egyéb kezelési és őrzési költségeket, *évenként átlag 141 frank (129 korona) tiszta jövedelmet szolgáltat.*

Tekintve azt a körülményt, hogy a mi havasaink a termőképességre nézve semmi esetre sem állanak a svájcki vagy az osztrák havasok mögött, sőt nézetem szerint azoknál sokkal termékenyebbek lehetnének, számításainknál az előbb közölt átlagadatok legjobbját is alapul lehetne venni, de azért mégis az eredményeknek csupán csak az

átlagát veszem, vagyis 
$$\frac{57 + 79 + 90}{3} = 75 \text{ q. szénatermést}$$

számítok egy hektárra.



Minthogy nálunk a legtöbb esetben a bekerítéshez szükséges fával rendelkezünk, tehát a kertelés költségeit a kőfalkerítés és a fakerítés közötti középértékben veszem hektáronként átlag 600 Loronával, 30 évi amortiszió mellett. Így tehát:

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 1. A terület bekerítési költségeinek egy évi részlete | 34 K.  |
| 2. Talajmegművelés, bevetés                           | 60 K.  |
| 3. Fűkaszálás és szénabetakarítás                     | 30 K.  |
| 4. Kezelési és őrzési költség                         | 26 K.  |
| Összes kiadás                                         | 150 K. |

Ezzel szemben a haszon:

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| átlag 75 q. széna à 3 korona                 | 225 K. |
| Levonva a kiadást                            | 150 K. |
| Maradt tehát hektáronként évi tiszta bevétel | 75 K.  |

Minthogy a havason termett széna zamatosabb, táplálódóbb, a marha jobban szereti, ennél fogva az állatok fejlődésére, tejelésére rendkívül kedvező befolyást gyakorol.

És ha még ehhez hozzá tesszük, hogy oly területeknek havasi rétekké való átalakításáról van szó, melyek jelenleg egyetlen fillér hasznót sem hajtanak, mert mint régi tanya-helyek csakis dudvával és gyomokkal fedvék, akkor ez a jövedelem egészben a birtok jelenlegi értékének nagy mérvben való emelésére szolgál.

Számításunkkal azonban ne állapodjunk itt meg, hanem mutassuk ki, hogy mit jelentene ez a jövedelemgyarapodás az egész országra nézve.

Az ország havasi legelői mintegy 1.620,000 k. holdat, tehát 930,000 hektárt foglalnak el.

Bizvást állithatjuk, hogy a régi tanya-helyek, melyek ily rétekké sikeresen átalakíthatók lennének, az összterületnek legalább is 4%-át képezik vagyis 37,200 hektár.



kiterjedésűek, mely terület a fentebb kimutatott tiszta jövedelemmel szorozva évenként 2.790,000 K. jövedelem-többletet biztosít.

Ismétlem, hogy ezt a jövedelmet oly területek szolgáltatják, melyek ma egy fillér hasznót sem hajtanak.

Igen ám, de ha a havasokon réteket alakítunk, ott rendszeres gazdálkodást folytatunk, akkor már a havasi legelők megjavítására az alkalom önként kínálkozik.

Messze vezetne az a számítás, melylyel a havasi legelőterületeknek kellő megjavítása esetén a havasgazdálkodás jövedelmének szaporodását szám szerint bizonyítanám s azért jelenleg a néhány száz legkülönbébb viszonyok között lévő gazdálkodás végeredményeire hivatkozom, melyek alapján a legjobb lelkiismerettel állíthatom, hogy a legszigorubb számítás mellett hektáronként legalább is öt koronával emelkednék a mai tiszta jövedelem.

Ez számokban kifejezve, a rétek alakítása után fennmaradó 892,800 hektárnál, évenként 4.464,000 K.-t képvisel s ha e két jövedelmet összegezzük 7.254,000 K. *tiszta jövedelem-többletet* eredményez havasi legelőinknek okszerű kezelése.

Hogy ennek mily horribilis tőke felel meg s hogy e jövedelem mennyivel emelné a nemzet vagyonának értékét, annak kimutatása alól felmentve érzem magam.

Ezek elvitázhatatlan tények, melyek a kétszer kettőn alapulnak. Csak a kezünket kell kinyújtani s egy kis befektetés, munkakedv és kitartás mellett elérhetjük célunkat.

Szinte megdöbbenti a gondolkodó emberi elmét, hogy hát miért nem használjuk ki ezt jelenleg. Vajjon mi oka annak, hogy a pusztulás nem akadályoztatik meg, hogy a havasi gazdálkodásban rendszer egyáltalában nincs, a



havasra vezető utak többnyire csak olyanok, mint a milyenek a középkorban voltak.

Ezekre és más számtalan ehhez hasonló kérdésekre csak azzal válaszolhatunk: mert tudatlan a nép és számítás nélkül él máról-holnapra. Nem elég az, hogy saját birtokunkat nem használjuk okszerűen, hanem még annak a szomorú jövőnek nézünk eleibe, hogy ha a segítség gyorsan nem jön, ezek a havasi legelők kevés kivétellel tönkre fognak menni, mert azoknak sem karban tartásáról, sem az elpusztult területeknek termékenynyé tételéről semmiféle törvény ezidőszerint nem gondoskodik, ezek az országnak mostoha gyermekei.

Az erdőtörvény, a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvény a kopár területek, illetve a vizmosásos területek befásítását rendeli, de minthogy a föld bizonyos magasságon felül csak fűvet terem, ezeket a rendelkezéseket itt a havasi legelőkön, melyek többnyire a fatenyészet határa fölött vannak, be nem tarthatjuk, ott nem fásíthatunk, ahol a fa nem terem.

A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló törvény alapján a legeltetést vizmosás veszélyének kitett területeken egészben vagy részben be lehet ugyan tiltani, de ez az intézkedés itt a magasban rendszerint már nem segít a bajon, mert az elkopárosodás, ha már a talaj helyenkint ki van marva, különösen a meredekebb oldalakon, gyorsan következik be.

Más rendszabályt pedig semmiféle törvény elő nem ír.

*A havasi legelők tönkre menését csakis a rendszeres gazdálkodással és ahol kell a területeknek begyepesítésével óvhatjuk meg.*

Ezt a kérdést, amint azt már ismételten kimutattam, *helyesen csakis a legelőgazdaságnak törvényhozás útján való rendezésével oldhatjuk meg.*



Minden más intézkedés csak palliatív eljárás, minél tovább halasztjuk, annál nagyobb akadályokba ütközünk.

Itt csak gyökeres eljárás vezethet célhoz. Beismerni a veszélyt, rámutatni a mulasztásra és megjelölni az irányt, melyet az összes tényezők közreműködésével követnünk kell.

*A legeltetésnek törvényhozási úton való szabályozása nélkül ennek az országnak népies állattenyésztése felvirágozni nem fog, a legelők okszerűen és gazdaságosan használtatni nem fognak, azok elkopárosodnak és végeredményben a beállandó nyomor és inség következtében a mai erdőterületnek tekintélyes részét indokolatlanul fel kell majd áldozni, az tönkre megy a nélkül, hogy a bajon gyökeresen segítve lenne.*

Ezért is szükségesek a havastakarmány - kísérleti állomások, hogy a legelő-gazdálkodást okszerűen végezhessük, a havasokat temékenynyé tehessük, megjavíthassuk ezzel a mezőgazdaságnak egyik fontosabb kérdését megoldhassuk s a népies állattenyésztésnek fenmaradását biztosíthassuk.















